25. D. 133.

BOSTON
MEDICAL LIBRARY
8 THE FENWAY

EXAMEN CLINIQUE

DE 396 CAS

DE

RÉTRÉCISSEMENTS DU BASSIN

OBSERVÉS A LA MATERNITÉ DE PARIS DE 1860 A 1870

Digitized by the Internet Archive
in 2010 with funding from
University of Ottawa

http://www.archive.org/details/examencliniquede00riga

EXAMEN CLINIQUE

DE 396 CAS

DE

RÉTRÉCISSEMENTS DU BASSIN

Observés à la Maternité de Paris de 1860 à 1870

PAR

LE Dr EMILE RIGAUD

INTERNE EN MÉDECINE ET EN CHIRURGIE DES HOPITAUX DE PARIS,
MÉDAILLE DE BRONZE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE (1868)
MEMBRE CORRESPONDANT DE LA SOCIÉTÉ ANATOMIQUE.

PARIS

A. PARENT, IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

31, RUE MONSIEUR-LE-PRINCE, 31

1870

2 A 133

BOSTON MEDICAL
OCT - 9 1919
LIBRARY

AVANT-PROPOS

Pendant les quelques mois que j'ai passés comme interne à la Maternité, grâce à l'obligeance de mon excellent maître M. Tarnier, et de M^me^ Callé, maîtresse sage-femme, il m'a été permis de parcourir les nombreux registres de la maison d'accouchement. Ces registres contiennent des documents très-intéressants sur plusieurs points de l'obstétrique; documents qui sont pour le praticien d'une importance capitale.

D'après les conseils de M. Tarnier, je me suis attaché d'une façon toute spéciale à l'étude des rétrécissements du bassin.

J'ai donc relevé avec soin tous les cas de rétrécissement du bassin, qui ont été observés depuis 1860 jusqu'à 1870. — Mon intention était d'abord de prendre une période beaucoup plus étendue; mais des circonstances imprévues m'ont obligé de restreindre mon sujet.

Le but que je me propose est d'étudier à un point de vue tout à fait clinique tous les cas qu'il m'a été possible de recueillir, et de tirer de ces cas seulement des conclusions pratiques.

On m'objectera peut-être que, pour un semblable travail, une période de dix ans n'est pas assez longue; — cependant les observations que j'ai réunies sont assez nombreuses pour fournir des indications, sinon d'une certitude et d'une précision irréprochables, du moins d'une utilité réelle.

Dans une première partie, j'exposerai d'une façon succincte tous les faits observés, en ayant soin de les classer d'après le degré du rétrécissement. Comme dans toutes les observations que j'ai relevées, le rétrécissement est déterminé par la dimension du diamètre sacro-sous-pubien (S. S. P.); je conserverai ce mode de détermination sans faire la réduction ordinaire, préférant m'éloigner de la méthode classique, plutôt que de modifier en quoi que ce soit la source à laquelle j'ai puisé.

Le nombre des faits que j'ai à examiner est de trois cent quatre-vingt-seize. Tous ces faits seront répartis en sept catégories : 1° rétrécissements de 0,10, de 0,11, et, à côté d'eux, ceux qui sont marqués simplement par cette désignation : Légèrement rétrécis, ou A. S. V. (angle sacro-vertébral) accessible.

2° Rétrécissements de 0,09 jusqu'à 0,10 exclusivement;

3° Rétrécissements de 0,08 jusqu'à 0,09 exclusivement;

4° Rétrécissements de 0,07 jusqu'à 0,08;

5° Rétrécissements de 0,06 jusqu'à 0,07;

6° Rétrécissements de 0,05;

7° Rétrécissements produits par des tumeurs du bassin;

8° Enfin, rétrécissements dont le degré n'est point indiqué.

La deuxième partie comprendra une série de tableaux, dans lesquels je donnerai le relevé statistique des résultats obtenus dans chaque catégorie de rétrécissements d'après le mode de terminaison employé.

La troisième partie sera consacrée à une discussion clinique de chacune des séries des cas que j'ai relatés; discussion clinique basée sur les divers éléments qui entrent dans la question.

Dans une quatrième et dernière partie, après avoir fait un résumé général de tous mes tableaux et en avoir rapproché les résultats obtenus à la Clinique d'accouchements, pendant une période de seize ans, tels qu'ils sont exposés dans la thèse de M. Stanesco, je tâcherai de donner, sous forme de conclusion, les indications que l'on peut retirer des faits qui font la base de mon travail, et de ceux qui ont été observés à la Clinique.

Qu'il me soit permis ici d'offrir mes remerciements bien sincères à mon excellent maître M. Tarnier, pour l'utile concours qu'il a bien voulu me prêter, en m'aidant de ses conseils, et en mettant à ma disposition les nombreux documents qu'il possède sur ce sujet.

Je prie aussi M. Trélat d'accepter l'expression de ma gratitude, pour la bonté qu'il a eue de me communiquer les observations qu'il a réunies, pendant qu'il était chirurgien de la Maternité.

EXAMEN CLINIQUE

DE

396 CAS

DE RÉTRÉCISSEMENTS DU BASSIN

OBSERVÉS A LA MATERNITÉ DE PARIS, DE 1860 A 1870

BOSTON MEDICAL LIBRARY
OCT - 9 1919

Première Partie

RÉSUMÉ SUCCINCT DES OBSERVATIONS DE RÉTRÉCISSEMENTS DU BASSIN, DISTRIBUÉES EN HUIT CATÉGORIES D'APRÈS LE DEGRÉ DU RÉTRÉCISSEMENT.

PREMIÈRE PARTIE

Diamètre sacro-sous-pubien, de 0,10 et au-dessus.

1. — R..., 17 ans, entre le 3 juin 1863. Primipare; constitution forte; bassin légèrement vicié; réglée à 15 ans et régul.; dernière menstruation le 10 sept. Grossesse actuelle de 9 mois; premières douleurs le 8 juin, 7 h. du soir; rupture des membranes à 3 h. du soir; dilatation complète le 9 juin, 2 h. matin; sommet O. I. G. A.; accouchement naturel le 9 juin, à 2 h. du matin; durée totale du travail 15 heures; délivrance nat. Garçon fort; p. 3.200. Suites de couches compliquées de fièvre. Sortie de la mère et de l'enfant le 15 juin, en bon état.

2. — Sch..., 21 ans, entre le 28 janvier 62. Constitution générale bonne; bassin légèrement vicié; primipare; réglée à 16 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 8 mois; premières douleurs 28 janvier, 1 h. s.; rupt. membr. (?); dilat. complète 29 janvier, 1 h. m.; sommet O. I. G. A.;

accouchement nat. 29 janvier, 1 h. et demie m.; durée totale du travail 12 h. et demie; délivr. nat. Enfant : garçon fort; p. 2.350. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état, 12 février.

3. — Coc..., 36 ans, entre le 21 mars 62. Constitution générale faible; bassin légèrement vicié; 5 filles à terme; sommet nat.; réglée à 14 ans; dernière époque menstr. 20 juin. Grossesse de 8 mois; premières douleurs 26 mars, 8 h. m.; rupt. membr. 11 h. m.; dilat. complète 11 h. m.; sommet O. I. G. A.; accouchement nat. 11 h. et demie mat.; durée totale du travail 3 h. et demie; délivr. nat. Enfant : garçon fort; p. 2.100. Suites de couches : métrite. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état, 7 avril.

4. — Mar..., 34 ans, entre le 24 mai 62. Constitution générale bonne; bassin légèrement vicié; primipare; réglée à 17 ans, régul.; dernière époque 28 août. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 12 juin, 6 h. m.; rupt. membr. 1 h. m.; dilat. complète (?); sommet O. I. D. P.; accouchement 13 juin, 9 h. s., par le forceps; déchirure du périnée; durée totale du travail 32 h. Enfant : garçon né mort; p. 3.450. Suites de couches : péritonite. Mort le 25 juin.

5. — Pil..., 24 ans, entre le 6 août 62. Constitution générale bonne; bassin légèrement vicié; 2 filles à termes : 1 nat., 1 artific.; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque 20 novembre. Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs 14 août, 10 h. s.; rupt. membr. (?); dilatat. complète minuit et demi; sommet, avec un pied, O. I. G. A.; accouchement nat. 15 août, 1 h. m.; durée totale du travail 3 h.; délivr. nat. Enfant : fille, née morte; p. 2.700. Suites de couches : embarras gastrique. Sortie en bon état le 30 août.

6. — Nau..., 24 ans, entre le 6 septembre 62. Constitution générale bonne; bassin légèrement vicié; 1 fille à terme; sommet nat.; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque 15 déc. Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs 7 sept., 11 h. m.; rupt. membr. 5 h. et demies.; dilat. complète idem.; sommet, 1 circulaire, O. I. G. A.; accouchement nat. 6 h. s.; durée totale du travail 7 h.; délivr. nat. Enfant : fille forte; p. 2.500. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état, le 20 sept.

7. — Lar..., 26 ans, entre le 18 nov. 62. Constitution générale bonne; bassin légèrement vicié; 1 garçon à terme; sommet nat.; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque 14 février. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 18 nov., 5 h. et demie m.; rupt. membr. (?); dilat. complète 9 h. m.; sommet O. I. D. P. réduite; accouch. nat. 18 nov., 11 h. m.; durée totale du travail 6 h.; délivr. nat. Enfant : garçon fort, p. 3.200. Suites de

couches : escarres aux grandes lèvres. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état, le 27 nov.

8. — Lan..., 24 ans, entre le 8 nov. 61. Constitution générale bonne ; bassin légèrement rétréci ; 1 garçon à terme, s. n. ; réglée à 16 ans, régul. ; dernière époque menstr. 24 avril. Grossesse de 9 mois ; premières douleurs 5 février, 5 h. m. ; rupt. membr. 2 h. s. ; dilat. complète 6 février, 9 h. m. ; sommet O. I. G. A. ; application de forceps 9 h. m. ; durée totale du travail 29 h. Enfant : fille née morte ; p. 3.500. Suites de couches nat. Sortie de la mère en bon état, 16 février.

9. — Boc..., 20 ans, entre le 14 avril 61. Constitution générale bonne ; bassin légèrement vicié ; 1 fille à terme ; extrémité pelvienne nat. ; réglée à 12 ans, régul. ; dernière époque menstr. 15 juillet. Grossesse de 9 mois ; premières douleurs 15 avril, 2 h. s. ; rupt. membr. 10 h. et demie s. ; dilat. complète 16 avril, minuit ; sommet O. I. G. A. ; accouch. nat. 1 h. m. ; durée totale du travail 11 h. Enfant : garçon fort ; p. 4.150. Suites de couches : fièvre et diarrhée. Sortie de la mère en bon état, et de l'enfant avec ophthalmie.

10. — Chev..., 18 ans, entre le 28 sept. 61. Constitution moyenne ; bassin légèrement vicié ; primipare ; réglée à 15 ans, régul. ; dernière époque 2 janvier. Grossesse de 8 mois ; premières douleurs 28 sept., 3 h. m. ; rupt. membr. 10 h. m. ; dilat. complète 10 h. m. ; sommet, 1 circulaire, O. I. G. A. ; accouch. nat. 10 h. et demie m. ; durée totale du travail 7 h. et demie ; délivr. nat. Enfant : garçon fort ; p. 2.300. Suites de couches : embarras gastrique. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état, le 3 oct.

11. — Vil..., 27 ans, entre le 8 oct. 61. Constitution faible ; bassin légèrement vicié ; 2 jumeaux (filles) avant terme, siéges, spontanés ; réglée à 19 ans, régul. ; dernière époque 15 déc. Grossesse de 6 mois et demi ; premières douleurs 7 oct., 10 h. m. ; rupt. membr. 8 oct., 11 h. et demie m. ; dilat. complète 1 h. et demie s. ; sommet O. I. G. A. ; accouch. nat. 1 h. et demie s. ; durée totale du travail 27 h. et demie. Enfant : garçon, mort ; p. 1.450. Suites de couches : métrite. Sortie de la mère en bon état, le 16 octobre.

12. — Dez..., 30 ans, entre le 1er nov. 61. Constitution générale bonne ; bassin légèrement vicié ; 2 filles, dont 1 avant terme ; sommet nat. ; réglée à 13 ans, irrégul. ; dernière époque 8 février. Grossesse de 8 mois ; premières douleurs 1er nov., 10 h. m. ; rupt. membr. 9 h. s. ; dilat. complète 9 h. et demie s. ; sommet O. I. G. A. ; accouch. nat. 10 h. s. ; durée totale du travail 12 h. ; délivr. nat. Enfant : garçon assez fort ; p. 2.350. Suites de couches : embarras gastrique fébrile. Sortie de la mère en bon état, et de l'enfant avec ophthalmie, 8 nov.

13. — Sai..., 43 ans, entre le 18 nov. 61. Constitution générale bonne; bassin légèrement vicié; 1 garçon à terme; sommet, forceps; réglée à 18 ans, régul.; dernière époque 10 mars. Grossesse de 7 mois et demi; premières douleurs 18 nov., 6 h. s.; rupt. membr. ignorée; dilat. complète 8 h. s., 19 nov.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. 8 h. et demie s.; durée totale du travail 14 h. et demie; délivr. nat. Enfant : fille moyenne; 2.000. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état, le 28 nov.

14. — Ves..., 23 ans, entre le 2 déc. 61. Constitution bonne; bassin légèrement vicié; 1 garçon à terme; céphalotripsie et version; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque menstr. (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs 2 déc., 1 h. s.; rupt. membr. 5 h. s.; dilat. complète 6 h. et demie s.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. 8 h. s.; durée totale du travail 7 h. Suites de couches : fièvre. Mort de l'enfant le 3 déc. (céphalématome). Sortie de la mère, non guérie, le 10 déc.

15. — Nic..., 28 ans, entre le 22 avril 64. Constitution bonne; bassin légèrement rétréci; primipare; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque menstr. 25 juillet. Grossesse de 8 mois et demi; apparition des premières douleurs 20 avril, 10 h. m.; rupt. membr. id.; dilat. complète 23 avril, 1 h. trois quarts m.; présent, siége, S. I. G. A.; fièvre, ralentissement, faiblesse des contract.; mort du fœtus; extraction de l'enfant 4 h. trois quarts m.; durée totale du travail 64 h. trois quarts. Enfant : fille morte; p. 2.620; délivr. nat. Suites de couches nat. Sortie de la mère, le 5 mai, en bon état.

16. — Prov..., 26 ans, entre le 13 juillet 64. Rachitique; A. S. V. *difficilement accessible*; primipare; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque fin sept. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 10 juillet, 5 h. m.; rupt. membr. 12 juillet, 9 h. s.; dilat. complète 13 juillet, 7 h. trois quarts s.; sommet O. I. D. P.; 9 h. s., applicat. du forceps au détroit inférieur, rotation de la tête, déchirure incomplète du périnée; durée totale du travail 88 h.; délivr. nat. Enfant : fille forte vivante; p. 3.050. Suites de couches nat. Enfant mort le 17 juillet. Sortie de la mère, incomplétement rétablie, le 20 juillet.

17. — Mar..., 23 ans, entre le 18 nov. 65. Constitution générale bonne; bassin légèrement vicié; primipare; réglée à 18 ans, régul.; dernière époque 28 mars. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 30 déc., 2 h. m.; rupt. membr. 6 h. m.; dilat. complète 8 h. m.; sommet O. I. D. P. réduite; accouch. nat. 9 h. et demie m.; durée totale du travail 7 h. Enfant : garçon faible; p. 2.900; mort le 31 déc. Suites de couches : fièvre. Sortie de la mère en bon état, le 15 janvier.

18. — Gui..., 28 ans, entre le 5 juillet 65. Rachitique; bassin légèrement rétréci; 1 fille et 1 garçon, présent. sommet.; accouch. nat.; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque menstr. (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs, 5 juillet, 1 h. m.; rupt. membr., 6 juillet, 4 h. et demie s.; dilat. complète, id.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat., 4 h. 40 s.; durée totale du travail, 15 h. 40; délivr. nat. Enfant: fille forte vivante; p. 3.720. Suites de couches : métro-péritonite, manie puerpérale ; mort. Sortie de l'enfant en bon état, le 15 juillet.

19. — Lef..., 28 ans et demi, entre le 16 janvier 1867. Bonne constitution (?). A. S. V. facil. accessible; diam.: S. P. 0,098; a eu un garçon avant terme, s. n. Réglée à 18 ans, irrégul.; dernière époque (?). Grossesse de 8 mois; premières douleurs le 9 janvier, à 11 h. et demie m.; rupt. des memb. le 10 janvier, 4 h. et demie s.; dilatation complète, id.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. à 4 h. et demie s.; durée totale du travail, 23 h.; déliv. nat. Fille forte, p. 2.430. Suites de couches : cystite et phlébite de la jambe gauche. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état, le 20 février.

20. — Dio..., 30 ans, entre le 16 janvier 1867. Bonne constitution; angle S. V.; difficil. accessible; primipare; réglée à 19 ans et demi; dernière époque le 27 mars. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 16 janvier, 10 h. m.; rupt. des membr., 5 h. m.; dilatat. complète, le 17 janvier, 5 h. s.; sommet O. I. G. A.; accouch. par forceps au dét. sup., à 5 h. et demie s.; durée totale du travail, 31 h. ; délivr. nat. Garçon faible, p. 3.050; infection purulente. Mort de la mère le 5 mars. Mort de l'enfant 2 h. après la naissance.

21. — Geu..., 25 ans, entre le 2 février 1867. Bonne constitution; lég. rétréciss.; un garçon à terme, s. n.; réglée à 12 ans, régul.; dernière époque le 20 mai. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 2 février, 2 h. m.; rupt. des membr., minuit et demi; dilat. complète 10 h. m.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. 10 h. m.; durée totale du travail, 8 h.; délivr. nat. Garçon fort, p. 3.550. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant bien portants, le 11 février.

22. — Pr..., 19 ans, entre le 11 février 1867. Bonne constitution A. S. V.; facil. accessible; primipare; réglée à 13 ans, régul.; dernière époque le 2 juin. Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs le 6 mars, 5 h. s.; rupt. artif. des membr., 5 h. s.; dilat. complète, 6 h. et demie s.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat., 7 h. s.; durée totale du travail, 26 h.; délivr. nat. Garçon fort, p. 2.600. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état, le 19 mars.

23. — Pép..., 26 ans, entre à la Maternité le 30 juillet 1868. Bien consti-

tuée. L'articulation S. V. est difficil. accessible; primipare; réglée à 16 ans et régulièrement; dernière époque 12 octobre. Grossesse actuelle de 9 mois; premières douleurs le 30 juillet; rupt. artif. des membr. le 31 juillet, à 8 h. 40 s.; dilat. complète le 3 août, à 1 h. m.; présenta ion du sommet O. I. G. A.; accouch. artif. à 4 h. m. (application de forceps au détroit inférieur; utérus mou); durée totale du travail, 100 h. Mort de l'enfant (fille pesant 3.850 grammes); délivr. nat.: métrite purulente. Mort de la mère le 4 août.

24. — Goi..., 40 ans, entre le 15 mai 1868. Bien constituée; bassin lég. rétréci. par aplatissement du sacrum; primipare; réglée à 11 ans et régulièrement; dernière époque ignorée. Grossesse actuelle de 8 mois et demi, premières douleurs le 13 juin, à 2 h. m.; à 5 h. et demie, rupt. des membr.; dilat. complète à 4 h. s.; présentation du sommet O. I. G. A.; fin de l'accouchement à 11 h. s. par le rétroceps appliqué à la vulve et incisions postérieures; délivr. nat.; durée totale du travail, 21 h. et demie. Enfant : garçon faible, p. 2.020. Mort de la mère par péritonite généralisée le 20 juin. Enfant sort en bon état.

25. — Des..., 25 ans, entre le 4 février. Bonne constitution; bassin légèrement rétréci.; deux filles : une à terme, l'autre avant terme; sommet; réglée à 14 ans, irrégul.; dernière époque menstr. 15 mai. Grossesse de 8 mois et demi; apparition des premières douleurs 9 février, 8 h. m.; rupt. des membr. 5 h. s.; dilat. complète, 5 h. 25 s.; présent. sommet O. I. D. P. réduite; accouch. nat. 5 h. et demie s.; durée totale du travail, 9 h.; délivr. nat. Enfant : garçon faible, p. 2.340. Suites de couches nat. Mort de l'enfant 24 février. Sortie de la mère le 29 février en bon état.

26. — Ch..., 39 ans, entre le 5 mars 1866. Constitution forte; bassin un peu rétréci.; a eu un garçon à terme; une fille avant terme S. N.; réglée à 19 ans, régul.; dernière époque le 8 juin. Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs le 5 mars, 8 h. s.; rupt. des membr. 10 h. 25 s.; dilat. complète id.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. 10 h. et demi s.; délivr. nat. Garçon fort, p. 2.600 gr. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant bien portants le 16 mars.

27. — Duc..., 27 ans et demi, entre le 9 février 1866. Constitution forte; bassin lég. rétréci; a eu une fille à terme S. N.; réglée à 19 ans, irrégul.; dernière époque le 19 avril. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 9 février, 5 h. s.; rupt. artif. des membr. 11 h. et demie m.; dilat. complète 1 h. et demie s.; sommet O. I. G. A.; accouch. par forceps à 2 h. et demie s.; durée totale du travail, 9 h. et demie; délivr. nat. Garçon né mort, p. 3.150. Mort de la mère par péritonite le 14 février.

28. — Via..., 18 ans, entre le 2 février 1866. Constitution forte; bassin

légèrement rétréci ; primipare ; réglée à 15 ans, irrégul. ; dernière époque (?). Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs le 2 fév. à 4 h. m.; rupt. des membr. artif. à 6 et demie s.; dilat. complète à 9 h. s.; sommet O. I. D. A.; accouch. nat. à 9 et demie s.; durée totale du travail : 17 h. et demie; délivrance nat. Enfant : fille forte, p. 2.620. Suites de couches : albuminurie. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état, le 13 fév.

29. — Cou..., 30 ans, entre le 9 juin 1866. Bonne constitution; bassin légèrement rétréci; 1 garçon à terme, S. N.; réglée à 18 ans régul.; dernière époque, le 28 août. Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs le 9 juin, à 7 h. s.; rupt. des membr. à 5 h. s.; dilat. complète le 10 juin, à 5 h. et demie m.; sommet : O. I. G. A.; accouch. nat. à 6 h. m.; délivrance nat.; durée totale du travail, 10. h. Enfant : fille forte, p. 2.530. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état, le 12 juil.

30. — Bon..., 25 ans, entre le 29 mai 1866. Bonne constitution ; bassin légèrement rétréci; primipare; réglée à 13 ans, régul.; dernière époque le 4 août. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 9 juin, à 1 h. s.; rupt. des membr. (?); dilat. complète le 10 juin, à 6 h. et demie s.; sommet, O. I. G. A.; accouch. nat. à 9 h. s.; durée totale du travail 32 h.; délivrance nat. Enfant : garçon fort, p. 2.900. Suites de couches : phlegmon du lig. large. Sortie avec son enfant trop tôt, le 26 juin.

31. — Gué..., 34 ans et demi, entre le 11 janv. 1866. Constitution forte; bassin légèrement rétréci; a eu 1 garçon avant terme et 3 filles à terme; S. N.; réglée à 14 ans, irrégul.; dernière époque le 2 avril. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 13 janv. à 6 h. et demie m.; rupt. des membr. art. à 9 h. et demie m.; dilat. complète à 9 h. m.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. à 9 h. et demie m.; durée totale du travail, 3 h.; délivrance nat. Garçon, p. 2.720. Sortie de la mère et de l'enfant trop tôt, le 15 janv.

32. — Pet..., âgée de 22 ans, entre le 16 fév. 1866. Constitution forte; bassin légèrement rétréci; 1 enfant avant terme; réglée à 14 ans; dernière époque le 28 mai. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 19 fév., à 2 h. m.; rupt. artif. des membr. à 9 h. m.; dilat. complète à 1 h. s.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. à 2 h. s. ; durée totale du travail, 12 h.; délivrance nat. Fille forte, p. 2.830. Suites de couches nat. Sortie de la mère en bon état, le 26 fév. Enfant mort le 21 fév.

33. — Lem..., 29 ans, entre le 8 mai 1865. Constitution forte; bassin légèrement rétréci; réglée à 11 ans, régul.; a eu 1 garçon avant terme; S. N. dernière menstruation, le 28 août. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 6 juin, à 2 h. m.; rupt. des membr. à 1 h. et demie s.; dilat.

complète à 2 h. s.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. à 2 h. et demie s; durée totale du travail, 12 h. et demie; délivrance nat. Fille forte, p. 3.360. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état, le 13 juin.

34. — Pav..., 18 ans, entre le 26 août 1865. Constitution forte; bassin légèrement rétréci; primipare; réglée à 16 ans, régul.; dernière époque le 10 déc. Grossesse de 8 mois; premières douleurs le 25 août, à 8 h. m.; rupt. des membr. le 26 août, à 6 h. s.; dilat. complète, idem, sommet, O. I. G. A.; accouch. nat. à 6 h. s.; durée totale du travail 10 h.; délivrance nat. Fille forte, p. 2.800. Suites de couches : eschares vulvaires. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 5 sept.

35. — Gra..., 27 ans, entre le 24 sept. 1864. Constitution forte; bassin légèrement vicié; 2 filles à terme S. N.; réglée à 16 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois (pneumonie); premières douleurs le 16 janvier 1865, à 2 h. s.; rupt. art. des membr. à 5 h. et demie s.; dilat. complète à 6 h. s.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. à 6 h. 35 s.; durée totale du travail : 4 h. et demie; délivrance nat. Fille, forte, p. 3.750. Suites de couches : métrite. Sortie de la mère en bon état le 30 janvier. Enfant bien portant.

36. — Cha..., 20 ans, entre le 27 septembre 1865. Constitution faible; bassin légèrement rétréci; primipare; réglée à 19 ans et demi; dernière époque (?). Grossesse de 8 mois; premières douleurs le 30 décembre, 6 h. s; rupt. des membr. le 31 décembre, 7 h. et demie m.; dilatat. complète 7 h. trois quarts mat.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat., 8 h. m.; durée totale du travail, 14 h.; délivr. nat. Garçon faible, p. 2.030. Suites de couches : phlébite; lésions du périnée. Mort de la mère le 9 mars 1866.

37. — Bro..., 22 ans, entre le 4 décembre 1865. Constitution forte; bassin lég. rétréci; primipare; réglée à 10 ans, régul.; dernière menstruation le 16 avril. Grossesse de 7 mois et demi; premières douleurs le 7 décembre à midi; rupt. des membr. id.; dilatat. complète le 8 décembre, 6 h. et demie m.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. à 6 h. et demie m.; durée totale du travail 18 h. et demie. Suites de couches nat. Enfant : fille faible, p. 1.920, qui meurt le 16 décembre. Sortie de la mère en bon état le 26 décembre.

38. — Lel..., 29 ans, entre le 20 octobre 1865. Bassin légèrement rétréci.; deux garçons à terme, s. n.; réglée à 16 ans, régul.; dernière époque, 15 janvier; grossesse actuelle de 9 mois; premières douleurs 19 octobre, 10 h. s.; rupt. des membr. prématurée, 14 octobre, 9 h. m.; incisions multiples sur l'orifice contracturé, 20 octobre, 9 h. s.; sommet

Librairie ADRIEN DELAHAYE, place de l'École-de-Médecine, 23,
A PARIS.

LEÇONS THÉORIQUES ET CLINIQUES

SUR LES

AFFECTIONS GÉNÉRIQUES

DE LA PEAU

PROFESSÉES

PAR LE DOCTEUR BAZIN

Médecin de l'hôpital Saint-Louis, chevalier de la Légion d'honneur, etc

RÉDIGÉES ET PUBLIÉES

PAR LES DOCTEURS E. BAUDOT ET L. GUÉRARD

Anciens internes de l'hôpital Saint-Louis.

REVUES ET APPROUVÉES PAR LE PROFESSEUR.

2 vol. in-8°. PRIX : 11 fr.

Le *Traité des affections génériques de la peau* se sépare complétement, par sa forme et par son but, des autres publications de M. Bazin. C'est un ouvrage tout à fait à part, et véritablement sans précédent dans la littérature dermatologique.

Son titre indique suffisamment le point de vue auquel s'est placé son auteur. Rejetant sur un second plan les questions de cause et de nature, il a pris pour point de départ l'affection cutanée telle que l'enseigne la tradition de Willan. La chose reste la même, sa signification seule a changé : entité morbide de la peau pour Willan et ses disciples, c'est-à-dire espèce morbide toujours identique et indécomposable, *affection générique* pour M. Bazin, c'est-

à-dire phénomène relatif et contingent, symptôme commun à des états pathologiques très-divers.

Expliquons par un exemple la pensée de l'auteur.

Soit l'eczéma. Ce mot rappelle à l'esprit cet ensemble bien connu de phénomènes qui constituent l'eczéma comme affection *sui generis* entre toutes les autres affections de la peau. Voilà le genre, l'affection générique. Mais l'eczéma peut traduire à la peau des causes morbifiques nombreuses, et l'on sait combien ces causes sont puissantes pour en modifier l'aspect et l'allure, par le cachet de spécificité qu'elles lui impriment : de là autant d'affections différentes, et qui toutes réclament une place bien distincte dans le cadre nosologique. Ce sont les espèces du genre.

L'affection générique n'est pas autre chose, absolument parlant, qu'une sorte de résultante ou d'affection-type formée des caractères communs à toutes les espèces qui servent à la constituer : abstraction pure, je le veux bien, mais abstraction qui se dégage entre une telle évidence que les auteurs l'ont prise pour la réalité.

Quelques mots maintenant sur le plan de l'ouvrage, son esprit, ses divisions. Je les emprunte à un article publié tout récemment dans *l'Union médicale* par M. le docteur de Piétra Santa.

« Chaque affection cutanée générique est l'objet de quatre chapitres.

» Le premier est consacré à l'histoire du genre, du symptôme-affection considéré au point de vue de sa forme élémentaire, de son siége, de son évolution, de son diagnostic, de son pronostic et de son traitement. C'est la partie descriptive proprement dite, le fait d'observation pure, le fond commun et à peu près invariable sur lequel vont se détacher toutes les doctrines.

» L'affection générique une fois connue et décrite,

comme individualité distincte, il s'agissait de lui assigner sa place dans le cadre nosologique, et de déterminer le nombre des espèces et variétés qu'elle pouvait comprendre.

» C'est à ce moment (deuxième et troisième chapitres) que l'éminent professeur fait comparaître à la barre tous les dermatologistes les plus distingués. Il nous montre, d'une part, l'école anatomique de Willan, représentée par Bateman, Biett, Rayer, Cazenave, Gibert, Devergie, d'autre part, l'école de Lorry et d'Alibert, avec ses disciples Baumès, Gintrac et Hardy.

» Il va sans dire que M. Bazin se pose en arbitre entre les deux écoles rivales; et après les avoir opposées l'une à l'autre, après avoir montré leurs divergences, indiqué leurs erreurs, constaté les vices de leurs classifications, il expose dans le quatrième chapitre ses propres idées, initie le lecteur à ses doctrines, précise la place que doivent occuper dans sa classification et le genre et l'espèce. »

Or, tout ceci se répète à propos de chaque affection cutanée.

Tel est, en deux mots, le *Traité des affections génériques de la peau*, ouvrage éminemment classique et pratique, puisqu'il représente, dans son acception la plus large, l'état actuel de la science.

L'élève y trouve un guide assuré pour se diriger dans l'étude si difficile des affections de la peau, et le praticien des indications toujours simples et faciles à saisir pour répondre aux besoins de sa thérapeutique.

CHEZ LE MÊME ÉDITEUR :

Revue photographique des hôpitaux de Paris, journal publié sous le patronage de l'administration de l'assistance publique; un numéro par mois de 10 pages et 3 photographies. Prix du numéro, 2 fr., et de l'abonnement pour la France, 20 fr.; étranger, 25 fr.

OUVRAGES DU MÊME AUTEUR

QUI SE TROUVENT CHEZ LE MÊME ÉDITEUR.

Leçons sur la scrofule, considérée en elle-même et dans ses rapports avec la syphilis, la dartre et l'arthritis. 1 vol. in-8; 2e édition, revue et considérablement augmentée. Paris, 1861..... 7 fr. 50

Leçons théoriques et cliniques sur les affections cutanées parasitaires, professées à l'hôpital Saint-Louis par le docteur BAZIN, rédigées et publiées par A. POUQUET, interne des hôpitaux, revues et approuvées par le professeur. 2e éd., revue et augmentée. 1 vol. in-8 orné de 5 pl. sur acier. 1862..... 5 fr.

Leçons théoriques et cliniques sur la syphilis et les syphilides, professées à l'hôpital Saint-Louis par le docteur BAZIN. 2e édit., publiée par le docteur DUBUC, ancien interne de l'hôpital Saint-Louis, revue et approuvée par le professeur. Paris, 1866. 1 vol. in-8, accompagné de 4 magnifiques planches sur acier, figures sépia..... 8 fr.
Figures coloriées. 10 fr.

Leçons théoriques et cliniques sur les affections cutanées de nature arthritique et dartreuse considérées en elles-mêmes et dans leurs rapports avec les éruptions scrofuleuses, parasitaires et syphilitiques, professées à l'hôpital Saint-Louis par le docteur BAZIN, 2e édit., très-augmentée, rédigée et publiée par le docteur BESNIER, revue et approuvée par le professeur. Paris, 1868. 1 vol. in-8..... 7 fr.

Leçons théoriques et cliniques sur les affections cutanées artificielles et sur la lèpre, les diathèses, le purpura, les difformités de la peau, etc., professées à l'hôpital Saint-Louis par le docteur BAZIN, recueillies et publiées par le docteur GUÉRARD, ancien interne de l'hôpital Saint-Louis, revues et approuvées par le professeur. Paris, 1862. 1 vol. in-8..... 6 fr.

Examen critique de la divergence des opinions actuelles en pathologie cutanée, professées à l'hôpital Saint-Louis par le docteur BAZIN, rédigées et publiées par le docteur LANGRONNE, revues par le professeur. 1 vol. in-8. Paris, 1866..... 3 fr. 50

Leçons sur le traitement des maladies de la peau par les eaux minérales. 1 vol. in-8. Paris, 1870.....

Paris. — Imprimerie de E. MARTINET, rue Mignon, 2.

O. I. G. A.; terminaison à 9 h. et demie s., par crâniotomie, céphalotripsie et extraction avec la pince Simpson. Durée totale du travail, 23 h. et demie; déliv. nat. Enfant : fille, p. 2.370. Suites de couches : phlegmon de la fosse iliaque gauche. Sortie de la mère en bon état le 23 novembre.

39. — Ber..., 20 ans, entre le 15 avril. Constitution faible; bassin légèrement rétréci; primipare; réglée à 16 ans, irrégulièr.; dernière menstruation le 16 juillet 1864. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 13 avril, 5 h. m.; rupt. des membr. artif. le 14 avril, 3 h. s.; dilatation complète le 15 avril, 5 h. et demie m.; sommet seul O. I. D. P., non réduite; accouch. naturel à 8 h. m.; durée totale du travail 51 h.; délivr. nat. Garçon faible, p. 3.600, meurt le 15 mai. La mère, après complication de bronchite, sort en bon état le 4 mai.

40. — Bar..., 30 ans, entre le 9 juin 1865. Constitution forte; bassin lég. rétréci, a eu artif. une fille à terme S.; réglée à 14 ans, irrégulièr.; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 8 juin 8 h., s.; rupt. des membr. (?) dilatation complète le 9 juin, 11 h. m.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. à 1 h. et demie s.; durée totale du travail 17 h. et demie; délivr. nat. Fille faible, p. 3.450. Mort de l'enfant le 11 juin. Suites de couches nat. Sortie de la mère en bon état le 17 juin.

41. — Dum..., 23 ans, entre le 9 février 1864. Constitution générale, bonne; bassin légèrement vicié; un garçon à terme; sommet nat.; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque 12 mai. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 9 février, 8 h. m.; rupt. membr. 9 février, 11 h. et demie m.; dilat. complète 4 h. et demie s.; sommet O. I. D. P.; accouchement nat. 5 h. s.; durée totale du travail, 8 h. et demie. Enfant : garçon fort, p. 3.300. Suites de couches : métrite. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 22 février.

42. — Vid..., 30 ans, entre le 6 novembre 1864. Un garçon et une fille à terme; sommet nat.; réglée à 18 ans; bassin légèrement vicié; dernière époque, 25 février. Grossesse de 9 mois; premières douleurs, 8 novembre, 8 h. et demie s.; rupt. membr. 9 novembre, 5 h. m.; dilat. complète, 5 h. et demie m.; sommet, O. I. G. A.; accouchement nat. 5 h. et demie m.; durée totale du travail, 9 h. et demie; délivr. nat. Enfant : fille forte, p. 3 k. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état 26 novembre.

43. — Led..., 27 ans, entre le 3 novembre 64. Rachitique; bassin légèrement vicié; primipare; réglée à 21 ans, régul.; dernière époque 15 février. Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs 11 novembre, 2 h. m.; rupt. membr. 9 novembre, 8 h. m.; dilat. complète

11 novembre, 7 h. m.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. 7 h. et demie m.; durée totale du travail, 5 h. et demie. Suites de couches : eschares de la vulve. Enfant : garçon, p. 2.700. Mort 15 novembre. Sortie de la mère en bon état 30 novembre.

44. — Mo..., 40 ans, entre le 18 mars 64. Constitution générale, bonne; bassin légèrement vicié; un garçon et une fille à terme; sommet nat.; réglée à 19 ans, régul.; dernière époque, 12 février. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 17 novembre, 11 h. s.; rupt. membr. 7 h. s.; dilat. complète 18 novembre, 1 h. s.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. 1 h. et demie s.; durée totale du travail, 14 h. et demie. Enfant : fille forte, p. 3.120. Suites de couches : métro-péritonite. Morte 4 décembre.

45. — St..., 24 ans, entre le 9 novembre 64. Scrofuleuse; primipare; bassin légèrement rétréci; A. S. V. difficilement accessible, menstruation régul.; réglée à 10 ans; dernière époque, 9 février, Grossesse de 9 mois; premières douleurs 9 novembre, 11 h. s.; rupt. membr. 10 novembre, 3 h. m.; sommet O. I. D. P.; 6 h. et demie s., incisions à l'orifice utérin et forceps; délivr. nat. Enfant : fille, forte. p. 2,950. Suites de couches : métro-péritonite. Mort de l'enfant 11 novembre, et de la mère 17 novembre.

46. — Du..., 22 ans, entre le 29 septembre 64. Constitution générale, bonne; bassin légèrement rétréci; primipare; réglée à 13 ans, régul.; dernière époque, 8 janvier. Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs 3 octobre, 10 h. s.; rupt. membr. 4 octobre, 10 h. m.; dilat. complète, 10 h. m.; sommet O. I. D. P., réduite; accouchement 12 h. et demie m. nat.; durée totale du travail, 13 h. et demie; délivr. nat. Enfant : garçon, p. 2.910. Suites de couches, métrite. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état 14 obtobre.

47. — Hu..., 24 ans, entre le 4 octobre. Constitution générale, bonne; bassin légèrement vicié; un enfant à terme; accouch. artif.; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque, 2 janvier. Grossesse 8 mois et demi; premières douleurs 7 octobre, 7 h. m.; rupt. membr., 6 h. m.; dilat. complète, 2 h. et demie s.; sommet, 1 circulaire, O. I. G. A.; accouch. nat., 3 h. s.; durée totale du travail, 8 h.; délivr. nat. Enfant : garçon fort, p. 2.550. Suites de couches nat. Sortie en bon état de la mère et de l'enfant 14 octobre.

48. — Her..., 22 ans, entre le 25 septembre 64. Constitution générale, bonne; bassin légèrement rétréci; une fille à terme; sommet nat.; réglée à 16 ans, régul.; dernière époque (?) Grossesse de 9 mois; premières douleurs, 25 septembre 11 h. m.; rupt membr. id.; dilat. complète, 3 h. et demie s.; sommet O. I. G. A.; acc. nat. 3 h. et demie s.; durée totale

du travail, 4 h. et demie; délivr. nat. Enfant: garçon fort, p. 3,400. Suites de couches : métro-péritonite. Morte 7 octobre.

49. — Dar..., 23 ans, entre le 21 mars 64. Constitution bonne ; bassin légèrement rétréci ; primipare ; réglée à 15 ans, régul. ; dernière époque, 13 juin. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 26 mars, 4 h. m. ; rupt. membr., 8 h. et demie m. ; dilat. complète, 1 h. s. ; sommet, O. I. D. A. ; accouch. nat., 2 h. s. ; durée totale du travail, 10 h. ; délivr. nat. Enfant : garçon, p. 3.080. Suites de couches : abcès du sein. Mort de l'enfant 14 juin. Sortie de la mère en bon état, 16 juin.

50. — Deb..., 25 ans, entre le 1er mai 1863. Constitution forte ; diam. S. S. P. 0m,11 ; primipare ; réglée régulièrement à 19 ans; dernière menstruation le 15 juillet. Grossesse actuelle de 8 mois et demi ; premières douleurs le 1er mai à 2 h. m. ; rupt. membr. à 10 h. s. ; dilat. complète à 10 h. et demie s. ; sommet, O. I. G. A. ; accouch. nat. le 2 mai, à 2 h. m. ; durée totale du travail, 24 h. ; délivr. nat. Garçon fort, p. 2.600. Suites de couches compliquées de pneumonie. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 13 mai.

51. — Mas..., 20 ans, entre le 20 août 69. Constitution générale, bonne ; diam. S. S. P. 0m,105 ; primipare ; réglée à 18 ans, régul. ; dernière époque, 13 janvier. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 13 octobre, 11 h. et demie s. ; rupt. membr : 1re poche spont., 11 h. et demie s. ; 2e poche, artific., 14 octobre 9 h. 35 m. ; dilat. complète, 4 h. et demie m. ; 1er né ; siége décomplété, S. I. G. A. ; 2e né; sommet O. I. D. P., réduite; 1re extraction, 9 h. un quart m. ; 2e, forceps, 10 h. 35' ; durée totale du travail, 11 h. ; délivr. nat. Suites de couches : métrite légère, escarres vulvaires très étendues. Sortie de la malade en bon état 20 novembre. 1re née morte, p. 2.330 ; 2e née, faible; p. 2.150. morte quelques jours après.

52. — Ved..., 29 ans, entre le 2 février. Constitution bonne ; primipare; diam. S. S. P. 0m,11 ; réglée à 14 ans et demi, régul. ; dernière époque (?) Grossesse de 9 mois; premières douleurs 2 février, 8 h. m. ; rupt. membr. artif. 3 février, une h. et demie m. ; dilat. complète, id. ; sommet, une circulaire autour du cou, O. I. G. A., 11 h. m. ; applicat. du forceps au détroit supér. ; durée totale du travail, 23 h. ; délivr. nat. Enfant : garçon, p. 3.250. Mort 40 h. après. Suites de couches : fièvre puerpérale. Mort 18 février.

53. — Des..., 28 ans, entre le 17 février 1866. Constitution forte; bassin légèrement rétréci ; diam. S. S. P. 0m,10 ; primipare ; réglée à 18 ans ; dernière époque, le 10 juin. Grossesse de 9 mois ; premières douleurs le 18 février, 7 h. m. ; rupt. des membr., une h. et demie s. ; sommet, O. I

G. A.; accouch. nat., 2 h. s.; durée totale du travail, 7 h.; délivr. nat. Suites de couches : métro-péritonite et phlébite utérine. Morte le 23 février.

54. — Ber..., 25 ans, entre le 12 septembre 66. — Constitution bonne; A. S. V. accessible; diam. S. S. P. 0m,10; 3 filles à terme, nat.; réglée à 10 ans et demi, régul.; dernière époque(?). Grossesse de 8 mois et demi.; hydramnios; premières douleurs 12 septembre, 6 h. m.; rupt. membr., 11 h. m.; dilat. complète, id.; sommet, avec un pied (rétropulsion), O. I. G. A.; accouch. nat., 2 h. et demie s.; durée totale du travail, 9 h.; délivr. nat. Enfant : garçon, fort, p. 2.670. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état, 22 septembre.

55. — Pe..., entre le 24 février 70. Rachitique; diam. S. S. P. 0m,10; primipare, réglée à 16 ans, régul.; dernière époque, 28 avril. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 19 février, 9 h. s; rupt. des membr., id.; dilat. complète(?) sommet, O. I. D. P., non réduite; un accès d'éclampsie avant l'accouch.; forceps au detroit inférieur, 24 février 4 h. 20 s.; durée totale du travail, 11 h. et demie; délivr. artificielle. Enfant : fille forte, p. 3.235, morte pendant le travail. Mère guérie.

56. — Bau..., entre le 25 février 70. Constitution bonne; diam. S. S. P. 0m,105; primipare; réglée à 18 ans, régul.; dernière époque, 25 juin. Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs, 29 mars 8 h. m.; rupt. des membr., 1 h. s.; dilat. complète, 2 h. s.; sommet, O. I. G. A.; accouch. nat., 3 h. et demie s.; durée totale du travail, 7 h. et demie; délivr. nat. Enfant : garçon, p. 2.500; faiblesse congénitale; né en état de mort apparente, ranimé. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état.

57. — Chauv..., entre le 1er mars 1870. Rachitique; diam. S. S. P. 0m,10; 1 garçon à terme; sommet N., 2 avortements, l'un de 6 semaines, l'autre de 5 mois; réglée à 16 ans, irrégul.; dernière époque, 1er mai. Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs 6 mars, 7 h. m.; rupt. des membr., une h. s.; dilat. complète 7 mars, 9 h. 45' m.; siége décomplété (fesses), S. I. D. A.; accouch. par le forceps, 9 h. 45 m.; durée totale du travail, 26 h. 45; délivr. artific.; légère hémorrhagie avant la délivrance. Enfant : fille faible, p. 2.500. Suites de couches nat. Mère et enfant en bon état.

58. — Gir..., entre le 8 mai 70. Rachitique; diam. S. S. P. 0m,10; réglée à 13 ans, irrégul.; dernière époque le 30 juillet. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 10 mai, 8 h. s.; rupt. artific. des membr. le 13 mai, 11 h. m.; sommet O. I. G. T.; forceps avant la dilat. complète, pour cause de l'altération des battements du cœur, 5 h. et demie s.; durée totale du travail, 51 h. et demie; délivr. nat. immédiatem. après

hémorrhagie de 600 gr. Enfant : garçon fort, p. 3.200. Suites de couches nat. Sortie de la mère et le l'enfant en bon état.

59. — Mo..., entre le 3 janvier 70. Constitution générale, bonne; diam. S. S. P. 0m,105; primipare; réglée à 17 ans et demi; dernière époque, 8 avril. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 5 janvier, à midi; rupt. membr. artific. 6 janvier, 3 h. et demie m.; dilat. complète, id.; sommet, O. I. G. A.; accouch. nat., 4 h. m.; durée totale du travail, 16 h.; délivr. nat. Enfant : garçon, fort, p. 3.495. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état.

60. — Lar..., entre le 25 janvier 70. Bonne constitution; diam. S. S. P. 0m,10; 2 garçons à terme; sommet, forceps; réglée à 18 ans, régul.; dernière époque, 18 mai. Grossesse actuelle de 8 mois; premières douleurs 25 janvier, 6 h. m.; rupt. membr. 26 janvier, 3 h. un quart m.; dilat. complète, 3 h. et demie; siége (mode des pieds); S. I. D. P., réduite; accouch. nat., 4 h. et demie m.; durée totale du travail, 10 h.; délivr. nat. Enfant : fille, morte, p. 2.150. Suites de couches : scarlatine. Sortie en bon état, 8 février.

61. — Gil..., 28 ans, bien constituée, admise 5 novembre 67. Une fille avant terme : présent. pelvienne, accouch. artific.; réglée à 18 ans, régul.; dernière époque, 2 mars. Grossesse de 8 mois; diam. S. S. P. 0m,10; premières douleurs 3 décembre, 6 h. m.; rupt. des membr. 2 décembre, 5 h. m.; dilat. complète 3 décembre, 5 h. un quart s.; sommet; position O. I. D. P., réduite; accouch. nat. le 3 décembre, 5 h. et demie s.; durée totale du travail, 12 h.; délivr. nat. Enfant : garçon, faible, p. 2.000. Suites de couches : péritonite partielle. Sortie de la mère et de l'enfant le 2 janvier, en bon état.

62. — Br..., 29 ans, entre le 14 mars 63. Constitution générale, bonne; diam. S. S. P. 0m,10; une fille à terme, sommet nat.; réglée à 16 ans; dernière époque, 20 juin. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 15 mars, 11 h. s.; rupt. membr. (?); dilat. complète 17 mars, 4 h. m.; sommet, procidence du cordon, O. I. G. A.; accouch. nat., 5 h. et demie m.; durée totale du travail, 30 h. et demie; délivr. nat. Enfant : garçon, né mort, p. 2.800. Suites de couches : péritonite. Morte le 19 mars.

63. — Gros..., 24 ans, entre le 19 juin 1863. Constitution forte; bassin, diam. S. S. P. 0m,105; primipare; réglée à 18 ans; dernière menstruat. 10 octobre. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 20 août, 9 h. m.; rupt. des membr., 5 h. et demie s.; dilat. complète, le 21 août, 9 h. m.; sommet seul, O. I. D. P. réduit; accouch. par le forceps à 9 h. et demie m.; durée totale du travail, 24 h. et demie; délivr. nat. Fille morte, p. 300. Suites de couches : métro-péritonite. Mort de la malade, le 30 août.

64. — Froi..., 37 ans et demi, entre le 12 août 1863. Constitution forte; diam. S. S. P. 0m,10; a eu une fille et 2 garçons à terme, s. n.; réglée à 17 ans et demi, régul.; dernière menstruat., le 6 décembre. Grossesse actuelle de 8 mois; premières douleurs le 19 août, 6 h. s.; rupt. des membr. (?); dilat. complète, le 20 août; à 1 h. et demie m.; sommet seul, O. I. D. P., à 1 h. trois quarts; terminaison nat. de l'accouch.; durée totale du travail, 7 h. trois quarts; délivr. nat. Fille forte, p. 3.050. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant le 5 septembre, en bon état.

65. — M..., 30 ans, entre le 13 août 1863. Constitution forte; diam. S. S. P. 0m,101; accouchée artificiellement de 1 garçon; sommet; réglée a 10 ans; dernière menstruation(?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 19 août, 4 h. s.; rupt. des membr. le 20 août, 9 h. m.; dilat. complète à ce moment; épaule gauche, C. I. G. A.; version pelvienne à 9 h. 10; durée totale du travail, 17 h.; délivr. nat. Fille forte, p. 3.100. Suites de couches : fièvre puerpérale, érysipèle. Mort, le 25 août, de la mère et de l'enfant.

66. — Poi..., entre le 22 avril 1863. Constitution forte; diam. S. S. P. 0m,106; primipare; réglée à 15 ans et régul.; dernière menstruation, le 29 juillet. Grossesse actuelle de 9 mois; premières douleurs, le 29 avril, à 5 h. et demie m.; rupt. des membr. à 1 h. s.; sommet, O. I. G. A.; accouch. nat. le 29 avril, à 2 h. et demie s.; durée totale du travail, 9 h.; délivr. nat. Garçon fort, p. 2.850. Suites de couches compliquées de fièvre pendant quelques jours. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état, le 7 mai 1863.

67. — Serv..., 32 ans, entre le 10 avril 1863. Constitution forte; diam. S. S. P, 0m,102; primipare; réglée à 18 ans, régul.; dernière menstruat., le 20 juin. Grossesse actuelle de 9 mois; premières douleurs le 5 avril, à 3 h. m.; rupt. des membr. à 6 h. m.; dilat. complète, 4 h. s.; présentation du sommet, O I. G. A., à 7 h. et demie s.; terminaison naturelle de l'accouch.; durée totale du travail, 16 h. et demie; délivr. nat. Enfant : garçon fort, p. 3.750. Suites de couches naturelles. Sortie de la mère et de l'enfant le 27 avril, en bon état.

68. — Ri..., 25 ans, entre le 26 mai 1863. Constitution forte; diam. S. S. P. 0m,10; primipare ; réglée à 15 ans régul. ; dernière menstruation, le 21 août. Grossesse actuelle de 9 mois; premières douleurs le 4 juin, à 4 h. s.; rupt. des membr. le 5 juin, à 6 h. m.; à ce moment la dilatation est complète; sommet, O. I. D. P.; accouch. par la version pelvienne à 4 h. s.; durée totale du travail, 24 h.; délivr. nat. Garçon mort, p. 2.900. Suites de couches naturelles. Sortie de la mère en bon état, le 27 juin.

69. — Ben..., 23 ans, entre le 9 mai 1863. Constitution forte; diam.

S. S. P. 0m,10 ; accouchée d'un enfant à terme avec procidence du membre supérieur droit et extrait par le forceps; réglée à 11 ans, régul. ; dernière menstruation (?). Grossesse actuelle de 9 mois; premières douleurs le 10 mai, 9 h. m.; rupt. des membr. (?); dilat. complète le 11 mai, à 1 h. et demie s.; sommet O. I. G. A., avec procidence de l'avant-bras gauche; accouch. nat. à 2 h. s.; délivr. nat. Fille forte, p. 3.300. Suites de couches, compliquées de scarlatine. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 19 mai.

70. — Jac..., 28 ans, entre le 24 décembre. Constitution générale, bonne; diam. S. S. P. 0m,10; un avortement; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs 22 décembre, 11 h. s.; rupt. membr. (?); dilat. complète 24 décembre, 4 h. s.; sommet : 1 circulaire, O. I. G. A.; accouch. nat., 4 h. et demie s.; durée totale du travail, 17 h. et demie; délivr. nat. Enfant : garçon, p. 2.700. Suites de couches : fièvre, diarrhée. Sortie de la mère et de l'enfant en assez bon état, 5 janvier.

71. — Blau..., 22 ans, entre le 17 mars 1862. Constitution générale, bonne. (D. S. S. P., 0,10). Une fille à terme. Sommet nat. ; réglée à 15 ans, régul. ; dernière époque menstr, 26 juillet. Grossesse de 7 mois et demi ; premières douleurs, 18 mars, 8 h. s. ; rupt. membr. 8 h. s. ; dilat. complète 10 h. s. ; sommet seul. O. I. G. A.; accouchement nat. 10 h. et demie s.; durée totale du travail 2 h. et demie ; déliv. nat. Enfant : garçon, fort, p. 2.375. Suites de couches nat. Mort de l'enfant, 28 mars. Sortie de la mère en bon état, 29 mars.

72. — Bri...,26 ans, entre le 16 mai. Constitution générale bonne. (D. S. S. P. 0,10). Primipare ; réglée à 18 ans, régul.; dernière époque (?) Grossesse de 9 mois ; premières douleurs 17 mai, 11 h. et demie m. ; sommet 1 circulaire. O. I G. A. ; accouchement nat. 2 h. s. ; durée totale du travail 15 h.; déliv. nat. Enfant : Garçon, mort, p. 2.950. Suites de couches nat. Sortie en bon état, 26 mai.

73. — Bu..., 26 ans, entre le 27 mars 1862. Constitution générale, bonne. (D. S. S. P. 0,10). Un garçon à terme. Sommet nat.; réglée à 18 ans 3 jours ; dernière époque, 24 août. Grossesse de 9 mois ; premières douleurs 25 mai, 6 h. s. ; rupt. membr. 27 mai, 5 h. et demie s. ; dilat. complète, id. ; sommet O. I. G. A. ; accouchement nat. 6 h. s. ; déchirure du périnée ; durée totale du travail 48 h. ; délivr. nat. Enfant: garçon, fort, p. 3.300. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état, 7 juin.

74. — Du..., 30 ans, entre le 21 juillet 1862. Constitution générale, bonne. (*D. S. S. P.* 0,10). Primipare ; réglée à 13 ans, régul. ; dernière époque

menstr. (?). Grossesse de 9 mois ; premières douleurs, 22 juillet, 10 h. s.; rupt. membr. (?); débridement de l'orifice, 23 juillet 9 h. s.; application de forceps, céphalotripsie et version pelvienne ; déchirure complète du périnée ; sommet. O. I. G. A.; durée totale du travail 23 h. ; délivr. nat. Enfant : garçon, p. 2.850. Suites de couches : péritonite. Mort le 28 juillet.

75. — Bau..., 26 ans, entre le 6 août. Constitution générale, bonne; bassin légèrement vicié; une fille à terme; sommet nat.; réglée à 18 ans, régul.; dernière époque, 18 décembre. Grossesse de 8 mois; premières douleurs, 22 août, 8 h. s.; rupt. membr. (?); dilat. complète 23 août, 5 h. m.; sommet seul. O. I. G. A.; accouchement nat. 5 h. et demie m.; durée totale du travail 9 h. et demie; délivr. nat. Enfant : fille, assez forte, p. 2.450. Suites de couches nat. Sortie de la mère en bon état, et de l'enfant avec ophthalmie, 11 septembre.

76. — Les..., 20 ans, entre le 26 août 1861. Constitution générale, bonne. (D. S. S. P. 0,10). Primipare; réglée à 18 ans, régul.; dernière époque, 1er novembre. Grossesse de 8 mois et demi ; premières douleurs 27 août, 9 h. s.; rupt membr. 28 août 8 h. m.; dilat. complète, 11 h. m.; sommet. O. I. D. P.; accouchement nat. 11 h. et demie m.; durée totale du travail, 14 h. et demie ; déliv. nat. Enfant : garçon, assez fort, p. 2.550. Suites de couches : embarras gastrique fébrile. Escares. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état, le 12 septembre.

77. — Ma..., 26 ans, entre le 1er décembre 1861. Constitution générale, moyenne. (D. S. S. P. 0,10). Un garçon à terme. Sommet nat. ; réglée à 13 ans et demi, régul.; dernière époque, 15 février. Grossesse de 9 mois ; premières douleurs 29 novembre, 2 h. m.; rupt. membr. 30 novembre, 6 h. s. ; dilat. complète (?) sommet. O. I. G. A.; accouchement 1er décembre 5 h. et demie s.; céphalatripsie; durée totale du travail 63 h. et demie; déliv. nat. Enfant: garçon, né mort, p. 3.750, Suites de couches : lésions du vagin et de l'utérus. Mort le 3 décembre.

78. — Lé..., 27 ans, entre le 28 novembre 1861. Constitution faible. (D. S. S. P. 0,10). Primipare; réglée à 15 ans, régul. ; dernière époque menstr. (?) Grossesse de 8 mois et demi ; premières douleurs 30 novembre, 7 h. s.; rupt. membr. (?), dilat. complète 1er décembre, 7 h. m.; sommet. O. I. G. A.; accouchement nat. 7 h. et dem. m.; durée totale du travail 12h. et demie ; déliv. nat. Enfant : fille, forte. p. 2.550. Suites de couches nat. Sortie de la mère en bon état et de l'enfant avec ophthalmie, le 17 décembre.

79. — Fr..., 27 ans, entre le 3 décembre 1861. Constitution générale,

bonne. (D. S. S. D. 0,102). Primipare ; réglée à 11 ans, régul. Grossesse de 8 mois et demi ; premières douleurs, 4 décembre, 1 h. m. ; rupt. membr. 4 décembre, 1 h. s.; dilat. complète (?); sommet O. I. G. A.; applicat. forceps, 5 décembre 9 h. m.; déchirure du périnée ; durée totale du travail 21 h. Enfant : fille, faible, p. 2.750. Suites de couches : entérite. Mort de l'enfant, 6 décembre. Mort de la mère, 12 décembre.

80. — Ge..., 23 ans, entre le 8 juillet. Constitution générale bonne. (*D. S. S. P.* 0,10). Une fille à terme. Sommet acct. nat. ; réglée à 14 ans, régul. ; dernière époque, 15 octobre ; grossesse de 9 mois ; premières douleurs, 9 juillet ; rupt. membr. 11 juillet 1 h. s.; dilat. complète 2 h. et demie s. ; présent sommet. O. I. G. A. ; accouchement nat. 3 h. s. ; durée totale du travail 51 h. ; déliv. nat. Enfant : garçon, fort, vivant, p. 3.400. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en assez bon état, 19 juillet.

81. — Gué..., 25 ans, entre le 2 septembre 1869. Constitution générale bonne. A. S. V. accessible (D. S. S. P. 0,10). Primipare ; réglée à 7 ans, régul. ; Dernière époque 1868. Grossesse de 9 mois ; premières douleurs, 30 août, 1 h. m. ; rupt. membr. 27 septembre 1 h. 10 m. ; accouchement nat. 4 h. et demie m. ; durée totale du travail 76 h. et demie ; première période très-longue ; déliv. nat. Enfant : fille, forte, p. 3,400. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état, 11 septembre.

82. — Sar..., 36 ans, entre le 20 juillet 1869. Constitution générale, bonne. (D. S. S. P. 0,105). Un garçon et une fille à terme. Sommet nat. réglée à 18 ans, régul. ; dernière époque, décembre 1868. Grossesse de 9 mois ; premières douleurs, 16 septembre, 1 h. et demie s.; rupt. membr. 16 septembre, 9 h. 45 s. ; dilat. presque complète. id. ; sommet procidence du cordon ; position ignorée, vesion pelvienne, 9 h. 50 s. ; durée totale du travail 8 h. 25 ; déliv. nat. Enfant : fille, forte, p. 3.220. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état, 18 octobre.

83. — Sa..., 25 ans et demi, entre le 5 mai ; rachitique. (D, S. S. P. 0,10). Un garçon à terme, présent, épaule, version ; réglée à 18 ans, rég. ; dernière époque (?) Grossesse actuelle de 7 mois ; vomissements, épistaxis, deux chutes suivies d'une petite hémorragie ; premières douleurs, 8 mai, 3 h. et demie m. ; rupt. membr. id. ; dilat. complète, minuit ; présent sommet. O. I. G. A. ; accouch. nat. minuit 30 ; durée totale du travail 21 h. ; déliv. nat. Enfant : fille, vivante, faible, p. 1.610. Suites de couches nat. Sortie de la mère en bon état, le 9 mai. Enfant mort le 12.

84. — Rob .., 36 ans, entre le 8 mai. Rachitique. (D. S. S. P. 0,105). Primipare ; réglée à 18 ans, régul. ; dernière époque(?) Grossesse de 9 m. ; premières douleurs, 8 mai 8 h. mat. ; rupt. des membr. 2 h. trois quart s. ;

dilat. complète : une première fois à 2 h. trois quarts, une deuxième fois 9 mai 9 h. et demie mat.; présent sommet. O, I. G. A. ; accouch. 9 mai 1 h. s.; applications de forceps ; durée totale du travail 29 h. ; liquide amniotique verdâtre. Enfant : garçon fort, 3.850. Mort pendant le travail, par suite d'une compression probable du cordon. Suites de couches nat.

85.— G..., 22 ans, entre le 15 juillet. Constitution générale, bonne. (D. S. S. P. 0,10). 2 avortements : le premier à trois mois, le deuxième à 2 mois. Une fille à terme. Applicat. de forceps, crâniotomie et céphalotripsie ; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque menstr (?). Grossesse de 9 mois ; premières douleurs, 15 juillet, 1 h. m. ; rupt. membr. (?) dilat. complète, 17 juillet 3 h. m.; sommet. O. I. G. A. ; accouch. nat. 4 h. m. ; durée totale du travail 50 h. ; délivr. nat. Enfant : garçon, fort, vivant, p. 3,520. Suites de couches nat. Sortie de la mère en bon état, et de l'enfant présentant des furoncles multiples, 30 juillet.

86. — Ta..., 33 ans, entre 9 août. Constitution générale, bonne. (*D. S. S. P.* 0,105). Deux garçons à terme. Sommet acct. nat. ; réglée à 14 ans, régul. ; dernière époque, 22 novembre. Grossesse de 9 mois ; premières douleurs, 9 août; rupt. membr. 4 h. s.; dilat complète, 10 août, 4 h. et demie s. ; sommet O. I. G. A. ; accouch. artific. 5 h. s. ; application de forceps ; durée totale du travail 19 h. et demie ; déliv. nat. Enfant : garçon, vivant, fort, p. 3.200. Suites de couches : métro-péritonite. Mort de l'enfant le 12. Sortie de la mère non guérie, 15 août.

87. — Lor..., 29 ans, entre le 1er mai. Rachitique. (*D. S. S. P.* 0,105). Primipare ; réglée à 17 ans, régul. ; dernière époque 1er août 1868. Grossesse de 9 mois ; premières douleurs 30 avril, 10 h. s. ; rupt. des membr. artif. 11 mai 10 h. du mat. ; dilat complète. id. ; présent face. M. I. G. A. ; accouch. nat. 2 h. s. ; durée totale du travail 16 h. déliv. nat. Enfant : garçon, fort. p. 4.080. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant le 8 mai, en assez bon état.

88. — Plu..., 26 ans, entre le 2 février. Bonne constitution. (*D. S. S. P.* 0,10). Primipare ; réglée à 10 ans, régul. ; dernière époque, 25 mai. Grossesse de 9 mois ; premières douleurs, 1er avril, 1 h. et demie soir ; rupt. des membr. id. ; dilat. complète, 4 h. soir ; présentat. siége ; durée totale du travail 12 h. 29 ; déliv. nat. Enfant : fille, forte, p. 3.720 ; morte quelques heures après. Suites de couches : métrite. Sortie de la mère en bon état, 15 avril.

89. — Mo..., 25 ans. Bonne constitution. (*D. S. S. P.* 0,105). Un accouchement avant terme, de 6 mois ; réglée à 19 ans, régul. ; dernière époque, commencement de juillet. Grossesse de 8 mois et demi ; premières douleurs, 31 mars, 8 h. soir ; rupt. des membr. 9 h. et demie soir ; dilat.

complète, 9 h. et demie soir; durée totale du travail 2 h.; déliv. nat. Enfant: fille, vivante, faible, p. 2.665. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état, le 12 avril.

90. — S..., 27 ans. Bonne constitution. Entré le 26 juin. (*D. S. S. P.* 0,105). Primipare ; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque menstruelle, octobre. Grossesse de 8 mois et demi ; premières douleurs, 25 juin, 9 h. m. rupt. membr. 26 juin midi ; dilat. complète, 1 h. soir; présentat. sommet. O. I. G. A. , accouch. nat. 2 h. 10 soir; durée totale du travail 29 h. 10; déliv. nat, Enfant: fille, macérée, p. 2.410 (syphilis). Suites de couches nat. Sortie en bon état le 7 juillet.

91. — G..., 25 ans, entre le 2 septembre. Constitution générale, bonne. A. S. V. accessible. (D. S. S. P. 0,10). Primipare; réglée à 7 ans, régul.; dernière époque, fin octobre. Grossesse de 9 mois; premières douleurs, 30 août, 1 h. m.; rupt. des membr. 2 septembre 1 h. 10 mat.; dilat. complète 4 h. mat.; présentat. sommet. O. I. D. P. réduite ; accouch. nat. 4 h et demie mat. ; durée totale du travail 76 h. et demie; première période très-longue; déliv. nat. Enfant; fille, forte, vivante, p. 3.100. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état, le 11 septembre.

92. — G..., 19 ans, entre le 6 octobre 1869. N'a marché qu'à l'âge de 4 ans (D. S. S. P. 0.10). A. S. V. difficilement accessible ; primipare; réglée à 15 ans et demi, régul.; dernière époque décembre 1868. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 8 h.s.; rupt. membr. 11 octobre 2 h. et demie s.; dilat. complète, 12 octobre, 9 h. 25 m.; sommet. O. I. G. P. réduite ; accouchement par applicat. de forceps dans l'excavation, 9 h. 35 m.; durée totale du travail, 37 h. et demie ; délivr. nat. Enfant : garçon, p. 7.920. Hydrocéphalie aigue, pachyméningite, mort. Suites de couches, péritonite, perforation de la moitié postérieure du col dans sa portion susvaginale. Mort.

93. — N..., 24 ans, entre le 6 septembre 1869. Dit n'avoir marché qu'à 9 ans. (D. S. S. P. 0,105). Avortement de trois mois à la suite d'une chute; un accouchement spontané de 8 mois. Sommet; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque, 25 décembre 1868. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 9 octobre 6 h. s.; rupt. membr. 10 octobre 7 h. et demie m.; dilat. complète, 8 h. m.; sommet. O. I. G. A.; accouch. nat. 8 h. et demie m.; durée totale du travail, 14 h. ; délivr. nat. Enfant: garçon, fort. p. 3.000. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état, 19 octobre.

94. — L..., 29 ans, entre le 4 juin. Bonne constitution (D. S. S. P. 0,10). Un garçon à terme. Sommet nat.; réglée à 11 ans, régul.; dernière époque

menstruelle. (?) Grossesse de 9 mois ; premières douleurs, 10 juin 2 h. soir ; rupt. des membr. 12 juin 4 h. m.; dilat. complète id.; présent sommet. O. I. D. P. réduite ; accouch. nat. 4 h. et quart mat. ; durée totale du travail 38 h. et quart ; déliv. nat. Enfant : fille. forte, vivante, p. 3.900. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état, 18 juin.

95. — Bea..., 48 ans, entre le 19 mai. Constitution débile. (D. S. S. P. 0.10). Un avortement de 3 mois ; un garçon et une fille, l'un présentant le siége, l'autre le sommet, tous à terme ; acc. nat. ; réglée à 17 ans, régul. ; dernière époque 6 septembre. Grossesse de 9 mois ; premières douleurs 10 juin, 4 h. s. ; rupt. membr. 11 juin, 6 h. et demie s. ; présent sommet. O. I. D. P. réduite, accouch. nat. 7 h. s. ; durée totale du travail 27 h. ; déliv. nat. Enfant : garçon médiocre, vivant, enfoncement considérable du pariétal droit, avec fracture de la table externe, p. 3.720. Suites de couches nat. Sortie de la mère en bon état, et de l'enfant avec enfoncement du pariétal.

96. — H..., 21 ans, entre le 11 mai 1869. Rachitisme. (D. S. S. P. 0,10). Primipare ; réglée à 13 ans, régul. ; dernière époque juillet. Grossesse de 9 mois ; premières douleurs 9 mai, 9 h. s.; rupt. membr. 11 mai midi ; présentation de la tête, occipito-pubienne, forceps au détroit inférieur ; tractions faites à l'aide des mouffles, extraction de l'enfant 13 mai à 11 h. 50 ; déliv. nat. Enfant : garçon, p. 3.510, né en état de mort apparente. Insufflé ranimé mort par respiration incomplète, rien dans le crâne. Sortie de la mère en bon état.

97. — T..., 26 ans, primipare, rachitique. (D. S. S. P. 0.10), entre le 5 janvier 1869 ; réglée à 16 ans, régul. ; dernière menstruation le 4 avril. Grossesse actuelle de 9 mois ; premières douleurs le 15 janvier, à minuit ; rupt. des membr. artificielle le 17 janvier à 7 h. et demie m. ; dilat. complète au même moment ; présentation du sommet. O. I. G. A. ; procidence du cordon, mort de l'enfant pendant que l'on termine l'accouchement par la version podalique, à 7 h. trois quarts du soir. Le placenta présente 2 foyers apoplectiques ; durée totale du travail 31 h. trois quarts ; déliv. nat. Enfant : fille morte, p. 2.730. Sortie de la mère en bon état.

98. — G..., 29 ans, entre le 10 novembre 1868. Rachitique, (D. S. S. P. 0,10). Primipare ; réglée à 19 ans, régul. ; dernière époque menstruelle 12 avril. Grossesse de 9 mois ; vomissements abondants, et pertes peu abondantes tous les 10 jours, de 6 à 7 jours pendant les premiers mois ; premières douleurs le 17 février, 1 h. m. ; rupt. des membr. artificielle 10 h. 20 mat. ; dilat. complète id. ; présent sommet. O. I. G. A. ; accouch. nat. 11 h. 45 m. ; durée totale du travail 10 h. et demie ; déliv. nat. Enfant : fille, faible, p. 2.600. Suites de couches : métrite. Sortie de la mère en bon état, et de l'enfant atteint de diarrhée, le 15 mars.

99. — R..., 22 ans, entre le 9 fév. 1869. Bonne constitution. (D. S. S. P. 0m10). Un garçon à terme. Sommet; une fille, présent. épaule, nat.; réglée à 14 ans, régul., dernière époque menstruelle (?) Grossesse actuelle de 8 mois et demi; apparition des premières douleurs 14 mars, 9 h. s.; rupt. des membr. prématurée id.; dilat. complète 16 mars, 8 h. 45 s.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat, 9 h. 10 s.; durée totale du travail 48 h. 10; déliv. nat. Enfant : fille, vivante, moyenne, p. 2.700. Suites de couches : métrite. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état, le 5 avril.

100. — R..., 19 ans et demi, entre le 25 janvier 1869. Bonne constitution; diamètre S. S. P. 0m.10; primipare; réglée à 18 ans irrégulièrement; dernière menstruation (?). Grossesse actuelle de 9 mois; premières douleurs le 25 janvier à 6 h. m.; rupture membr. à 5 h. et demie s.; dilat complète à ce moment; présentation du sommet O. I. G. A.; diam. de la tête : O. Frontal 0m11 et demi. B. pariétal 0m08 et demi; accouch. nat. 7 h. s.; durée totale du travail 13 h.; déliv. nat. Enfant: fille, forte, p. 3.100. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état, le 30 janvier 1869.

101. — L..., 20 ans, entre le 20 janvier 1869. Bonne constitution; diamètre S. S. P. 0m105. Primipare; réglée à 14 ans, régul.; dernière menst. (?) Grossesse actuelle de 9 mois; premières douleurs le 25 janvier 10 h. s.; rupt. artificiel des membr. le 27 janvier, à 10 h. et demie m.; dilat. compl. le 28, à 9 h. m.; présentation du sommet O. I. D. P.; forceps au détroit supérieur; tractions faites à l'aide des mouffles, rigidité de l'orifice vulvaire, une incision. Enfant né en état de mort apparente à 10 h. et demie m. Insufflé, l'enfant est ranimé; déliv. nat.; durée totale du travail 60 h. et demie. Enfant: fille, p. 4.050. Après l'accouchement la mère a une gangrène des parties génitales jusqu'au 18 février. Sortie de la mère en bon état le 10 mars. L'enfant meurt de faiblesse congénitale, le 31 janvier.

102. — V..., 30 ans, entre le 11 janvier 1869. Bonne constitution; diamètre S. S. P. 0m105. A eu trois garçons à terme, venus naturellement et par le sommet; réglée à 18 ans, régul.; dernière menstruation (?) Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 26 janvier, à 6 h. et demie du matin, rupture des membranes le 26 janvier, à 6 h. 55 mat.; dilatation complète 9 h. 55; présentation du sommet O. I. G. A.; accouch. nat. 10 h. 5; durée totale du travail 4 h. et demie; déliv. nat. Enfant: garçon, p. 4.130. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état, le 10 janvier 1869.

103. — P..., 19 ans, entre le 11 août 1866. (D. S. S. P. 0m10). Primipare; réglée à 16 ans, régul.; dernière époque (?) Grossesse de 7 mois; premières douleurs 17 août, 8 h. s.; rupt. membr. 18 août, 3 h. m.; dilat. complète

3 h. et demie m.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. 4 h. m.; durée totale du travail 8 h.; déliv. nat. Enfant: fille, faible, p. 1.760, Suites de couches, diarrhée. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état, 28 août.

104. D..., 26 ans, entre le 4 novembre 1868. Bonne constitution, A. S. V. accessible; diam. S. S. P. 0m.105. Deux accouchements antérieurs (une fille venue naturellement par le sommet, un garçon venu par le siége); réglée à 18 ans, régul.; dernière menstruation le 12 avril. Grossesse actuelle de 9 mois; premières douleurs le 20 janvier à 2 h. m.; rupt. des membr. à 11 h. du soir; dilat. complète à ce moment; présentation du sommet O. I. G. T. Terminaison de l'accouchement le 21 janvier 10 h. trois quarts m. par le forceps appliqué au détroit supérieur, avec tractions faites à l'aide de mouffles; durée totale du travail 32 h. et demie; déliv. nat. Enfant: garçon, fort, p. 3.500.

105. — F..., 23 ans, entre le 16 janvier 1869. Constitution bonne; diamètre S. S. P. 0m.10 et demi; primipare: réglée à 12 ans et demi, régul.; dernière menstruation le 15 avril. Grossesse actuelle de 9 mois; premières douleurs le 15 janvier, 8 h. du soir; rupt. artificielle des membr. le 17 janvier, 10 h. trois quarts du matin; dilat. complète (?) présentation du sommet O. I. G. T.; procidence du cordon ombilical, rétropulsion du cordon faite avec le rétropulseur de Scholler modifié. Rigidité de l'orifice, incisions. Terminaison de l'accouchement par le forceps au détroit supérieur le 17 janvier à 5 h. et demie du soir; déliv, nat. Enfant: fille, forte, p. 3.100. Métro-péritonite. Mort de la mère le 24 janvier 1869. Enfant envoyé aux enfants assistés.

106. — D..., 27 ans, primipare, entre le 5 oct. 1868. Bonne constitution; diamètre S. S. P. 0m.105; réglée à 15 ans, régul.; dernière menstruation le 15 fév. Grossesse actuelle de 9 mois; premières douleurs le 3 déc., à 8 h. s.; rupture des membranes le 4 déc., à 1 h. m.; dilatation complète à 8 h. et demie s.; sommet O. I. G. A; accouch. naturel, après incision sur les parties latérales de la vulve, à 9 h. et demie s.; durée totale du travail : 48 h. et demie; délivrance naturelle. Fille forte, p. 3.000. Suites de couches naturelles. Sortie de la mère en bon état le 21 déc. L'enfant était mort d'un phlegmon de la joue gauche, le 19 déc.

107. — F..., 33 ans, entre le 20 oct. 1868. Rachitique; diamètre S. S. P. 0m.10; accouch. antérieur naturel d'une fille venue à terme par le sommet; réglée régul.; dernière menstruation le 15 janv. Grossesse actuelle 8 mois et demi; premières douleurs le 23 sept., à 8 h. m.; rupture des membranes et dilatation complète ignorées; présentation du sommet O. I. G. A.; accouch. naturel le 23 oct., à 7 h. et quart; délivrance naturelle. Enfant : garçon moyen, p. 2.650. Suites de couches naturelles. Sortie de la mère et de l'enfant bien portants le 3 nov.

108. — T..., 22 ans, entre le 20 juil. 1868. Bien constituée; diamètre S. S. P. 0m.10; primipare; réglée à 13 ans, régul.; dernière menstruation ignorée; grossesse actuelle de 9 mois; premières douleurs le 3 sept., à 5 h. m.; dilatation complète à 10 h. et demie m.; sommet O. I. G. A.; accouch. naturel à 10 h. 50 m.; durée totale du travail : 5 h. 50; délivrance naturelle. Enfant : fille forte, p. 3.350. Suites de couches naturelles. Sortie de la mère et de l'enfant le 16 sept. en bon état.

109. — F..., 36 ans, entre le 29 mai 1868. Bien constituée, *bassin rétréci*; diamètre S. S. P. : 0m.10; accouch. antérieurs, 2 garçons venus à terme, par le sommet et nat.; réglée à 20 ans, régul.; dernière menstruation ignorée. Grossesse actuelle de 9 mois; premières douleurs le 2 juin, à 3 h. s.; rupture des membranes le 3 juin à midi et demi; dilatation complète à 1 h. s.; présentation du sommet O. I. D. P. réduite; accouch. nat. à 1 h. et un quart s.; durée totale du travail : 22 h. et demie; délivrance nat. Enfant : garçon moyen, p. 2.800. Suites de couches nat. Sorties de la mère et de l'enfant en bon état le 11 juin.

110. — P..., 25 ans, entre le 24 nov. 1866. Constitution bonne; A. S. P. accessible; D. S. S. P. : 0m.10; réglée à 14 ans, irrégul.; dernière époque (?). Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs 23 déc., 8 h. s.; rupture des membranes, idem; sommet O. I. G. A.; procidence du cordon, de 10 à 11 h. s.; incision à l'orifice utérin, tentatives infructueuses d'extraction avec le levier et d'application de forceps; crâniotomie, céphalotripsie et version pelvienne; durée totale du travail : 27 h.; délivrance nat. Enfant : fille, p. 1.990. Suites de couches : bronchite légère. Sortie en bon état le 17 sept.

111. — T..., 20 ans. Constitution bonne; diamètre S. S. P. : 0m.105, primipare; réglée à 14 ans, régul.; dernière menstruation ignorée. Grossesse actuelle de 9 mois; premières douleurs le 17 juin, à 2 h. m.; rupture des membranes le 19 juin, à 9 h. 40 m.; dilatation complète à 4 h. s.; présentation du sommet : O. I. G. A.; terminaison de l'accouch. à 6 h. et demie s., par le forceps appliqué au détroit inférieur; durée totale du travail : 64 h. et demie; délivrance nat. Enfant : garçon fort, p. 3.640. Suites de couches normales. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 29 juin.

112. — Chén..., 26 ans, entre le 16 avril 1868. Bien constituée; A. S. V. accessible : 0m.10; accouch. antérieur artificiel d'un garçon à terme venu par le sommet; réglée à 17 ans, régul.; dernière menstruation le 31 août. Grossesse actuelle de 8 mois et demi; apparition des premières douleurs le 6 juin, à 7 h. m.; rupture artificielle des membranes à 8 h. s.; dilatation complète à 7 h. et demie s.; présentation du sommet : O. I. G. A.;

levier et rétroceps appliqués au détroit supérieur; des troubles dans la circulation fœtale se produisant, terminaison de l'accouch. artificiel le 7 juin, à 7 h. m.; durée totale du travail : 24 h.; délivrance nat. Enfant : fille faible, p. 2.600. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 22 juin.

113. — P..., 23 ans, entre le 16 sept. 1866. Constitution bonne; A. S. V. accessible, D. S. S. P., 0m10; primipare; réglée à 20 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs 16 sept., 8 h. m.; rupture des membranes le 17 sept., à minuit et demi; dilatation complète à 10 h. m.; sommet O. I. D. P.; réduite artific.; 10 h. et demie m., application de forceps au détroit supérieur; durée totale du travail : 27 h.; délivrance nat. Enfant : garçon, très-faible, p. 3.540. Suites de couches nat.; mort de l'enfant 4 h. après sa naissance. Sortie de la mère en bon état le 6 oct.

114. — Er..., 28 ans, entre le 2 mai 1868. Bien constituée; diamètre S. S. P. 0m10; 1 garçon arrivé par le sommet, avant terme (accouch. artificiel); réglée à 18 ans, régul.; dernière époque menstruelle, 15 sept. Grossesse actuelle de 8 mois; apparition des premières douleurs le 1er mai, à minuit; rupture artificielle des membranes le 2 mai, à 4 h. et demie s.; dilatation complète ignorée; présentation de l'extrémité pelvienne, mode des pieds : C. I. G. A.; accouchement provoqué par le dilatateur, terminé par l'extraction à 5 h. s.; durée totale du travail : 17 h. et demie; délivrance nat.; hémorrhagie grave après. Enfant : fille, faible, p. 2.280. Péritonite sous-ombilicale consécutive; guérison. Sortie de la mère et de l'enfant le 14 mai, en bon état.

115. — H..., 25 ans, entre le 14 mars. Constitution bonne; D. S. S. P.; 0m.10. Un garçon à terme; un accouch. à 7 mois (artificiellement); une fille à terme, présent. siége, nat.; réglée à 15 ans, irrégul.; dernière époque menstruelle ignorée. Grossesse de 9 mois; apparition des premières douleurs le 14 mars, 4 h. m.; rupture artificielle des membranes le 14 mars, 8 h. m.; dilatation complète (?); présentation du sommet O. I. D. P., réduite; accouch. par application de rétroceps dans l'excavation, 14 mars, 7 h. s.; mort du fœtus, p. 2.800; délivrance nat. durée totale du travail : 15 h. Suites de couches : métrite, contraction de l'utérus. Sortie de la mère, non guérie le 29 mars.

116. — Sch..., 23 ans, entre le 9 mars. Bonne constitution; D. S. S. P.: 0m10 50, primipare; réglée à 13 ans, régul.; dernière époque menstruelle (?). Grossesse de 9 mois; apparition des premières douleurs 9 mars, à minuit; rupture des membranes le 10 mars, à 10 h. s.; dilatation complète le 11 mars, à 10 h. s.; présent. sommet O. I. G. A.; application de

forceps au détroit infér. 11 mars, 7 h. s.; durée totale du travail : 43 h.; délivrance nat. Enfant : garçon, très-faible, p. 2.440, mort peu après l'accouchement. Suites de couches : métro-péritonite avec gangrène de la vulve; mère morte le 16 mars.

117. — Legr..., 21 ans, entre le 12 fév. 1866; diamètre S. S. P. 0m10. Les ischions convergent l'un vers l'autre. Grossesse de 9 mois; primipare; premières douleurs le 4 mars, 7 h. et demie s.; rupture accident. membr. à 9 h. et quart s.; dilatation complète le 5 mars, à 10 h. et demie; sommet, 5 h. s; forceps; déchirure du col, vagin et périnée; délivrance nat.; durée totale du travail : 22 h.; enfant mort. Suites de couches : péritonite; mort.

118. — G..., 19 ans, entre le 20 juil. 1865. Petite; primipare; D. S. S. P. 0m10; à terme; premières douleurs le 19 juil., à 6 s.; rupt. artif. des membr. le 21 juil., à 11 h. m.; dilat., idem; pelvis, S. I. G. A.; extraction; circul. autour du cou; enfant en état de mort apparente, ranimé, p. 2.230. Suites de couches nat.

119. — Ch..., 22 ans, entre le 10 mai 1865. Constitution forte; bassin légèrement vicié; D. S. S. P. 0m105; a eu 1 garçon avant terme S. N.; réglée à 15 ans et demi; dernière menstr. le 6 sept. Grossesse de 8 mois; premières douleurs le 10 mai, à 2 h. s.; rupture des membr. à 6 h. s.; dilat. complète à 6 h. et demie s.; sommet seul O. I. G. A.; accouch. nat. à 6 h. et demie s.; durée totale du travail : 4 h. et demie; délivrance nat. Garçon, faible, p. 2.450. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en assez bon état le 19 mai.

120. — V..., 22 ans, entre le 15 juin 1864. Constitution générale bonne; D. S. S. P., 0m.10; primipare; réglée à 18 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 24 juil., à 9 h. s.; rupt. des membr. (?); incisions à l'orifice; application de forceps le 26 juil., à 11 h. m.; face M. I. D. P.; disjonction de la symphyse pubienne; durée totale du travail : 36 h. Enfant : garçon, faible, p. 3.750. Suites de couches : suppuration de la symphyse pubienne avec nécrose d'une des facettes articulaires, arthrite sacro iliaque; destruction de l'extrémité antérieure de l'urètre. Mort de l'enfant. Sortie de la mère guérie le 12 juin 1865.

121. — G..., 22 ans, entre le 4 juil. Constitution bonne; D. S. S. P. 0m.10; primipare; réglée à 16 ans, irrégul.; dernière époque (?). Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs le 17 juil., à 4 h. s.; rupt. des membr. à 3 h. s.; dilat. complète le 18 juil., à 7 h. et demie s.; sommet, procidence du cordon et du pied; rétropulsion; accouch. nat. le 18 juil., à 8 h. s.; durée totale du travail : 28 h.; délivrance nat. Enfant : garçon,

mort, p. 2.720. Suites de couches nat. Sortie de la mère en bon état le 29 juil.

122. — C.... 30 ans, entre le 3 juill. 1864. Constitution générale bonne; bassin légèrement vicié; D. S. S. P. 0m.10; primipare; réglée à 12 ans, régul.; dernière époque, le 8 oct. Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs le 4 juill., à 2 h. m.; rupt. membr. (?); dilat. complète le 4 juil., à 5 h. m.; sommet, O. I. D. P. réduite; accouch. nat. à 6 h. m.; durée totale du travail : 4 h.; délivrance nat. Enfant : garçon, faible, p. 2.150. Suites de couches : péritonite; morte.

123. — D..., 21 ans, entre le 5 janv. Constitution générale bonne; D. S. S. P. 0m.102; 1 garçon à terme, sommet, nat.; réglée à 10 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 4 janv., 9 h. s.; rupt. membr. accident. le 5 janv., à 9 h. et demie m.; dilat. complète à 10 h. m.; sommet, O. I. G. A.; accouch. nat. à midi; durée totale du travail : 15 h.; délivrance nat. à midi et demi. Enfant : garçon, fort, p. 3.650. Suites de couches : phlébite utérine et infection purulente; morte le 7 février. Diamètres de la tête fœtale : 1° occipito-frontal. 0m.115; 2° occipito-mentonnier, 0m.135; biparietal : 0m.09; sous-occipito-bregmatique, 0m.105.

124. — M.... 27 ans, entre le 24 janv. 1864. Constitution bonne; D. S. S. P. 0m.10; primipare; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque le 25 avril. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 24 janv., à 5 h. m. rupt. membr. à 8 h. 20; liquide amniotique teints de méconium; dilat. complète à 9 h. m.; face, procidence du cordon (rétropulsion), F. I. G. A.; version pelvienne (la tête étant trop élevé pour appliquer le forceps) 4 h. et demie s.; durée totale du travail : 11 h. et demie; délivrance nat. Enfant : fille, morte, p. 3.000. Suites de couches : péritonite. Sortie de la mère incomplétement rétablie le 7 février.

125. — Nor..., 19 ans, entre le 24 déc. 1867. Bonne constitution; A. S. V. accessible; primipare; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque le 1er mai. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 24 janv., à 7 h. s.; rupt. des membr. le 5 janv., à midi, dilat. complète à 9 m.; sommet O. I. G. A.; accouch. art. à 7 h. s.; délivrance nat.; durée totale du travail : 24 h. Fille, faible, p. 3.000. Métrite légère chez la mère, qui sort en bon état avec son enfant, le 16 fév.

126. — Dan..., 22 ans, admise le 19 déc. 1867. Rachitique; A. S. V. accessible; 1 fille à terme, morte; sommet; accouch. nat.; réglée à 14 ans, menstruation régulière; dernière époque le 8 mai. Grossesse actuelle de 7 mois; premières douleurs le 24 déc., à 6 h. m.; rupt. des membr. le 23 déc., à 3 h. s.; dilat. complète le 24 déc, à 5 h. et demie s.; sommet;

position O. I. G. A.; accouch. nat. le 24 déc., à 6 h. s.; durée totale du travail : 6 h.; délivrance nat. Enfant : garçon, faible, p. 1.950. Suites de couches nat. Enfant mort le 25 déc. Sortie de la mère en bon état le 25 déc.

127. — R..., 18 ans. Bien constituée; primipare; réglée à 10 ans et demi; menstruation régulière; dernière époque, le 8 janv. Grossesse de 9 mois; A. S. V. accessible; premières douleurs le 17 oct., à 2 h. m.; rupure des membr. le 17 oct., à 9 h. s., artificielle; dilatation complète le 17 oct., à 9 h. s.; présentation du sommet; position O. I. G. A.; accouch. nat. le 17 oct., à 11 h. s.; durée totale du travail, 21 h.; délivrance nat. à 11 h. et demie. Enfant : fille assez forte, p. 2.780. Suites de couches : métrite suraiguë. Sortie de la mère non guérie le 28 oct.; enfant mort le 22 oct., à 5 h. m.

128. — Spi..., 17 ans, admise le 6 déc. 1867. Bien constituée; primipare; réglée à 13 ans; menstruation régulière; dernière époque, le 10 mars. Grossesse de 8 mois et demi; constipation et diarrhée pendant les deux premiers mois. A. S. V. accessible; premières douleurs le 6 déc., à 2 h. m.; rupture des membranes le 6 déc., à 4 h. m.; dilatation complète le 6 déc., à 8 h. m.; présent. sommet; position O. I. G. A.; accouch. nat. le 6 déc., à 9 h. et demie m.; durée totale du travail, 8 h.; délivrance naturelle. Enfant : garçon assez fort, p. 2.650. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état.

129. — D..., 23 ans, admise le 1er janv. 1868. Bien constituée; A. S. V. accessible; primipare; réglée à 17 ans; menstruation régulière; dernière époque menstruelle ignorée. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 31 déc., à 11 h. s.; rupture des membranes le 1er janv., à 2 h. et demi s.; dilatation complète le 2 janv., à minuit un quart; sommet; position O. I. D. P. réduite; accouch. nat. le 2 janv., à minuit 20; durée totale du travail, 23 h.; délivrance naturelle. Enfant : fille assez forte, p. 2.700. Suites de couches naturelles. Enfant mort le 4 janv. Sortie de la mère le 11 janv. en bon état.

130. — Aub..., 23 ans, admise le 1er déc. 1867. Bien constituée; primipare; réglée à 15 ans; menstruation régulière; dernière époque menstruelle le 1er mars. Grossesse de 8 mois et demi; A. S. V. accessible; premières douleurs le 9 déc., à 11 h. s.; rupture des membranes accidentelle, le 10 déc., à 7 h. m.; dilatation complète le 11 déc., à minuit; présentation; sommet (cordon enroulé sur le cou); position O. I. G. A.; accouch. nat. le 11 déc., 1 h. m.; durée totale du travail : 26 h.; délivrance naturelle. Enfant : garçon faible, p. 2.520. Suites de couches naturelles. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 21 déc.

131. — Jean..., 28 ans, admise le 31 oct. 1867. Bonne constitution; 1 fille à terme; som. nat.; réglée à 20 ans, régul.; dernière époque le 4 fév. Grossesse de 9 mois; A. S. V. accessible; premières douleurs le 9 nov., à 8 h. s.; rupt. membr., à 9 h. et demie s.; dilat. complète, à 10 h. et demie m.; siége (mod. des pieds); S. I. G. A. avec procidence du cordon; accouch. nat., à 10 h. 40; durée totale du travail : 3 h.; délivrance nat. Enfant : fille forte, p. 3.210. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 19 oct.

132. — Ch..., 28 ans, admise le 13 déc. 67. Bien constituée, a eu déjà un garçon à terme, présent. sommet et accouch. nat.; réglée à 15 ans; menstruation régulière; dernière époque menstruelle (?). Grossesse de 8 mois; A. S. V. accessible; premières douleurs 19 déc., 6 h. m.: rupt. des membr. 17 déc. 9 h. s.; dilatat. complète 19 déc. 11 h. et demie m.; sommet O. I. D. P. réduite; accouch. nat. 19 déc. 11 h. 35 m.; durée totale du travail 6 h.; délivrance nat. Enfant : garçon moyen, p. 2.050. Suites de couches : abcès de la mamelle. Sortie de la mère et de l'enfant le 22 janvier en bon état.

133. — Boc..., 16 ans, entre le 24 juillet 67. Bonne constitution; primipare; réglée à 13 ans, régul.; dernière époque, 4 janv.; Grossesse de 8 mois; A. S. V. accessible; premières douleurs 11 oct., 11 h. m.; rupt. membr. 11 h. et demie s.; dilat. complète 12 oct., 2 h. m.; siége; S. I. G. A.; accouch. nat. 12 oct. 2 h. 60 m.; délivr. nat. 3 h. 10.; Enfant : fille, p. 2.380. durée totale du travail 15 h.; suites de couches : nat.; sortie de la mère et de l'enfant en bon état 28 octobre.

134. — God..., 19 ans, entre le 2 juin 67; A. S. V. accessible; primipare; réglée à 16 ans. Grossesse de 9 mois; premières douleurs, 21 août 6 h. s.; rupt. membr. 22 août 1 h. 35 m.; dilat. complète idem; sommet O. I. D. P.; applicat. de forceps au détroit infér. (?) 7 h. 45 m.; durée totale du travail 14 h.; délivr. nat. Enfant : garcon, p. 2.960. Suites de couches : métrite : mort de l'enfant 28 août. Sortie de la mère en bon état 9 sept.

135 — Chau..., 21 ans, entre le 23 août. 69. A. S. V. accessible; primipare; réglée à 16 ans, régul.; dernière époque, 24 janvier. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 27 oct. 11 h. s.; rupt. membr. 28 oct., 2 h. 35 s.; dilat. complète, 7 h. s.; sommet, O. I. G. A.; accouch. nat. 8 h. 55 s.; durée totale du travail, 21 h. 55 (!) délivr. nat. Enfant : fille forte, p. 3.210. Suites de couches : métrite. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état 22 novembre.

136. — Carp..., 22 ans, entre le 6 avril 69. Bonne constitution; A. S. V.

accessible; une fille à terme, sommet nat.; réglée à 14 ans, dernière époque 5 août. Grossesse de 7 mois; premières douleurs 10 avril, 5 h. m.; rupt. membr. 4 h. s.; dilat. complète idem; présent. sommet O. I. G. A.; accouch. nat. 4 h. et demie s.; durée totale du travail 11 h.; délivr. nat. Enfant : garçon vivant, faible, p. 1,690. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant le 19 avril en bon état.

137. — Mar..., 27 ans, entre le 30 mars 1869. Bonne constitution; A. S. V. accessible; un avortement de 2 mois; un de 3 mois; deux accouchements par la version; un garçon à terme; prés. face nat.; une fille à terme, sommet nat.; réglée à 18 ans, régul.; dernière époque menstruelle, le 8 juill. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 29 mars, à 3 h. s.; rupt. des membr. le 30 mars, à 3 h. s.; dilat. complète le 31 mars, 3 h. 45 m.; prés. sommet O. I. D. P., réduite; accouch. nat. à 9 h. m.; durée totale du travail, 42 h.; délivr. nat. Enfant : garçon vivant, fort, p. 3.720. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 9 avr.

138. — Del..., 21 ans, entre le 26 août 1867. Bonne constitution; A. S. V. accessible; un garçon à terme, nat.; réglée à 14 ans; irrégul.; dernière époque en décembre. Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs le 24 août, à 5 h. et demie s.; rupt. membr., à 8 h. 40 s., artif; dilat. complète le 26 août, à 8 h. et demie m.; épaule droite C. I. G. A.; version pelvienne, à 9 h. m.; durée totale du travail, 16 h.; délivr. nat. Enfant : faible, p. 2.330. Suites de couches nat. Sortie en bon état le 9 sept. Mort de l'enfant peu après sa naissance.

139. — Del..., 24 ans. Bien constituée, entre le 17 oct. 1867; primipare; menstr. régul.; dernière époque le 15 janv. Grossesse de 9 mois; A. S. V. accessible; premières douleurs le 18 oct., à 1 h. s.; rupt. membr. le 19 oct., à 1 h. et demie m.; dilat. complète le 19 oct., à 2 h. et demie m.; sommet O. I. D. P., réduite; accouch. nat. le 19 oct., à 3 h. 10 m.; durée totale du travail, 14 h.; délivr. nat. Enfant : garçon fort, p. 4.150. Suites de couches nat. Sortie de la mère en bon état le 30 oct. Enfant mort le 23 oct.

140. — G..., 22 ans. Rachitique; A. S. V. accessible; primipare; réglée à 18 ans, régul.; dernière époque menstruelle ignorée. Grossesse de 9 mois; apparition des premières douleurs le 5 janv., à 9 h. et demie s.; rupt. des membr. à 11 h. s.; dilatat. complète le 6 janv., à 6 h. 40 m.; présent. sommet; position O. I. G. A.; accouch. nat. à 7 h. m. (vomissements bilieux pendant le travail); durée totale du travail, 9 h.; délivrance nat. Enfant : garçon moyen, p. 2.750. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 23 janv.

141. — Tu..., 32 ans, entre le 21 janv. 1867. Bonne constitution A. S.

V. accessible; a eu 1 garçon et 2 filles avant terme S. N.; réglée à 15 ans, irrégul.; dernière époque le 26 juin. Grossesse de 7 mois; premières douleurs le 21 janv., à 7 h. et demie m.; rupt. des membr. le 18 janv., à 6 h. s.; dilat. complète à 7 h. et demie m.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. à 7 h. et demie m.; durée totale du travail, 6 h.; délivr. nat. Garçon faible, p. 1.700. Sortie de la mère et de l'enfant non guéris le 29 janv.

142. — Hof..., 26 ans, entre le 7 janv. 1867. Bonne constitution; A. S. V. accessible; a eu 1 garçon à terme S. N.; réglée à 18 ans, irrégul.; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 8 janv., à 2 h. m.; rupt. des membr. à 10 h. m.; dilat. complète le 8 janv., à 8 h. m.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. à 8 h. et demie m.; durée totale du travail, 7 h.; délivr. nat. Garçon fort, p. 3.340. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 17 janv.

143. — Vil..., 22 ans, entre le 23 janv. 1867. Bonne constitution; A. S. V. accessible; a eu une fille à terme S. N.; réglée à 16 ans, irrégul.; dernière époque le 7 avril. Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs le 28 janv., à 6 h. m.; rupt des membr. à 7 h. et demie m.; dilat. complète (?); sommet O. I. G. A.; accouch. nat. à 5 h. s.; durée totale du travail, 10 h.; délivr. nat. Garçon fort, p. 3.060. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 8 fév.

144. — Fav..., 27 ans, entre le 12 janv. 1867. Bonne constitution; A. S. V. accessible; a eu 1 fille et 2 garçons à terme; S. N.; réglée régul. depuis 15 ans; dernière époque le 8 avril. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 12 janv., à 2 h. s.; rupt. des membr. le 13 janv., à 1 h. m.; dilat. complète à 4 h. m.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. à 4 h. et demie m.; durée totale du travail, 14 h.; délivr. nat. Fille forte, p. 3.380. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 22 janv.

145. — Del..., 27 ans, entre le 4 fév. 1867. Bonne constitution; A. S. V. accessible; primipare; réglée à 16 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 3 fév., à 11 h. m.; rupt. des membr. à 11 h. et demi m.; dilat. complète à 4 h. s.; sommet O. I. D. P., réduite; accouch. nat. à 5 h. s.; durée totale du travail, 30 h.; déliv. nat. Fille forte, p. 2.340. Suites de couches, fièvre, eschares vulvaires. Sortie de la mère non guérie le 12 fév. Enfant bien portant.

146. — Let..., 27 ans, entre le 9 fév. 1867. Bonne constitution; A. S. V. accessible; 1 garçon à terme; S. N.; réglée à (?), régul. Grossesse de 8 mois; premières douleurs le 12 fév., à 6 h. m.; rupt. des membr. le 11 fév., à 4 h. s.; dilat. complète, à 9 h. et demie m.; sommet O. I. G. A.;

accouch. nat. à 10 h. m.; durée totale du travail, 4 h.; déliv. nat. Fille faible, p. 2.140. Suites de couches naturelles. Sortie de la mère en bon état le 27 fév. Enfant mort.

147. — Le..., 27 ans, entre le 1er février 1867. Bonne constitution; A. S. V. accessible; a eu un garçon à terme; S. N.; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque le 8 mai; grossesse de 9 mois; premières douleurs le 4 fév. 1 h. s.; rupt. des membr. 6 h. et demie s.; dilat. complète 8 h. s.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. à 8 h. et demie s.; durée totale du travail : 7 h.; délivr. nat. Garçon fort, p. 3.415. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 18 février.

148. — Del..., 22 ans, entre le 14 fév. 67. Bonne constitution : A. S. V. accessible; primipare; réglée à 18 ans, régul.; dernière époque le 15 mai. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 14 fév. 9 h. s.; rupt. des membr. 6 h. s.; dilat. complète le 15 fév. 2 h. m.; sommet O. I. D. P., réduite; accouch. nat. 2 h. et demie m.; durée totale du travail : 6 h.; délivr. nat. Garçon fort, p. 2.920. Mort de la mère par péritonite généralisée le 20 fév.; enfant vivant.

149. — Riv..., 19 ans, entre le 14 fév. 1867. Bonne constitution; A. S. V. accessible; primipare; réglée à 12 ans et demi; dernière époque (?). Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs le 15 fév. 10 h. s.; rupt. des membr. 16 fév. 8 h. s.; dilat. complète 8 h. et demie s.; épaule droite, C. I. G. A.; version pelvienne à 8 h. et demie s.; durée totale du travail : 22 h.; délivr. nat. Fille faible; p. 2.500. Métrite légère; rhumatisme articulaire du coude gauche. Sortie de la mère en bon état le 14 mars. Mort de l'enfant le 17 fév. par faiblesse congénitale.

150. — Ch..., 28 ans, entre le 7 mars 1867. Bonne constitution; A. S. V. accessible; primipare; réglée à 19 ans, régul.; dernière époque le 16 mai. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 7 mars, 8 h. m.; rupt. des membr. 3 h. m.; dilat. complète 9 h. s.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. 10 h. et demie s.; durée totale du travail : 16 h.; délivr. nat. Garçon fort, p. 2.610. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 18 mars.

151. — Bou..., 24 ans, entre le 29 mai 67. Constitution bonne; A. S. V. accessible; primipare; réglée à 17 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs 29 mai, 3 h. s.; rupt. membr. 30 mai, 6 h. s.; dilat. complète idem; extrémité pelvienne, S. I. G. A.; accouch. nat. 6 h. et demi s.; durée totale du travail : 28 h.; déliv. nat. Enfant : garçon fort, p. 2.500 Suites de couches : eschares de la vulve. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état 2 juin 1870.

152. — Dur.. , 22 ans, entre le 20 mai 67. Constitution bonne ; A. S. V. accessible; primipare; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 7 mois et demi; premières douleurs 21 mai, 3 h. m.; rupt. artif. membr. 9 h. m.; dilat. complète (?); ext. pelvienne (mode des pieds), S. I. G. A.; accouch. nat. 9 h. m.; durée totale du travail : 6 h.; délivr. nat. Enfant : garçon faible, p. 1.850. Suites de couches nat. Sortie de la mère en bon état 21 juin. Enfant mort le 22 mai.

153. — Bil..., 28 ans, entre le 19 avril 67. Bonne constitution ; A. S. V. accessible; 2 filles à terme, nat.; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs 8 mai, 7 h. et demie s.; rupt. membr. 8 h. et demie m.; dilat. complète 9 mai, 7 h. et demie m.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. 7 h. et demie m.; durée totale du travail : 12 h.; délivr. nat. Enfant : garçon fort, p. 2.775. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état 27 mai.

154. — Dib..., 23 ans, entre le 9 mai 67. Bonne constitution; A. S. V. accessible; 1 garçon à terme; sommet nat.; réglée à 14 ans, régul.; dernière menstruat. 8 août. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 15 mai, 10 h. s.; rupt. membr. idem.; dilat. complète 16 mai, 11 h. et demie m.; sommet, 1 circulaire, O. I. G. A.; accouch. nat. 11 h. et demi m.; durée totale du travail : 16 h.; déliv. nat. Enfant : garçon mort, p. 3.140. Mort de la mère par infection purulente 6 mai.

155. — Dum..., 27 ans, entre le 29 avril 67. Bonne constitution : A. S. V. accessible; un avortement; menstruation régul.; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs 9 avril, 8 h. s.; rupt. membr. idem; dilat. complète 10 avril, 1 h. et demie m.; sommet O. I. D. P., réduite; accouch. nat. 1 h. et demi m.; durée totale du travail : 6 h.; délivr. nat. Enfant : fille forte, p. 3.900. Suites de couches : métrite. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état 18 avril.

156. — Pa..., 30 ans, entre le 13 avril 67. Bonne constitution : A. S. V. accessible; 2 garçons à terme, sommet nat.; réglée à 16 ans, régul.; dernière époque 20 juillet. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 23 avril, minuit; rupt. membr. 6 h. m.; dilat. complète 6 h. et demie m.; sommet O. I. D. P.; accouch. nat. 7 h. m.; durée totale du travail : 7 h.; délivr. nat. Enfant : garçon fort, p. 3.220. Suites de couches : engorgement de la mamelle gauche. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état 8 mai.

157. — Riv..., 21 ans, entre le 25 mars 1867; A. S. V. accessible. Bonne constitution; 1 garçon à terme; sommet nat.; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs le 25 mars, à 3 h. s.; rupt. des membr. à 7 h. et demie s.; dilat. complète le 26 mars, à 7 h. et demie m.; épaule gauche; C. I. D. P.;

accouch. par version pelvienne à 8 h. m.; durée totale du travail : 17 h.; délivrance nat. Enfant : fille morte, p. 2.500. Suites de couches : fièvre, douleurs abdominales. Sortie de la mère en bon état le 8 avril.

158. — Gai..., 17 ans, entre le 24 fév. 1867. Bonne constitution; A. S. V. accessible; primipare; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 24 fév., à 3 h. s.; rupt. des memb. le 25 fév., à 1 h. et demie m.; dilat. complète à 3 h. m.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. 3 h. et demie m.; durée du travail 13 h.; délivr. nat. Fille forte, p. 2.850. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant le 7 mars en bon état.

159. — Bis..., 24 ans, entre le 18 juill. 1866. Constitution bonne; A. S. V. accessible; 1 garçon à terme, spontané; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque le 15 oct. Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs le 22 juill., à 9 h. m.; rupt. membr. (?); dilat. complète à 8 h. s.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. à 8 h. et demie s.; durée totale du travail : 11 h.; délivrance nat. Enfant : fille forte, p. 2.500. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant le 2 août.

160. — Aus..., 28 ans, entre le 16 juill. 1866. Constitution bonne; A. S. V. accessible; 2 garçons avant terme, spontanés; réglée à 16 ans, régul.; dernière époque le 17 oct. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 16 juill., à 2 h. s.; rupt. membr. à 10 h. et demie s.; dilat. complète, id.; sommet O. I. D. P., réduite; accouch. nat. à 11 h. s.; durée totale du travail : 9 h.; délivrance nat. Enfant : garçon fort, p. 2.980. Suites de couches : fièvre. Sortie de la mère et de l'enfant le 24 juill., trop tôt.

161. — Géa..., 19 ans, entre le 26 juill. 1866. Constitution bonne; A. S. V. accessible; 1 fille avant terme, nat.; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 26 juill., à 6 h. m.; rupt. membr. à 11 h. m.; dilat. complète à 11 h. et demie m.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. à midi; durée totale du travail : 6 h.; délivrance nat. Enfant : fille faible, p. 3.400. Suites de couches : abcès au sein. Mort de l'enfant le 27 juill. Sortie de la mère en assez bon état le 18 août.

162. — Car..., 23 ans, entre le 26 juill. 1866. Constitution bonne; A. S. V. accessible; 2 filles à terme, nat.; réglée à 12 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 26 juill., à 6 h. m.; rupt. membr. (?); dilat. complète à 11 h. et demie m.; sommet O. I. D. P., réduite; accouch. nat. à midi; durée totale du travail : 6 h.; délivrance nat. Enfant : garçon fort, p. 3.000. Suites de couches : métrite. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 2 août.

163. — Leg..., 25 ans, entre le 4 août 1866. Constitution bonne ; A. S. V. accessible ; primipare ; réglée à 11 ans, régul. ; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois ; premières douleurs le 5 août, à 4 h. s. ; rupt. membr. (?) ; dilat. complète à 8 h. et demie s. ; sommet O. I. G. A. ; accouch. nat. à 9 h. s. ; durée totale du travail : 5 h. ; délivrance nat. Enfant : garçon fort, p. 2.665. Suites de couches : eschares de la vulve. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état, le 10 août.

164. — La..., 40 ans, entre le 28 juill. 1866. Constitution bonne ; A. S. V. accessible ; 6 garçons et 1 fille à terme, nat. ; réglée à 16 ans, régul. ; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois ; premières douleurs le 29 juill., à 6 h. s. ; rupt. membr. (?) ; dilat. complète à 10 h. et demie s. ; sommet, 1 circulaire lâche, O. I. G. A. ; accouch. nat. à 11 h. et demie s. ; durée totale du travail : 6 h. ; délivrance nat. Enfant : garçon fort, p. 3.210. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 13 août.

165. — Ble..., 23 ans, entre le 7 août 1866. Constitution faible ; A. S. V. accessible ; 1 garçon à terme ; face ; réglée à 14 ans, irrégul. ; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois ; premières douleurs le 6 août, à 6 h. s. ; rupt. membr. le 7 août, à 11 h. m. ; dilat. complète (?) ; épaule ; à 5 h. s. version pelvienne ; extraction de la tête ; durée totale du travail : 23 h. ; délivrance nat. ; hémorrhagie. Enfant : garçon fort, p. 3.500. Suites de couches : métrite. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 28 août.

166. — Ber..., 22 ans, entre le 2 août 1866. Constitution bonne ; A. S. V. accessible ; primipare ; réglée à 12 ans, régul. ; dernière époque (?). Grossesse de 8 mois et demi ; premières douleurs le 5 août, à 7 h. s. ; rupt. membr. à 11 h. et demie s. ; dilat. complète le 6 août, à 4 h. et demie s. ; sommet O. I. G. A. ; accouch. nat. à 5 h. et demie s. ; durée totale du travail : 21 h. ; délivrance nat. Enfant : garçon fort, p. 2.540. Suites de couches : fièvre et douleurs utérines. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 17 août.

167. — Bert..., 25 ans, entre le 8 août 1866. Constitution bonne ; A. S. V. accessible ; primipare ; réglée à 17 ans, irrégul. ; dernière époque, 20 oct. Grossesse de 9 mois, premières douleurs le 8 août, 8 h. s. ; rupt. membr. le 9 août, 4 h. m., artif. ; dilat. complète, id. ; sommet O. I. G. A. ; accouch. nat. 1 h. et demie s. ; durée totale du travail : 8 h. ; délivr. nat. Enfant : fille, forte, p. 2.980. Suite de couches : eschares de la vulve. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 18 août.

168. — Jac..., 25 ans, entre le 8 août 1866. Constitution bonne ; A. S. V. ; accessible ; 1 fille à terme, nat. ; réglée à 13 ans, irrégul. ; dernière époque (?). Grossesse de 8 mois et demi ; premières douleurs 8 août,

2 h. m.; rupt. membr. artif., 1 h. et demi s.; dilat. complete 6 août, 1 h. et demie; sommet O. I. D. P., réduite; accouch. nat. 2 h. s.; durée totale du travail : 12 h.; délivr. nat. Enfant : garçon fort, p. 2.540. Suites de couches : engorgement des mamelles. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 18 août.

169. — Bon..., 27 ans, entre le 10 août 1866. Constitution bonne; A. S. V. accessible; un garçon à terme, sommet, forceps; réglée à 13 ans, régul.; dernière époque 3 nov. Grossesse de 9 mois; premières douleurs, 11 août, 6 h. m.; rupt. membr. artif., 3 h. et demie s.; dilat. complète, id.; sommet O. I. D. P., réduite; accouchement nat., 3 h. et demie s.; durée totale du travail, 9 h. et demie; délivr. nat. Enfant : fille, forte, p. 2.950. Suites de couches : diarrhée, fièvre. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 20 août.

170. — Cha..., 23 ans. Constitution bonne, entre le 8 août 1866; A. S. V. accessible; 1 garçon avant terme, nat.; réglée à 20 ans, régul.; dernière époque 29 nov. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 9 août, 10 h. m.; rupt. membr., 10 août, 1 h. m.; dilat. complète, id.; sommet, circulaires lâches autour du cou; O. I. G. A.; accouch. nat. 1 h. m.; durée totale du travail, 15 h.; délivr. nat. Enfant : garçon fort, p. 3.320. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état 18 août.

171. — Kun..., 26 ans, entre le 5 sept. 1866. Constitution bonne; A. S. V. accessible; 1 garçon à terme, nat.; réglée à 17 ans, régul.; dernière époque 19 déc. Grossesse de 9 mois; premières douleurs, 5 sept., 6 h. m.; rupt. membr. 5 sept., 11 h. et demie, m.; dilat. complète, midi et demi; sommet O. I. D. P., réduite; accouch. nat. midi et demi; durée totale du travail : 6 h.; délivr. nat. Enfant : garçon fort, p. 3.250. Suites de couches : angioleucite, fièvre. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état 13 sept.

172. — Tau..., entre le 13 août 1866. Constitution bonne; A. S. V.; accessible; 5 filles à terme, nat.; réglée à 11 ans, régul.; dernière époque, 16 nov. Grossesse de 9 mois; premières douleurs, 13 août, 7 h. m.; rupt. membr., 3 h. et demie s.; dilat. complète, 5 h. et demie s.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. 5 h. et demie s.; durée totale du travail, 11 h.; délivr. nat. Enfant : garçon, fort, p. 3.750. Suites de couches : embarras gastrique. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état 23 août.

173. — Gre..., 22 ans, entre le 12 août 1866. Constitution bonne; A. S. V. accessible; primipare; réglée à 16 ans, régul.; dernière époque 10 nov. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 31 août, 9 h. s.; rupt. membr. 1er sept., 7 h. et demie m.; dilat. compl. 8 h. et demie m.; som-

met O. I. D. P.; réduite; accouch. nat. 10 h. m.; durée totale du travail, 13 h. Enfant : fille forte, p. 3.450. Suites de couches : embarras gastrique fébrile. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 11 sept.

174. — Dup..., 36 ans, entre le 27 août 1866. Constitution assez bonne; A. S. V. accessible; 2 filles à terme, nat.; réglée à 17 ans, régul.; dernière époque le 7 mars. Grossesse de 6 mois et demi; premières douleurs le 29 août, à 5 h. m.; rupt. membr. accident. à 7 h. et demie m.; dilat. complète à 6 h. s.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. à 6 h. s.; durée totale du travail : 13 h.; délivrance artific.; hémorrhagie. Enfant : garçon faible, p. 1.440. Suites de couches : fièvre; mort de l'enfant peu après sa naissance. Sortie de la mère en bon état le 10 sept.

175. — Dum..., 25 ans, entre le 14 août 1866. Constitution bonne; A. S. V. accessible, primipare; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 14 août, à 4 h. m.; rupt. des membr. à 10 h. m.; dilat. complète à 2 h. s.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. à 3 h. s.; durée totale du travail : 11 h. Enfant : garçon faible, p. 2.700. Suites de couches : embarras gastrique. Sortie de la mère en bon état et de l'enfant avec ophthalmie le 21 août.

175. — Kl..., 26 ans, entre le 11 août 1866. Constitution bonne; A. S. V. accessible; primipare; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs le 14 août, à 2 h. m.; rupt. membr. le 13 août, à 9 h. m.; dilat. complète le 14 août, à 8 h. m.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. à 8 h. et demie m.; sommet, 1 circulaire serrée, O. I. G. A.; durée totale du travail : 6 h.; délivrance nat. Enfant : fille faible, p. 2.700. Suites de couches : péritonite généralisée; mort de la mère le 22 août.

176.— Fai..., 20 ans, primipare, entre le 11 déc 1868. Bien constituée : A. S. V., accessible; réglée à 12 ans et régulièrement; dernière menstruation le 25 mars. Grossesse actuelle de 9 mois; premières douleurs le 10 déc. à 6 h. du m.; rupt. des membr. le 11 déc. à 1 h. du s.; dilat. complète à 8 h. et demi du s.; sommet O. I. D. P., réduite; accouch. naturel à 8 h. trois quarts; durée totale du travail 38 h. trois quarts; délivr. nat. Fille forte, p. 2.950. Métrite et diarrhée. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 24 déc.

177. — Con..., 24 ans, entre le 17 août 66. Constitution bonne; A. S. V. accessible; 1 fille à terme, nat.; réglée à 12 ans, régul.; dernière époque 18 janv. Grossesse de 7 mois et demi; premières douleurs 17 août, 5 h. s.; rupt. membr. 18 août, minuit et demi; dilat. complète 1 h. et demie m.; sommet O. I. D. P., réduite; accouch. nat. 1 h. et demie m.; durée

totale du travail : 9 h. Enfant : Fille faible, p. 1.985. Suites de couches, phlébite, état typhoïde. Mort de l'enfant 28 août. Mort de la mère le 28 août.

178. — Va..., 23 ans, entre le 29 août 66. Constitution bonne; A. S. V. accessible; 1 garçon à terme, nat.; réglée à 17 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 8 mois; premières douleurs 29 août, 6 h. s.: rupt. membr. 30 août, 4 h. m.; dilat. complète 30 août, 5 h. m.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. 5 h. m.; durée totale du travail: 10 h. Enfant : fille forte, p. 2.230. Suites de couches nat. Sortie de l'enfant et de la mère en bon état le 11 sept.

179. — Lo..., 24 ans, entre le 29 sept. 66. Constitution bonne ; A. S. V. accessible ; 1 garçon à terme, nat. ; réglée à 17 ans, régul. ; dernière époque 15 janv. Grossesse de 8 mois et demi ; premières douleurs 7 oct., 3 h. m.; rupt. membr. 4 h. m.; dilat. complète 5 h. et demie s.; sommet O. I. G. A. ; accouch. nat. 5 h. et demie s. ; durée totale du travail : 15 h.; délivr. nat. Enfant, fille forte, p. 2.520. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état 17 oct.

180. — Hus..., 21 ans, entre le 17 sept. 66. Constitution bonne; A. S. V. accessible; primipare; réglée à 17 ans, régul.; dernière époque 26 oct. Grossesse de 9 mois ; premières douleurs 19 sept., minuit et demi; rupt. membr. 5 h. s.; dilat. complète 9 h. s. ; sommet O. I. D. P., réduite; accouch. nat. 10 h. et demie s. ; durée totale du travail : 22 h. ; délivr. nat. Enfant, fille forte, p. 2.850. Suites de couches : arthrite du coude; Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 2 oct.

181. — Cri..., 31 ans, entre le 31 oct. 1866. Constitution bonne; A. S. V. accessible; primipare; réglée à 18 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 8 mois; premières douleurs 30 oct., 11 h. s.; rupt. membr. 31 oct., 3 h. et demie s.; dilat. complète 6 h. et demie s.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. 7 h. s.; durée totale du travail, 20 h.; déliv. nat. Enfant : fille faible, p. 1.719. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 8 nov.

182. — Gad..., 27 ans, entre 22 oct. 1866. Constitution bonne; A. S. V. accessible; un garçon à terme, nat.; réglée à 19 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 8 mois; premières douleurs 25 oct , 8 h. s.; rupt. membr. 26 oct., 5 h. m.; dilat. complète, id. Grossesse gémellaire; 1er né, sommet O. I. G. A.; accouch. 5 h. et demie m.; 2e, sommet O. I. D. P., réduite ; accouch. 7 h. m.; durée totale du travail, 11 h.; délivr. nat. Enfants : 1er né, garçon faible, p. 1.650; 2e, p. 2.010. Suites de couches : lymphangite de la mamelle droite. Sortie de la mère en bon état et des enfants très-faibles 5 nov.

183. — Mar..., 29 ans, entre le 22 oct. 1866. Constitution bonne; A. S. V. accessible; 2 garçons à terme, nat.; réglée à 13 ans et demi, régul.; dernière époque 2 fév. Grossesse de 9 mois, hydramnios; premières douleurs 23 oct., 5 h. m.; rupt. membr. 11 h. et demie m.; dilat. complète id.; sommet, circulaire sur le cou, O. I. G. A.; accouch. nat. midi; durée totale du travail, 7 h.; délivr. nat. Enfant : garçon, fort, p. 3,450. Suites de couches : fièvre. Sortie de la mère et de l'enfant 27 oct., en bon état.

184. — Ver..., 18 ans, entre le 30 août 1866. Constitution bonne; A. S. V. accessible; primipare; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque 2 déc. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 6 oct., 10 h. s.; rupt. membr. 7 oct., 3 h. m.; dilat. complète 8 oct., 4 h. et demie m., sommet O. I. G. A.; accouch. nat. 7 h. m.; durée totale du travail, 35 h.; délivr. nat. Enfant : garçon fort, p. 3.400. Suites de couches : embarras gastrique fébrile. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 22 oct.

185. — Lel..., 20 ans, entre le 15 nov. 1866.— Constitution faible, A. S. V. accessible; une fille à terme, nat.; réglée à 11 ans, régul.; dernière époque 15 mars. Grossesse de 7 mois ; choléra le troisième mois, syphilis; premières douleurs 15 nov., 1 h. m.; rupt. membr. 14 nov., 6 h. s.; dilat. complète 15 nov., 3 h. soir; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. 15 nov., 3 h. et demie s.; durée totale du travail, 14 h.; délivr. nat. Enfant : garçon faible, p. 1.270. Suites de couches : métrite et entérite; mort de l'enfant deux heures après sa naissance. Sortie de la mère en bon état 5 déc.

186. — Deh..., 22 ans, entre le 23 nov. 1866. Constitution bonne; A. S. V. accessible; une fille à terme, nat.; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs 23 nov., 2 h. s.; rupt. membr. 6 h. et demie s.; dilat. complète 7 h. et demie s.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. 8 h. et demie s.; durée totale du travail, 6 h.; délivr. nat. Enfant : garçon fort, p. 3.260. Suites de couches : fièvre. Sortie de l'enfant et de la mère en bon état le 30 nov.

187. — Fes..., 29 ans, entre le 29 juillet 1868. Bonne constitution; A. S. V. accessible; accouchée à terme et naturell. d'une fille.; réglée à 14 ans, régul. ; dernière menstr. le 8 nov. Grossesse act. de 8 mois et demi; premières douleurs le 29 juil., à 11 h. s.; rupt. des membr. à 9 h s., le 30 juil.; dilat. complète à ce moment; présentation du sommet O. I. G. A.; terminaison nat. de l'accouch. à 9 h. et demie s. ; délivrance nat. Enfant : garçon médiocre, p. 2.700. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 8 août.

188. — Ler..., 28 ans, entre le 25 juin 1868. Rachitique; angle S. V.

accessible; diam. S. S. P. 0m.105; primipare; réglée à 16 ans, irrégul.; dernière menstr. le 30 déc. Grossesse act. de 6 mois et demi; premières douleurs le 29 juil., à 5 h. s.; rupt. artif. des membr. le 30 juil., à 5 h. 40 s.; dilat. complète à 5 h. 10 s.; présentation du sommet O. I. D. P., réduite; accouch. nat. à 5 h. et demie; durée totale du travail : 60 h. et demie; délivrance nat. Enfant : garçon faible, p. 2.400. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 12 août.

189. — Lal..., 23 ans, entre le 7 déc. 1866. Constitution bonne; A. S. V. accessible; 2 filles à terme, nat.; réglée à 10 ans, régul.; dernière époque le 5 mars. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 8 déc., à 2 h. s.; rupt. membr. à 7 h. et demie s.; dilat. complète à 9 h. et demie s.; sommet, 1 circulaire, O. I. G. A.; accouch. nat. à 10 h. s.; durée totale du travail : 8 h.; délivrance nat. Enfant : garçon fort, p. 3.320. Suites de couches : embarras gastrique fébrile. Sortie de la mère et de l'enfant le 15 déc. en bon état.

190. — Cou..., 27 ans, entre le 12 nov. Constitution bonne; A. S. V. accessible; 1 garçon à terme, nat.; réglée à 16 ans, irrégul.; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 13 nov., à 10 h. m.; rupt. membr. à 10 h. et demie m.; dilat. complète, id.; pelvis S. I. G. A.; accouch. nat. à 11 h. m.; durée totale du travail : 9 h.; délivrance nat. à 11 h. m. Enfant : garçon fort, p. 3.050. Suites de couches : fièvre, douleurs abdominales. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 21 nov.

191. — Char..., 30 ans, entre le 12 sept. 1866. Constitution bonne; A. S. V. accessible; 1 garçon à terme, nat.; réglée à 13 ans, régul.; dernière époque le 18 déc. Grossesse de 8 mois; premières douleurs le 15 sept., à 6 h. s.; rupt. membr. le 14 sept., à 11 h. m.; dilat. complète le 16 sept., à 2 h. m.; sommet O. I. D. P., réduite; accouch. nat. le 16 sept., à 2 h. m.; durée totale du travail : 8 h.; délivrance nat. Enfant : fille faible, p. 2.060. Suites de couches nat. Sortie de la mère en bon état et de l'enfant avec ictère, le 24 sept.

192. — Sté..., 39 ans, entre le 15 déc. 1866. Bonne constitution; A. S. V. accessible; primipare; réglée à 21 ans, régul.; dernière époque le 25 mars. Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs le 15 déc., à 4 h. s.; rupt. des membr. le 15 déc., id.; dilat. complète le 16 déc., à 4 h. m.; sommet O. I. D. P., réduite; accouch. nat. le 16 déc., à 4 h. et demie m.; durée totale du travail : 12 h. Enfant : fille forte, p. 2.700. Suites de couches : eschares à la vulve. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 28 déc.

193.— Lam..., 22 ans, entre le 22 juillet 1868. Bonne constitution; Art. S. V. accessible; accouchée antérieurement d'un garçon venu naturellement

avant terme et par le siége ; réglée à 17 ans, régul.; dernière menstruation le 15 nov. Grossesse actuelle de 8 mois ; premières douleurs le 26 juill., à 1 h. m.; rupt. des membr. aussitôt; dilatation complète, à 1 h. et demie s.; présentation du siége (mode des fesses) S. I. D. P., réduite; accouch. nat. à 2 h. s.; durée totale du travail, 13 h.; délivr. nat. Enfant : fille moyenne, p. 2.400. Suites de couches naturelles. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 3 août.

191. — Leg..., 40 ans, entre le 18 nov. 1868. Constitution bonne ; A. S. V. accessible ; accouch. ant. naturel d'un garçon venu à terme ; réglée à 17 ans, régul. ; dernière menstruation le 15 fév. Grossesse actuelle de 9 mois ; premières douleurs le 17 nov., à 9 h. m.; rupt. artif. des membr. le 18 nov., à 10 h. s.; dilatation complète à ce moment ; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. à 10 h. et demie s.; durée totale du travail, 39 h.; déliv. nat. Péritonite généralisée. Mort de la mère le 23 nov., à 5 h. s. L'enfant sort en bon état le 25 nov.

193. — Cau..., 27 ans, entre le 17 juill. 1868. Bonne constitution ; A. S. V. accessible ; accouchée ant. nat. de 2 garçons à terme ; réglée irrégulièrement ; dernière époque ignorée. Grossesse actuelle de 9 mois ; premières douleurs le 18 sept., à 8 h. m.; rupture des membr. le 21 sept., à 10 h. s.; dilatation complète à 10 h. 40 ; présentation du sommet O. I. G. A.; accouch. nat. le 22 sept., à 2 h. m.; durée totale du travail, 66 h.; déliv. nat. Enfant : garçon fort, p. 3.800. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 30 oct.

196.— Gar..., 33 ans, entre le 5 sept. 1868. Rachitique ; Art. S. V. accessible. Elle a eu antérieurement 2 accouch. naturels par le sommet ; réglée à 16 ans, régul.; dernière menstruation le 24 nov. Grossesse actuelle de 9 mois ; premières douleurs le 10 sept., à 1 h. s.; rupt. des membr. à 7 h. s.; dilatation complète à 6 h. 50, extrémité pelvienne S. I. G. A.; accouch. nat. à 7 h. 25 s.; durée totale du travail, 6 h. et demie ; délivrance naturelle. Enfant : fille forte, p. 3.200. Suites de couches naturelles. Le 22 sept. la mère et l'enfant sortent en bon état.

197. — Bis..., 22 ans, entre le 20 sept. 1868. Constitution bonne ; A. S. V. accessible ; primipare ; réglée à 16 ans, régul.; dernière menstruation le 30 janv. Grossesse de 8 mois et demi ; premières douleurs le 25 oct., à 11 h. s.; rupt. des membr. le 26 oct., à 11 h. s.; dilatation complète à la même heure ; sommet O. I. G. A., à 11 h. et demie s.; accouch. nat.; durée totale du travail, 26 h. et demie ; délivrance naturelle. Fille forte, p. 2.710. Sortie de la mère et de l'enfant en bonne santé le 4 nov.

198. — Gre..., 21 ans, entre le 20 sept. 1868. Bonne constitution ; A. S. V. accessible ; elle a eu un garçon qui est arrivé naturellement à terme et

par le sommet; réglée à 10 ans et régul.; dernière menstruation ignorée. Grossesse actuelle de 8 mois; premières douleurs le 20 sept., à midi.; rupt. des membr. le 21 sept., à 3 h. 20 m.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. 3 h. et demie m.; durée totale du travail, 15 h. et demie; délivrance naturelle. Fille médiocre, p. 2.000. Suites de couches naturelles. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 28 sept.

199. — Rei..., 20 ans, entre le 23 oct. 1868. Bonne constitution; A. S. V. accessible; primipare; réglée à 14 ans, régul.; dernière menstruation ignorée. Grossesse actuelle de 8 mois et demi; premières douleurs le 23 oct., à 7 h. s; rupt. des membr. à 10 h. 45 s.; dilat. complète (?); présentation du sommet O. I. G. A.; accouch. nat. le 24 oct., 11 h. m.; durée totale du travail, 15 h. 45; délivr. nat. Fille moyenne, p. 2.680. Métrite survenue peu après. Sortie de la mère en bon état, et de son enfant, le 21 nov.

200. — Lec..., 32 ans, entre le 18 août 1868. Bonne constitution; articulation S. V. accessible; accouch. nat. d'une fille venue à terme et par le sommet; réglée à 15 ans, irrég.; dernière époque ignorée. Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs 17 août, 10 h. s.; rupt. membr. 4 h. 45 s.; dilat. complète 4 h. 25 s.; présentation du sommet O. I. G. A.; accouch. 4 h. et demie, par le forceps appliqué au détroit inf.; procidence du cordon ombilical; rétropulsion; durée totale du travail, 18 h. et demie; délivr. nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état 27 août.

201. — Lou..., 26 ans et demi, entre le 19 août 1868. Bonne constitution; articulation S. V. accessible, primipare; réglée à 17 ans régul.; dernière menstruation 7 nov. Grossesse actuelle de 9 mois; premières douleurs le 21 août, 1 h. s.; rupt. membr. 7 h. 45 s.; dilat. complète 8 h. et demie; sommet O. I. D. P.; accouch. nat., 9 h. s.; durée totale du travail 8 h. et demie; délivr. nat. Enfant : fille forte, p. 3.090. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 2 sept.

202. — Lot..., 37 ans, entre le 16 août 1868. Bonne constitution; articulation S. V. accessible; 3 garçons et 8 filles venues nat. à terme; 10 présentations par le sommet, 1 par l'extrémité pelvienne; réglée à 10 ans, irrégul.; dernière menstruation le 27 oct.; époque présumée de la grossesse, 9 mois; premières douleurs 20 août, 4 h. s.; rupture artif. des membr. le 21 août, midi; dilat. complète 3 h. et demie s.; présentation du sommet O. I. G. A. 4 h. 40 s.; accouch. nat.; durée totale du travail, 16 h. et demie; délivrance nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 31 août.

203. — Vei..., 22 ans et demi, entre le 26 août. Bonne constitution; articulat. S. V. accessible; primipare; réglée à 12 ans, régul.; dernière

menstruation 19 nov. Grossesse act. de 9 mois; premières douleurs 25 août, 11 h. s.; rupt. membr. 26 août, 5 h. m.; dilat. complète 4 h. s.; présentation du siége (mode des fesses) S. I. G. A.; accouch. nat. 26 août, 4 h. et demie s.; déchirure du périnée; durée totale du travail, 15 h. et demie; délivr. nat. Enfant : garçon, moyen, p. 2.300. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état 7 sept.

204. — Deb..., 35 ans, entre le 17 mai. Bien constituée; A. S. V. accessible; primipare; réglée à 18 ans, régul.; dernière apparition des règles le 20 août. Grossesse act. de 9 mois; apparition des premières douleurs, légères, le 14 mai, à 10 h. du s.; plus fortes le 16, à 11 h. du s.; rupt. des membr. le 16 mai, à 10 h. du s.; dilat. complète 17 mai, 11 h. s.; présentation du sommet O. I. G. A.; procidence du cordon ombilical. Mort du fœtus sans que l'on ait pu intervenir, à cause de l'étroitesse et de la résistance de l'orifice; terminaison de l'accouch. nat. le 18 mai, à 3 h. et demie m.; durée totale du travail 52 h. et demie; déliv. nat. Fille forte, p. 3.500; quelques phénomènes d'infection putride. Sortie de la mère non guérie le 23 mai.

205. — Sau..., 37 ans, entre le 3 nov. 66. Constitution bonne; A. S. V. accessible; trois filles, un garçon à terme, nat.; réglée à 17 ans, régul.; dernière époque 28 janv. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 1 nov., 8 h. s.; rupt. des membr. 2 nov., 3 h. s.; dilat. complète 3 nov., 10 h. s.; face, variété frontale T. I. G. A.; 3 nov. 10 h. s., crâniotomie, céphalotripsie; durée totale du travail 51 h.; déliv. nat. Enfant : garçon, p. 3.550. Suites de couches : métrite. Sortie de la mère en bon état 17 nov.

206. — Bur..., 21 ans, entre le 2 avril. Constitution bonne; A. S. V. accessible; 1 garçon à terme, sommet nat; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque menstruelle (?). Grossesse actuelle de 9 mois; apparition des premières douleurs 1 avril, 9 h. s.; rupt. artific. des membr. 2 avril, 1 h. s.; dilat. complète 1 h. 20 s.; présent. sommet O. I. G. A.; accouch. nat. 1 h. et demie s.; durée totale du travail, 16 h. et demie; déliv. nat. Enfant : fille forte, p. 3.220. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 11 avril.

207. — Dal..., 21 ans, entre le 26 mars. Constitution faible; A. S. V. accessible; primipare; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque menstr. 24 juin. Grossesse actuelle de 8 mois et demi; apparition des premières douleurs 6 avril, 6 h. et demie m.; rupt. des membr. prématurée 5 avril, 9 h. m.; dilat. complète 6 avril, 6 h. et quart s.; présent. sommet O. I. D. P., réduite; accouch. nat. 6 avril, 6 h. et demie s.; durée totale du travail, 12 h.; déliv. nat. Enfant : fille, p. 2.400. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 16 avril.

208. — Lem..., 20 ans, entre le 4 mars. Bonne constitution; A. S. V. accessible; 1 garçon à terme; sommet nat.; réglée à 15 ans, irrégul.; dernière époque menstruelle (?). Grossesse de 8 mois et demi; apparition des premières douleurs 4 mars, 8 h. s.; rupt. artific. des membr. 5 mars, 2 h. 50 s.; dilat. complète idem; présent. sommet O. I. G. A.; accouch. nat. 3 h. s.; durée totale du travail : 21 h.; déliv. nat. Enfant: garçon assez fort, p. 2.450. Sortie de la mère et de l'enfant le 18 mars en assez bon état.

209. — Lab..., 25 ans, entre le 28 mars. Constitution bonne; A. S. V. accessible; accouch. artific. d'une fille à terme par le sommet; réglée à 10 ans, régul.; dernière époque menstr. 15 août. Grossesse de 8 mois et demi; apparition des premières douleurs le 24 avril, à 7 h. s.; rupt. prématurée des membr. le 20 avril; dilat. complète le 25 avril, à 7 h. 10 m.; présent. sommet, O. I. G. A.; accouch. nat. à 7 h. et demie mat. Enfant : garçon faible, p. 2.300. Suite de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en assez bon état le 6 mai.

210. — Sie..., 26 ans, entre le 24 mars. Constitution bonne; A. S. V. accessible; une fille à terme, sommet nat.; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque menstr. 1er juin. Grossesse de 9 mois; hydroamnios; apparition des premières douleurs le 29 mars, à 7 h. et demie m.; rupt. artific. des membr. à 4 h. s.; présent. sommet O. I. G. A.; accouch. nat. 5 h. et demie s.; durée totale du travail, 13 h.; délivr. nat. Enfant : fille forte, p. 3.200. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 6 avril.

211. — Fou..., 28 ans, entre le 11 août 66. Constitution bonne; A. S. V. accessible; primipare; réglée à 16 ans, régul.; dernière époque le 22 novembre. Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs le 11 août, à 8 h. m.; rupt. membr. à 3 h. et demie s.; dilat. complète 12 août, 1 h. m.; sommet, O. I. G. A.; forceps au détroit inférieur à 4 h. et demie m.; durée totale du travail : 21 h.; déliv. nat. Enfant : fille faible, p. 2.160; morte 30 h. après sa naissance. Suites de couches : métrite et tympanite. Mort de l'enfant 12 août. Sortie de la mère en bon état le 19 septembre.

212. — Bal..., 18 ans, entre le 2 février. Bien constituée; A. S. V. accessible; primipare; réglée à 15 ans, irrégul.; dernière époque menst. (?). Grossesse de 8 mois et demi; (nausées, vomissements, leucorrhée pendant les premiers mois); apparition des premières douleurs 2 février, 6 h. s.; rupt. membr. 3 février, 3 h. et quart m.; dilat. complète id.; présent. sommet O. I. G. A.; accouch. nat. 3 h. et demie m.; durée totale du travail, 9 h.; déliv. nat. Enfant : fille, p. 2.290, Suites de couches : péritonite. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état 17 février.

213. — Dru..., 22 ans, entre le 30 avril 1866. Constitution frêle; A. S. V. accessible; primipare; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 8 mois; premières douleurs le 30 avril, à 9 h. m.; rupt. des memb. id.; dilat. complète à 7 h. et demie s.; sommet, O. I. G. A.; accouch. nat. à 8 h. trois quarts; durée totale du travail 12 heures; délivr. nat. Enfant : fille forte, 2.250. Suites de couches laryngite; morte le 2 mai. Enfant bien portant.

214. — Pere..., 26 ans, entre le 30 juin 66. Constitution assez bonne; A. S. V. acessible; 3 garçons et 1 fille à terme; sommet, nat.; réglée à 16 ans, irrégul.; dernière époque 15 septembre. Grossesse actuelle de 8 mois et demi; premières douleurs 4 juillet, à 2 h. s.; rupt. membr. à 6 h. s.; dilat. complète à 9 h. s.; sommet O. I. D. P_4, réduite; accouch. nat à 9 h. et demie s.; durée totale du travail 7 h.; délivr. nat. Enfant : fille forte, p. 2.540. Suite de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 14 juillet.

215. — Gév..., 18 ans, entre le 6 juin. Constitution générale bonne; A. S. V. accessible; primipare; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque, 5 septembre. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 13 juillet, à 11 h. s.; rupt. membr. 14 juillet, à 5 h. et demie m., artif.; sommet O. I. D. P., réduite artific., à 5 h. et demie s.; incisions à l'orifice, tentatives d'applicat. du forceps au détroit supér. (?), crâniotomie et céphalotripsie; durée totale du travail, 18 h.; délivr. artif. immédiate. Enfant : fille, p. 2.580. Suites de couches : métrite. Sortie en bon état le 16 août.

216. — Ser..., 41 ans, entre le 13 mai 1866. Constitution bonne; A. S. V. accessible; a eu un garçon et 2 filles S N.; réglée à 14 ans, régul.; dernière menstruation le 29 juill. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 13 mai, à 9 h. m. rupt. des membr. le 12 mai, à 2 h. m.; dilat. complète à 5 h. s.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat., à 5 h. et demie s.; durée totale du travail, 8 h. et demie; délivr. compliquée d'hémorrhagie externe (400 gr. de sang). Fille forte, p. 3.280. Suites de couches, fièvre typhoïde. Mort de la mère le 4 juin. Enfant en bon état.

217. — Las..., 37 ans, entre le 20 déc. 1867. Bien constituée; A. S. V. accessible; trois garçons et trois filles, 4 à terme et 2 avant terme (sommet et acc. nat); réglée à 18 ans, régul.; dernière époque menstruelle le 10 mars 1867. Grossesse de 9 mois; leucorrhée et vomissements à partir du 4e mois; apparition des premières douleurs le 5 janv., à 2 h. m.; rupt. des membr. artific. à 4 h. s.; présent. sommet O. I. G. A.; accouch. nat. à 5 h. 20 s.; durée totale du travail, 15 h.; délivr. nat. Enfant : garçon fort, p. 3.380. Suites de couches : fièvre et douleurs abdominales. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 18 janv.

218. — Che..., 40 ans. Bien constituée; A. S. V. accessible; 5 filles et 4 garçons (7 accouch. nat. et 2 artific.); réglée à 14 ans, régul.; dernière époque menstruelle le 27 mars. Grossesse actuelle de 9 mois; apparition des premières douleurs le 6 janv., à midi; rupt. membr. à 4 h. s.; dilat. complète ignorée; présent. sommet O. I. G. A.; fièvre, troubles dans la circulat. fœtale; mort du fœtus; applicat. de forceps au détroit supér. le 7 janv., à 10 h. s.; durée totale du travail, 33 h.; délivr. nat. Enfant : garçon, mort, p. 3.800. Suites de couches nat. Sortie de la malade en bon état le 23 janv.

219. — Bui..., 27 ans, entre le 14 fév. 1866. Constitution forte; A. S. V. accessible; a eu 1 fille à terme S. N.; réglée à 12 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 13 fév., à midi; rupt des membr. artif. à 10 h. s.; dilatation complète le 14 fév., à minuit et demi; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. à minuit et demi; durée totale du travail, 12 h. et demie; déliv. nat. Enfant : fille forte, p. 3.050. Suites de couches : métro-péritonite. Mort de la mère le 17 fév. Enfant bien portant.

220. — Lem..., entre le 12 fév. 1866. Constitution forte; A. S. V. accessible; 1 fille à terme S. N.; réglée à 15 ans; dernière époque le 10 avril. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 11 fév., à 8 h. s.; rupture des membr. id.; dilatation complète le 12 fév., à 11 h. et demie s.; sommet O. I. D. P.; accouch. nat. à 11 h. et demie s.; durée totale du travail, 11 h. et demie; délivr. nat. Fille forte, p. 2.880. Suites de couches naturelles. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 21 fév.

221. — Lam..., 24 ans, entre le 9 fév. 1866. Constitution forte; A. S. V. accessible; primipare; réglée à 16 ans et demi, régul.; dernière époque le 20 mai. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 10 fév., à 5 h. m.; rupt. des membr. à midi et demi; dilatation complète à 9 h. m.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. à 10 h. m.; délivr. nat. Garçon fort, p. 3.308. Suites de couches : métrite. Sortie avec son enfant en bon état le 22 fév.

222. — Lab..., 22 ans, entre le 10 fév. 1866. Constitution forte; face A. S. V. accessible; a eu un garçon avant terme S. N.; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque le 9 mai. Grossesse actuelle de 8 mois et demi; premières douleurs le 10 fév., à 3 h. s.; rupt. des membr. artif. à 10 h. et demie s.; dilat. complète à 10 h. s.; sommet avec une circulaire O. I. G. A.; accouch. nat. à 11 h. s.; durée totale du travail, 8 h.; délivr. nat. Garçon fort, p. 2.255. Suites de couches naturelles. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 19 fév.

223. — Pio..., 26 ans, entre le 2 fév. 1866. Constitution forte; A. S. V. accessible; 1 garçon et 1 fille à terme S. N.; réglée à 14 ans, régul.;

dernière époque (?). Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs le 5 fév., à 4 h. et demie m.; rupt. des membr. (?); dilatat. complète à 5 h. et demie m.; extrémités pelviennes réunies S. I. D. A.; accouch. nat. à 5 h. et demie m.; durée totale du travail, 1 h.; déliv. nat. Garçon fort, p. 2.475. Suites de couches naturelles. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 10 fév.

224. — Gui..., 22 ans, entre le 30 janv. 1866. Constitution forte; A. S. V. accessible; primipare; dernière menstruation (?); réglée à 12 ans, régul. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 30 janv., à 8 h. et demie m.; rupt. des membr. le 31 janv., à 6 h. et demie s.; dilatation complète à 7 h. s.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. à 7 h. et demie s.; durée totale du travail, 11 h.; délivr. nat. Garçon faible, p. 2.830. Suites de couches nat. et sortie de la mère en bon état.

225. — An..., 23 ans, entre le 26 janv. 1866. Constitution forte; A. S. V. accessible; a eu 1 garçon à terme S. N.; réglée à 18 ans; dernière époque (?). Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs le 31 janv., à midi et demi; rupt. artif. des membr. à 7 h. et demie m.; dilat. complète à 4 h. s.; sommet O. I. D. P.; accouch. nat. à 4 h. et demie s.; durée totale du travail : 4 h.; délivrance nat. Fille forte, p. 2.535. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 9 fév.

226. — Cho..., 26 ans, entre le 17 janv. 1866. Constitution forte; face du sacrum et épine sciatique accessibles; 1 garçon à terme S. N.; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque le 31 avril. Grossesse actuelle de 8 mois; premières douleurs le 17 janv., à midi; rupt. des membr. à 7 h. s.; dilat. complète, id.; sommet avec circulaire O. I. G. A.; accouch. nat. à 7 h. et demie s.; durée totale du travail : 7 h. et demie; délivrance nat. Enfant : garçon fort. p. 2.600. Mort de la mère par péritonite le 26 janv. Enfant en bon état.

227. — Lalu..., 30 ans, entre le 5 juin 1866. Bonne constitution; A. S. V. accessible; a eu 1 garçon à terme S. N.; réglée à 17 ans, régul.; dernière époque le 1er sept. Grossesse actuelle de 8 mois et demi; premières douleurs le 8 juin, à 9 h. m.; rupt. des membr. et dilat. complète à 8 h. et demie m.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. à 9 h. m.; durée totale du travail : 12 h.; délivrance nat. Fille forte, p. 2.620. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 21 juin.

228. — Wal..., 19 ans, entre le 11 juin 1866. Constitution faible; A. S. V. accessible; primipare; réglée à 14 ans, irrégul.; dernière menstr. le 1er sept. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 11 juin, à 7 h. s.; rupt. des membr. à 11 h. et demie s.; dilat. complète le 12 juin, à minuit; siége S. I. G. A.; accouch. nat. à minuit et demi; durée totale du travail :

29 h.; délivrance nat. Enfant : fille forte, p. 2.440. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 20 juin, trop tôt.

229. — Breu..., 21 ans, entre le 15 fév. 1866. Constitution forte; angle S. V. accessible; primipare; réglée à 14 ans, régul; dernière époque le 12 mai. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 15 fév., à 2 h. s.; rupt. des membr. le 16 fév., à 8 h. s.; dilat. complète à minuit et demi; sommet O. I. D. P ; accouch. nat. à 2 h. m.; durée totale du travail : 12 h.; délivrance nat. Garçon fort, p. 3.050. Suites de couches : métrite. Sortie de la mère et de son enfant en bon état le 5 mars.

230. — Vau..., 26 ans, entre le 22 fév. 1866. Constitution forte; A. S. V. accessible; primipare; réglée à 20 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs le 22 fév., à 7 h. s.; rupt. des membr. à 8 h. s.; dilat. complète (?) sommet O. I. G. A.; durée totale du travail : 3 h.; délivrance nat. Enfant : fille forte, p. 2.500. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 3 mars.

231. — Char..., 28 ans, entre le 22 mai 1866. Constitution bonne; A. S. V. accessible; primipare; réglée à 17 ans, régul.; dernière époque le 15 août. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 22 mai, à 10 h. m.; rupt des membr. à 4 h. et demie s.; dilat. complète à 9 h. et demie s.; sommet O. I. G. A. avec une circulaire serrée; accouch. nat. à 11 h. et demie s.; durée totale du travail : 13 h.; délivrance nat. Enfant : garçon fort, p. 3.550. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 31 mai.

232. — Pui..., entre le 24 sept. 1865. Constitution forte; A. S. V. accessible; primipare; réglée à 17 ans, régul.; dernière menstr. le 20 fév.; Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 26 nov., à 2 h. et demie s.; rupt. des membr. à 8 h. m.; dilat. complète à 5 h. et demie s.; sommet O. I. D. P.; accouch. nat. à 6 h. et demie s.; durée totale du travail : 4 h.; délivrance nat. Garçon fort, p. 2.300. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 5 déc.

233. Dau..., 21 ans, entre le 3 oct. 1865. Constitution forte; A. S. V. accessible; a eu 1 fille à terme S. N.; réglée à 17 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 8 mois; premières douleurs le 3 oct., à 5 h. et demie m.; rupt. des membr. à 7 h. m.; dilat. complète à 2 h. et demie s.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. à 3 h. s.; durée totale du travail : 9 h. et demie; délivr. artif. Fille faible, p. 2.270. Suites de couches nat. Mort de l'enfant le 4 oct. Sortie de la mère en bon état le 21 oct.

234. — Deb.., 26 ans, entre le 19 oct. 1865. Constitution bonne; A. S. V. accessible; 1 fille avant terme, art.; réglée à 16 ans, régul.; dernière

époque 22 janv. Grossesse de 8 mois et demi ; premières douleurs 19 oct., 9 h.m.; rupt. memb. 5 h. m.; siége S. I. G. A.; incisions à l'orifice; application du forceps; extraction avec le crochet mousse à 10 h. et demie; durée totale du travail : 13 h. et demie; délivrance nat. Garçon mort, p. 2.480. Suites de couches nat. Sortie de la mère en bon état le 22 nov.

235. — Job..., 26 ans, entre le 6 août 1865. Constitution forte; A. S. V. accessible; 1 fille à terme S. N.; réglée à 13 ans, régul.; dernière époque 6 nov. Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs le 6 août, 5 h. s.; rupt. membr. 7 août, 1 h. m.; dilat. complète idem ; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. à 1 h. m.; durée totale du travail : 8 h.; délivrance nat. Garçon fort, p. 2.400. Suites de couches nat. Sortie de la mère en bon état avec son enfant le 17 août.

236 — Ham.., 27 ans, entre le 26 sept. 1865. Constitution forte; A. S. V. accessible; 1 fille avant terme; réglée à 18 ans; dernière époque le 6 janv. Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs le 26 sept., 5 h. s.; rupt. membr. 3 h. s.; dilat. complète à 9 h. et demie s.; sommet O. I. D. P., réduite; accouch. nat. à 10 h. s.; durée totale du travail : 5 h.; délivrance nat. Garçon fort, p. 2.160. Suites de couches : tranchées utérines, eschares des petites lèvres. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 14 oct.

237. — Nio..., 19 ans, entre le 16 sept. 1865. Constitution forte, face antérieure du sacrum accessible; primipare; réglée à 14 ans; dernière menstruation le 22 mars. Grossesse de 8 mois et demi; apparition des premières douleurs le 17 déc., à 9 h. m.; rupt. membr. à midi; dilat. complète à 1 h. s.; durée totale du travail : 4 h. et demie.; délivrance nat. Fille forte, p. 2.820. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 30 déc.

238. — Pri..., 22 ans, entre le 14 déc. 1865. Constitution forte; A. S. V. accessible; primipare ; réglée à 12 ans; dernière menstruation (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 14 déc., à 7 h. m.; dilat. au moyen d'incisions. Sommet O. I. D. P. le 15 déc., à 11 h. et demie m.; application de forceps, puis crâniotomie et céphalotripsie; durée totale du travail : 29 h. et demie; délivrance nat. Garçon, p. 3.410. Suites de couches : métro-péritonite. Sortie de la mère en bon état le 10 janv. 1866.

239. — Ari..., 22 ans, entre le 7 août 1865. Constitution forte; A. S. V. accessible ; primipare; réglée à 11 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois.; premières douleurs le 17 sept., 6 h. m.; rupt. membr. 16 sept., 11 h. s.; dilat. complète le 17 sept., 8 h. et demie s.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. 10 h. et demie s.; durée totale du travail : 16 h. et demie; délivrance nat. Fille forte, p. 2.700. Suites de couches : eschares de

la vulve; empâtement de la fosse iliaque droite. Sortie en bon état le 20 sept.

240. — Bes..., 26 ans, entre le 6 sept. 1865. Constitution forte. Angle sacro-vertébral accessible; a eu artif. une fille à terme; réglée à 15 ans, régul.; dernière menstruation (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 3 sept., 4 h. m.; rupt. des membr. à minuit; dilat. complète le 6 sept., 5 h. s.; sommet O. I. D. P., réduite; accouch. nat. à 5 h. et demie s.; durée totale du travail : 85 h. et demie; délivr. nat. Garçon en état de mort apparente, p. 3.350. Suites de couches nat. Sortie de la mère le 7 sept. L'enfant avait une nécrose du pariétal droit.

241. — Lal..., 23 ans, entre le 12 mai 1866. Constitution bonne; A. S. V. accessible; primipare; réglée à 10 ans, régul.; dernière époque le 4 sept. Grossesse de 8 mois; premières douleurs le 15 mai, 5 h. s.; rupt. des membr. 2 h. s.; dilat. complète le 16 mai par incisions à l'orifice; sommet O. I. G. A.; accouch. par forceps à 6 h. et demie s.; durée totale du travail : 26 h.; délivr. artificielle à cause de l'inertie utérine. Enfant : fille forte, p. 2.800. Suites de couches : fièvre légère. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 11 juin.

242. — Pér..., entre le 5 mars 1870. Constitution bonne; A. S. V. accessible; primipare; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque 8 juin. Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs 6 mars, 9 h. s.; rupt. artif. des membr. 7 mars, 1 h. s.; dilat. complète 9 h. s.; sommet O. I. D. P., réduite; accouch. nat 10 h. s.; durée totale du travail : 21 h.; déliv. nat. Enfant : garçon médiocre, p. 2.510. Suites de couches nat.

DEUXIÈME CATÉGORIE.

Diamètre sacro-sous-pubien de 0.09 à 0.10.

1. — Mar..., 22 ans, entre le 23 avril 1864. Constitution générale bonne; D. S. S. P. 0.099; un avortement de 6 mois, sommet nat.; réglée à 19 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs 9 mai, à 6 h. m.; rupt membr. 10 mai, à 7 h. et demie m.; dilat. complète idem; sommet O. I. G. A., 1 circulaire, à 6 h. s., forceps, crâniotomie, céphalotripsie et version; durée totale du travail : 36 h.; délivrance nat. Enfant : garçon, p. 3.100. Suites de couches : péritonite. Morte le 15 mai.

2. — Gri.., 20 ans, entre le 24 mars 1864. Constitution générale bonne; D. S. S. P. 0m099; primipare; réglée à 16 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois : premières douleurs 10 mai, à midi.; rupt. membr. 11 mai, à 7 h. m.; délivrance complète à 7 h. soir.; sommet O. I. G. A.; accouch. par le forceps à 7 h. s ; durée totale du travail : 31 h.; délivrance nat. Enfant : fille forte, p. 3.350. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 20 mai.

3. — G..., 26 ans, entre le 21 avril 1865. Constitution forte D. S. S. P. 0m099; primipare; réglée à 19 ans; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 20 avril, à 8 h. s.; rupt. membr. le 19 avril, à 8 h. et demie s.; sommet seul O. I. G. A.; accouch. par le forceps au détr. supér. à 11 h. m.; durée totale du travail : 15 h.; délivrance nat. Garçon faible, p. 3.310. Suites de couches : phlegmon iliaque. Morte le 30 avril. Enfant mort peu après sa naissance par asphysie.

4. — G..., 23 ans, entre le 17 février 1867. Bonne constitution; D. S. S. P. 0m099; 1 fille à terme S. N.; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque 1er juin. Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs le 21 février, à 11 h. s.; rupt. membr. à 8 h. m.; dilat. complète le 22 février, à 7 h. m.; sommet O. I. G. A., avec une circulaire serrée autour du cou; accouch. nat. à 7 h. m.; durée du travail : 8 h.; délivrance nat. Garçon fort, p. 2.600. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 4 mars.

5. — Lef..., 21 ans, entre le 12 déc. 1866. D. S. S. P., 0m098. Bonne constitution; A. S. V. accessible; primipare; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 21 déc., à 8 h. m.; rupt. membr. midi; dilat. complète à 10 h. s.; sommet O. I. G. A.; accouch. par forceps au détroit supér. à 10 h.; durée totale du travail : 14 h.; délivrance nat. Enfant fille forte, p. 2.380. Suites de couches nat. Sortie de la mère en bon état le 25 janv. Enfant mort le 27 déc.

6. — G..., 24 ans, entre le 7 janv. 1867. Bonne constitution; D. S. S.P. 0m098; 1 fille à terme S. N.; réglée à 16 ans, régul.; dernière époque le 12 avril. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 8 janv., 2 h. m.; rupt. membr. 9 h. m.; dilat. complète (?); sommet O. I. G. A. 11 h. m.; forceps au détroit supér., crâniotomie et céphalotripsie; durée totale du travail : 9 h.; délivrance nat. Garçon fort, p. 3.700. Sortie de la mère en bon état le 30 janv.

7. — Gu..., 36 ans, admise le 25 nov. 1867. Bonne constitution; D. S. S. P., 0m098; primipare; réglée à 12 ans, régul.; dernière époque menstruelle ignorée. Grossesse de 9 mois; diarrhée, toux, lipothymies les cinq premiers mois; premières douleurs 30 déc., à 3 h. s.; rupt. membr. 31 déc.

à 6 h. s.; dilat.; complète 2 janv., 1 h. et demie m.; sommet position O. I. G. A.; fœtus mort.; accouch. nat. 2 janv., 6 h. m.; durée totale du travail : 60 h.; délivrance nat. Enfant : garçon mort, p. 2.750. Suites de couches (?). Sortie de la mère (?).

8.— Dan..., 36 ans, entre le 3 juill. Constitution générale bonne; D. S. S. P., 0m098; 7 garçons à terme, sommet nat.; 1 fille à terme, version; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque 25 sept. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 2 juil., à 3 h. s.; rupt. memb. 10 h. s.; dilat. complète 4 juil., à 9 h. m.; sommet O. I. D. P., non réduite; accouch. à 10 h. m., forceps; durée totale du travail : 43 h.; délivrance nat. Enfant : garçon fort, p. 2.900. Suites de couches nat. Sortie de la mère en bon état, 21 juil. Mort de l'enfant le 6.

9. — Voc..., 26 ans, entre le 11 mars 1862. Constitution générale bonne; D. S. S. P. 0m097; une fille à terme; sommet nat.; réglée à 16 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs le 13 mars, à 10 h. s.; rupt. membr. le 14 mars, à 5 h. m.; dilat. complète à 6 h. et demie m.; sommet, une circul. O. I. G. A.; accouch. nat., à 7 h. et demie m.; durée totale du travail, 9 h. et demie. Enfant : garçon fort, p. 2.450. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 24 mars.

10. Lef..., entre le 12 mai. Constitution générale bonne; D. S. S. P. 0m095; 1 garçon à terme; sommet nat.; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 12 mai, à 6 h. s.; rupt. des membr., à 7 h. s.; dilat. complète le 13 mai, à 3 h. m.; sommet O. I. G. A.; procidence du cordon; accouch. nat. à 3 h. m.; durée totale du travail, 9 h et demie; délivr. nat. Enfant : fille, morte, p. 3.150. Suites de couches nat. Sortie en bon état le 28 mai.

11.— Fra..., 24 ans, entre le 23 nov. 1862. Constitution générale bonne; D. S. S. P. 0m095; primipare; réglée à 19 ans; dernière époque le 22 avr. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 9 fév. 1863, à 9 h. s.; rupt. membr. le 10 fév., à 6 h. m.; dilat. complète (?); sommet O. I. G. A.; forceps, céphalotripsie et version pelvienne le 10 fév., à 7 h. m.; durée totale du travail, 22 h.; déliv. nat. Enfant : garçon, p. 3.500. Morte d'infection purulente le 15 fév.

12. — Ma..., 25 ans, entre le 18 fév. 1863. Constitution générale bonne; D. S. S. P. 0m095; primipare; réglée à 18 ans; dernière époque le 10 mai. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 18 fév. à 4 h. s.; rupt. membr. le 19 fév., à 8 h. m.; dilat. complète à 6 h. m.; sommet O. I. G. A.; application de forceps, crâniotomie, version pelvienne; durée totale du travail,

/ h. et demie; déliv. nat. Enfant : fille, p. 2.950. Suites de couches : fièvre. Sortie en bon état le 2 mars.

13. — Bau..., 28 ans, entre le 6 avril 1862. Constitution générale bonne; D. S. S. P. 0m095; 2 garçons avant terme, 1 à terme; sommet nat.; réglée à 17 ans, régul.; dernière époque menstr, le 15 août. Grossesse de 7 mois et demi; premières douleurs le 5 avril, à 11 h. s.; rupt. membr. le 4 avril, à 5 h. s.; dilat. complète le 6 avril, à 3 h. s.; épaule droite C. I. G. A.; accouch. (version) à 4 h.; durée totale du travail, 17 h. Enfant : garçon, né mort, p. 2.200. Suites de couches : péritonite. Mort le 9 avril.

14. — Val..., 25 ans, entre le 28 janv. 1864. Constitution générale bonne; D. S S. P. 0m097; 3 garçons à terme; 1 avant terme; épaule; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse actuelle de 9 mois; premières douleurs le 28 janv., à 9 h. m.; rupt. membr. à 10 h. et demie m., art.; dilat. complète, id.; sommet O. I. D. A.; accouch. nat. à 8 h. s.; durée totale du travail, 9 h.; déliv. nat. Enfant : garçon, fort, p. 3.000. Suites de couches : métro-péritonite. Morte le 6 fév. D. O. F. 0m115; O. M. 0m035; biss. 0m08; S. O. B. 0m09.

15. — Mer..., 25 ans, entre le 16 sept. 2 garçons à terme; sommet nat.; diam. S. S. P. 0m.097; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque le 18 déc. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 19 sept., à 5 h. du s.; rupt. membr. le 18 sept., à 11 h. s.; dilat. complète le 19 sept., à 11 h. s.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. à 10 h. et demie s.; durée totale du travail : 9 h. et demie; délivrance nat. Enfant : fille forte, p. 2.710. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 28 sept.

16. — Bes..., 30 ans, entre le 26 juil. 1865. Multipare; diam. S. S. P. 0m.96; men tr. régul. Grossesse de 7 mois et demi, sommet O. I. G. P., accouch. nat. le 2 août. Enfant, p. 1.850. Suites de couches nat. Mère et enfant en bon état.

17. — Dor..., 24 ans, entre le 1 janv. 1864; diam. S. S. P. 0m.095; multipare, 2 filles T. nat.; réglée à 17 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 1er janv., à 1 h. m.; rupt. des membr. à 4 h. m.; dilat. complète à 4 h. et demie m.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. le 1er janv., à 5 h. m.; durée totale du travail : 4 h.; délivrance nat. Enfant : fille forte, p. 2.900; diam. occipito-frontal : 0m.105; occipito-mentonnier : 0m.13; biparietal : 0m.085; sous-occipito-bregmatique : 0m.085. Suites de couches nat. Sortie de l'enfant et de la mère en bon état le 11 janv.

18. — Hoy..., 27 ans, entre le 26 janv. 1864. Constitution générale bonne, petite taille; diam. S. S. P. 0m.095; primipare; réglée à 20 ans,

régul.; dernière époque le 12 avril. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 25 janv., à 2 h. m.; rupt. membr. le 26 janv., à 2 h. m.; 27 janv., de 9 h. à 11 h. m., 4 incisions à l'orif. utérine; forceps détr. supér., craniotomie, céphalotripsie, et enfin le céphalotribe glissant; terminaison par version pelvienne; durée totale du travail : 57 h.; déchirure complète du périnée (5 serres-fines); délivrance nat. P. de l'enfant : 2.800. Suites de couches : fièvre. Sortie en bon état le 2 mars.

19. — Ban..., 20 ans, entre le 23 fév. 1861. Constitution bonne; diam. S. S. P. 0m.095; primipare; réglée à 13 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 23 fév., 11 h. et demie s.; rupt. des membr. le 22 fév., à 5 h. m.; dilat. complète (?); sommet O. I. G. A.; 1 circulaire; forceps au détr. supérieur le 24 fév., à 11 et demie m.; durée totale du travail : 12 h.; délivrance nat. Enfant : garçon mort, p. 3.300. Suites de couches : fièvre puerpérale. Mort le 2 mars.

20. — Des..., 24 ans, entre le 20 avril 1870. Constitution bonne; diam. S. S. P. 0m.095; 3 filles à terme; 2 sommet nat., 1 artif.; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque le 9 juil. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 21 avril, à 8 h. s.; rupt. membr. le 22 avril, à 2 h. et demie m.; dilat. complète à 3 h. m.; épaule droite, C. I. G. A.; version pelvienne à 7 h. m.; durée totale du travail : 11 h.; délivrance nat. à 7 h. et demie m. Enfant : fille forte, p. 2.700. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 3 mai.

21. — Lec..., 28 ans, entre le 7 avr. 64. Constitution générale bonne; D. S. S. P., 0m.095; 1 fille à terme; sommet, nat.; réglée à 16 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs, 4 juin, à 4 h. s.; rupt. membr., à 3 h. m.; dilat. complète, à 8 h. s.; épaule gauche; C. I. D. A.; version pelvienne, 5 juin, 7 h. m.; durée totale du travail, 16 h.; délivr. nat. Enfant : garçon né mort, p. 3.500; rupt. de l'utérus; morte peu après l'accouchement.

22. — Bou..., 22 ans, entre le 19 mai 1866. Constitution bonne; A. S. V. accessible; D. S. S. P. 0m.95; primipare; réglée à 18 ans; dernière époque 15 août. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 18 mai, à 6 h. s.; rupt. artif. des membr. le 19 mai, à 2 h. et demie s.; dilat. complète id.; sommet, O. I. D. P. réduite; accouch. nat. 5 h. s.; durée totale du travail, 23 h.; délivr. nat. Fille faible, p. 2.700. Suites de couches, fièvre. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 2 juin.

23. — Au..., 15 ans et demi, entre le 30 avr. 1866. Constitution bonne; A. S. V. accessible; D. S. S. P. 0m.095; primipare; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs, le 25 mai à minuit.; rupt. artif. des membr. le 27 mai, à 2 h. et

demie m.; dilat. complète id.; sommet, O. I. G. A.; accouch. nat. 3 h. m.; durée totale du travail 26 h.; délivrance nat., à 3 h. et demie m.; Enfant : fille forte, p. 2.925. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant le 9 juin, en bon état.

24. — Dab..., 22 ans, entre le 31 octobre 64. Constitution générale bonne; bassin vicié; D. S. S. P. 0m.095; primipare; réglée à 13 ans et demi; dernière époque 19 janv. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 29 oct. à 5 h. s.; rupt. membr. le 30 oct. à 5 h. s., artific.; dilat. complète le 31 oct. à 6 h. et demie s.; sommet, O. I. G. A.; accouch. nat., 7 h. et demie s.; durée totale du travail, 50 h. et demie; déivr. nat. Enfant : fille morte p. 2.800. Suites de couches, fièvre. Sortie en bon état le 5 novembre.

25. — Bou... 22 ans, entre le 1er avr. 64. Constitution bonne; D. S. S. P. 0.m095; 1 garçon à 8 mois, S. N.; réglée à 16 ans; dernière époque, le 30 août. Grossesse de 7 mois (épilepsie); accouch. prématuré artific. par le dilatateur de M. Tarnier; rupt. artif. membr. et accouch. par extraction le 5 avr.; présent. pelvienne; durée totale du travail, 17 h.; délivr. nat. Enfant : fille, faible, p. 2.100. Suites de couches nat. Sortie de la mère en bon état le 29 avril; enfant mort le 14 avril.

26. — C..., 20 ans, entre le 10 juin 1865. Constitution forte; bassin rétréci; D. S. S. P. 0m.095; primipare; réglée régul. à 13 ans et demi; dernière menstruation le 3 septembre. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 10 juin, à 5 h. s.; rupt. des memb. artif. le 11 juin, à 6 h. m.; dilatation complète, 7 h. m.; sommet, O. I. D. P. réduite; accouch. nat. à 8 h. m.; durée totale du travail, 16 h.; délivrance nat. Suites de couches compliquées de métro-péritonite; mort de la mère le 16 juin. Enfant : garçon, fort, p. 3.060. Sort en bon état.

27. — Lav..., 20 ans, entre le 22 mai 1865. Constitution forte; bassin rétréci; D. S. S. P., 0m.095; une fille avant terme; S. N.; réglée à 13 ans, régul.; dernière menstruation, 24 juin. Grossesse de 9 mois; hydroamnios; premières douleur, 22 mai 2 h. s.; rupt. artif. des membr., 9 h. et demie s.; dilatation complète, 23 mai 3 h. m.; sommet O. I. D. P., réduite; accouchement nat., 3 h. et demie m.; durée totale du travail 13 h. et demie; délivr. nat. Garçon, fort, p. 3.300. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 31 mai.

28. — Lih..., 21 ans, entre le 26 juin 1865. Primipare; D. S. S. P., 0m.095. Grossesse de 9 mois; premières douleurs, 26 juin, 3 h. s.; rupt. membr. et dilat. complète, 11 h. et demie s.; sommet; accouchement nat., minuit; durée totale du travail, 9 h.; délivr. nat. Enfant, p. 2.300. Suites

de couches naturelles. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 7 juillet.

29. — Br..., 26 ans, entre le 3 juillet 1865. Constitution forte; bassin vicié; D. S. S. P., 0m.095.; une fille, extr. pelvienne, un garçon à terme; S. N.; réglée à 17 ans, régul.; dernière menstruation, 8 oct. Grossesse actuelle de 9 mois; premières douleurs, 11 juillet, 11 h. s.; rupt. des membr., 12 juillet, 6 h. et demie m.; dilat. complète, 6 h. m.; sommet O. l. G. A.; accouchement nat., 6 h. et demie m.; durée totale du travail 7 h. et demie; délivr. nat. Enfant : fille, forte, p. 2.850. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état 22 juillet.

30. — Pez..., 38 ans, entre le 16 septembre 1865. Constitution faible; A. S. V., accessible; D. S. S. P. 0m.095; cinq filles et un garçon à terme, S. N.; réglée à 19 ans, régul.; dernière époque le 15 déc. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 21 sept. 7 h. et demie s.; rupt. des membr. 8 h. et demie s.; dilat. complète, 11 h. s.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat., 11 h. et demie s.; durée totale du travail, 4 h.; délivr. nat. Garçon, fort, p. 3.150. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état, 7 oct.

31. — Vas..., 29 ans, entre le 3 juin 1866. Bonne constitution; A. S. V.; dif. accessible; diam. S. S. P. 0m.095; un garçon à terme, S. N.; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 8 mois; premières douleurs, 4 juin 11 h. s.; rupt. des membr. artif., 5 juin 3 h. et demie m.; dilat. compl. 3 h. m.; sommet O. l. G. A.; accouch. nat. 3 h. et demie m.; durée totale du travail, 5 h.; délivr. nat. Garçon, faible, p. 2.350. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état, 13 juin.

32. — Lef..., 29 ans, entre le 10 mai 1868. Bien constituée; diam., S. S. P., 0m.095; un garçon et une fille avant terme (un accouch. prématuré artif., l'autre nat.); réglée à 18 ans, régul.; dernière époque menstruelle, 15 août. Grossesse act. 9 mois; apparition des premières douleurs, 13 mai 1 h. s.; rupt. des membr., 5 h. m. 13 mai; dilat. complète à midi et demi; présentation du sommet O. l. G. A.; accouchement nat., 1 h. 55 s.; durée totale du travail, 24 h.; délivr. nat. Enfant : fille, forte, p. 3,000. Suites de couches nat. Sortie de la mère en bon état, 3 juin; l'enfant bien portant est envoyé en nourrice le 2 juin.

33. — Vau..., 23 ans, entre le 26 fév. Bonne constitution; diam. S. S. P. 0m.095; primipare; réglée à 15 et demi, peu abondamment; dernière époque menst. 1 mai. Grossesse de 9 mois; apparition des premières douleurs 26 fév., 2 h. m.; rupt. membr. artif. 8 h. et quart m.; dilat. complète 5 h. s.; présent. sommet O. I. D. A.; accouch. 6 h. 45 s.; forceps au détroit supér., tractions faites à l'aide des moufles; durée totale du tra-

vail : 16 h. 45; délivr. nat. Enfant : fille vivante, moyenne, p. 2.950. Suites de couches : fièvre. Sortie de la mère non guérie, et de l'enfant en bon état le 8 mars.

34. — Lep..., 30 ans, entre le 22 janv. 1869. Bonne constitution ; diam. S. S. P. 0m.095 ; cette femme n'a commencé à marcher qu'à 18 mois. ; elle a eu déjà un garçon à terme, venu par le sommet et artificiellement; réglée à 15 ans, régul.; dernière menstr. le 18 mars. Grossesse act. de 9 mois; premières douleurs le 24 janv., à 4 h. du m.; rupt. des membr. à 3 h. du m.; dilat. complète à 11 h.; présentation du sommet. O. I. D. P.; diam. de la tête : O. frontal 0m.12, O. mentonnier 0m.13, biparietal 0m.09; accouch. nat. à 11 h. et demie du m.; durée totale du travail : 7 h. et demie; dél. nat.; fille forte, p. 3.470. Suites de couches nat. La mère sort le 2 fév. en bon état, avec son enfant ayant une ophthalmie purulente.

35. — Bed..., 26 ans, entre le 13 mars. Rachitique ; diam. S. S. P. 0m.095; primipare; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque menstr. 28 juin. Grossesse de 8 mois; accouch. provoqué par le dilatateur de M. Tarnier; apparition des premières douleurs 14 mars, 4 h. s.; rupt. des membr. 17 mars, 6 h. et demie m.; dilat. complète 6 h. et demie s.; présentat. sommel. O. I. D. P., réduite; accouch. artif. 6 h. trois quarts s., par application de forceps au détroit inférieur; durée totale du travail : 7 h. trois quarts. Enfant : fille morte, faible, p. 1.920. Suites de couches nat. Sortie de la mère en bon état, le 19 mai.

36. — Fo..., 32 ans, entre le 13 août 67. Petite taille; diam. S. S. P. 0m.095; primipare; réglée à 20 ans, régul.; dernière époque 25 déc. Grossesse de 7 mois et demi ; premières douleurs 15 août, minuit; rupt. membr. 6 h. et demi m., artific.; dilat. complète 7 h. et demie m.; sommet. O. I. D. P., réduite ; accouch. nat. 8 h. m.; durée totale du travail : 8 h.; délivr. nat. Enfant : p. 2.440. Suites de couches : phlegmon rétro-utérin. Sortie en bon état de la mère et de l'enfant 26 août.

37.—Deg..., 22 ans, entre le 1er mai. Diam. S. S. P. 0m.095; primipare ; réglée à 19 ans, régul. ; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois ; premières douleurs 30 avril, 4 h. s.; rupt. membr. idem; dilat. complète 1er mai, 10 h. et demie mat.; présent. sommet, procidence du cordon ; position (?); craniotomie, céphalotripsie à 10 h. et demie m.; durée totale du travail : 18 h. et demie; délivr. nat. Suites de couches (?)

38. — Jul..., 21 ans. entre le 24 déc. 61. Constitution générale bonne; diam. S. S. P. 0m.095 ; primipare ; réglée à 16 ans, régul.; dernière époque 10 avril. Grossesse de 8 mois ; premières douleurs 27 déc., 7 h. s.; rupt.

membr. (?); dilat. complète 28 déc., 7 h. et demie m.; sommet. O. I. D. P., réduite; accouch. nat. 8 h. m.; durée totale du travail : 13 h.; délivr. nat. Enfant : fille forte, p. 2.150. Suites de couches : Eschares; mort de l'enfant le 31 déc. Sortie de la mère en bon état, 11 janvier.

39. — Mag..., 24 ans, entre le 17 août 61. Constitution générale bonne; diam. S. S. P. 0m.095; primipare; réglée à 17 ans; dernière époque, 6 sept. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 29 août, midi; rupt. des membr. 9 h. s.; dilat. complète 6 h. s.; sommet O. I. D. P.; applicat. du forceps 30 août, 9 h. et demie m.; durée totale du travail 21 h. et demie; Enfant : garçon faible, p. 3.250. Suites de couches : douleurs abdominales. Enfant mort le 13 sept. Sortie de la mère en bon état le même jour.

40. — Des..., 24 ans, entre le 28 août 67. Rachitique; diam. S. S. P. 0m.092; un garçon à terme; sommet artif.; réglée à 13 ans, régul.; dernière époque (?) Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs 14 oct., 6 h. et demie m.; siége; incisions multiples sur l'orifice utérin; extraction du fœtus, 11 h. 45 m. s.; durée totale du travail (?) Enfant : garçon, p. 2.500. Suites de couches : fièvre et diarrhée. Mort de l'enfant 16 nov. Sortie de la mère en bon état le 23 nov.

41. — Lass..., 19 ans, entre le 2 oct. A marché seulement à l'âge de 3 ans; primipale; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque 4 fév. Grossesse de 8 mois; diam. S. S. 0m.095; premières douleurs 3 oct., 4 h. s.; rupt. membr. 4 oct., 4 h. et demie m.; dilat. complète 4 h. 45 m.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. 5 h. un quart m.; durée totale du travail 13 h.; déliv. nat. Enfant : fille forte, p. 2.380. Suites de couches : fièvre. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état 18 oct.

42. — Nas..., 36 ans, entre le 13 sept. 62. Constitution faible; diam. S. S. P. 0m.095; primipare; réglée à 17 ans, régul.; dernière époque 8 déc. Grossesse de 8 mois; premières douleurs 13 sept. 7 h. s.; rupt. membr. 14 sept., 10 h. m.; dilat. complète 1 h. s.; siége S. I. G. A.; 1 circulaire autour du cou; extraction 3 h. s.; durée totale du travail 20 h.; délivr. nat. Enfant : fille morte. p. 250. Suites de couches : diarrhée. Sortie en bon état 1er oct.

43. — Des..., 22 ans, entre le 12 juin 62. Constitution générale bonne; diam. S. S. P. 0m.095; deux filles à terme; accouch. nat.; réglée à 12 ans, régul.; dernière époque 4 sept. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 13 juin 6 h. s.; rupt. membr. 11 h. s.; dilat. complète id.; épaule gauche C. I. G. 11 h. et demie s.; version; durée totale du travail 5 h. et demie; délivr. nat. Enfant : fille assez forte, p. 2.700. Suites de couches :

pleurodynie. Mort de l'enfant 15 juin. Sortie de la mère en bon état le 22 juin.

44.—Lan..., 23 ans, entre le 27 octobre 1863. Constitution forte; diam. S. S. P. 0m.095; primipare; réglée à l'âge de 13 ans, régul.; dernière menstr. le 1er février; premières douleurs le 27 octobre à 8 h. du soir; rupt. des memb. le 28 octobre à 8 h. et demie du matin; dilat. complète à 6 h. trois quarts s.; présent. du sommet avec une main. O. I. G. A.; accouch. nat. à 7 h. et demie, s.; durée totale du travail, 23 h.; déliv. nat. fille forte, mort-née, p. 2440; complication de péritonite aiguë : mort de la mère le 6 novembre.

45. — Vau..., 28 ans, entre le 15 février. Constitution générale faible, bassin vicié; diam. S. S. P., 0m.093; 1 fille et 1 garçon à terme; sommet nat.; réglée à 16 ans; régul.; dernière époque, 16 mai. Grossesse 8 mois et demi; premières douleurs 15 février 4 h. m.; rupt. membr. midi; dilat. complète, id.; sommet, O. I. G. A.; accouch. nat. 5 h. s.; déliv. nat. Enfant : faible, p. 2.680. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état 25 février. D. O. F., 0m,115; O. M., 0m.013; bip. 0m.084; S. O. B., 0m.085.

46. — Doy..., 33 ans, entre le 17 juin 1862. Constitution générale bonne; diam. S. S. P., 0m.093; 2 filles, 1 garçon à terme, sommet, forceps, 1 fille à terme; extr. pelvienne nat.; réglée à 16 ans, régul.; dernière époque 13 septembre. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 22 juin, 2 h. m.; rupt. membr. 9 h. et demie m.; dilat. complète 2 h. et demie s.; sommet, O. I. G. A.; accouch. nat. 3 h. s.; durée totale du travail, 12 h. et demie; déliv. nat. Enfant : fille forte, p. 3.750. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état 5 juillet.

47. — Gro..., entre le 23 juillet 1865. Petite; multipare; 1 accouch. au forceps. Grossesse de 8 mois et demi; diam. S. S. S. P. 0m.093; premières douleurs 24 juillet, 2 h. m.; rupt. membr. et dilat. complète 11 h. 10 m.; sommet, O. I. G. A.; accouch. nat. 11 h. 15 m. Enfant : p. 2.140. Durée totale du travail, 9 h. un quart; déliv. nat.; hémorrhagie. Suites de couches : péritonite généralisée, gangrène de l'utérus, mort le 28.

48. — Jam..., entre le 11 mars 1862. Constitution générale bonne; diam. S. S. P., 0m.093; primipare; réglée à 19 ans, régul.; dernière époque 3 juin. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 12 mars, 1 h. m.; rupt. des membr. 3 h. s.; dilat. complète 13 mars, 7 h. m.; sommet, O. I. G. P.; accouch. par le forceps, 9 h. m.; durée totale du travail, 32 h.; déliv. nat. Enfant : garçon fort, né mort, p. 2.850. Suites de couches : métro-péritonite, mort le 18 mars.

49. — Fol..., 27 ans, entre le 1er fév. Bonne constitution; diam. S. S. P., 0m.09 un quart; face antér. du sacrum un peu convexe; deux avortements de 3 mois; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque menstruelle le 28 mai. Grossesse de 8 mois; apparition des premières douleurs le 6 fév., à 8 h. et demie s.; rupt. artif. des membr. le 7 fév., à 2 h. 20 m.; dilat. compl., id.; présent. sommet O. I. G. A.; accouch. nat., à 2 h. 45 m.; durée totale du travail : 6 h. Enfant : garçon, faible, p. 1.755. Suites de couches : quelques douleurs abdominales. Mort de l'enfant le 16 fév. Sortie de la mère en bon état le 20 fév.

50. — Lem..., 30 ans, entre le 25 nov. 1862. Constitution faible; diam. S. S. P. 0m.092; 2 filles jumelles avant terme; pelvis; réglée à 20 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 24 nov., à 9 h. s.; rupt. membr., id.; dilat. complète le 25 nov., à 3 h. et demie s.; sommet avec une main et partie inférieure de l'avant-bras O. I. G. A., à 5 h. et demie s.; applicat. de forceps au détroit infér. (?).; durée totale du travail : 21 h. et demie; déliv. nat. Enfant : fille, morte, p. 3.900. Rupt. de l'utérus. Mort peu après l'accouchement.

51. — Del..., 19 ans, entre le 13 juin 1863. Constitution forte; diam. S. S. P. 0m.092; primipare; réglée à 16 ans, régul.; dernière menstruation (?). Grossesse actuelle de 9 mois; premières douleurs le 13 juin, à minuit; rupt. des membranes et dilat. complète le 14 juin, à 4 h. m.; sommet O. I. D. P. réduite avec cordon rétropulsé; accouch. nat., à 11 h. et demie m.; durée totale du travail : 11 h.; délivr. nat. Garçon : faible, p. 3.300. Suites de couches naturelles. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 1er juillet.

52. — Tes..., 26 ans, entre le 5 avr. 1865. Constitution forte; diam. S. S. P. 0m.092; a eu une fille et un garçon à terme; S. N.; réglée à 14 ans, irrégul.; dernière menstruation le 28 juin 1864. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 9 avril, à 9 h. s.; rupt. des membr., à 6 h. et demie s.; dilatation complète, à 9 h. s.; sommet seul O. I. D. P. non réduite; terminaison de l'accouchement par le forceps le 10 avril, à 2 h. m.; durée totale du travail : 29 h. et demie; délivr. nat. Enfant : garçon, né mort, p. 3.450. Suites de couches : cystite. Sortie de la mère en bon état le 3 mai.

53. — Her..., entre le 24 juin 1866. Primipare; diam. S. S. P. 0m.092; dernière époque menstruelle le 10 mai 1865. Grossesse de 8 mois, hémorrhagies; premières douleurs le 20 fév., à 7 h. s.; rupt. membr. le 21 fév., à 11 h. m., artif.; dilatation par incisions sur le col; applicat. de forceps, craniotomie, céphalatripsie, à 6 h. s.; sommet O. I. G. A.; durée totale du travail : 23 h.; délivr. nat. Enfant : fille, morte. p. 2.200. Suites de couches : phlébite utérine. Mort le 12 avril.

54. — Mor... 29 ans, entre le 17 sept. 1864. Constitution générale bonne; bassin vicié; diam. S. S. P. 0m.092; une fille, un garçon à terme, sommets; un nat., une applicat. de forceps; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque le 20 mars. Grossesse de 7 mois et demi; premières douleurs le 17 sept. 7 h. s.; rupt. membr. le 18 sept. 1 h. m.; dilat. complète id.; sommet O. I. G. A.; accouchement nat. 1 h. m.; durée totale du travail 7 h.; délivr. nat. Enfant : garçon faible, p. 2.130. Sortie en bon état le 5 oct. Mort de l'enfant peu après l'accouchement.

55. — Riv..., 26 ans, entre le 2 avril 1865. Bonne constitution; bassin vicié; diam. S. S. P., 0m.092; primipare; réglée à 13 ans; dernière époque le 18 juin. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 4 avril à 1 h. s.; rupt. des membr. à 8 h. et demie s.; dilat. complète id.; sommet seul O. I. G. A.; accouch. nat. à 9 h. s.; durée totale du travail 8 h.; délivr. nat. Fille faible, p. 2.100. Suites de couches compliquées d'eschares vulvaires. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 14 avril 1865. D. O. F., 0.105; O. M., 0.125; Bip., 0.08; S. O. B., 0.085.

56. — Ja..., 29 ans, entre le 7 janv. 1863. Constitution générale bonne; diam. S. S. P. 0m.092; un garçon à terme; sommet nat.; réglée à 13 ans, régul.; dernière époque 6 avril. Grossesse actuelle de 9 mois; premières douleurs 20 janv. 8 h. m.; rupt. membr. (?); dilat. complète 9 h. et demie s.; sommet O. I. G. A.; accouchement nat. 11 h. et demie s., durée totale du travail 15 h. et demie; délivr. nat. Fille forte, p. 2.900. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état 2 février.

57. — Gail..., 18 ans, entre le 8 janv. 1864. Constitution faible; diam. S. S. P. 0m.091; primipare; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs 7 janv. 7 h. m.; rupt. membr. (?); dilat. complète 9 janv. 9 h. un quart m.; sommet; procidence du condon O. I. G. A.; rétropulsion, crâniotomie, céphalotripsie, 10 h. m.; durée totale du travail 26 h.; délivr. nat. Enfant : garçon, p. 2.430. Suites de couches, péritonite. Morte le 11 janv. Rupture de la paroi antérieure de l'utérus.

58. — Sol..., 22 ans, entre le 25 avril 1862. Constitution générale bonne; diam. S. S. P. 0m.09; une fille à terme, sommet nat.; réglée à 16 ans, régul.; dernière époque menstr. 10 juillet. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 25 avril 2 h. m.; rupt. membr. et dilat. complète (?); sommet avec procidence du cordon O. I. G. A.; 9 h. s. céphalotripsie; durée totale du travail 19 h.; délivr. nat. Enfant : fille, morte, p. 2.750. Suites de couches, péritonite. Mort le 26 avril.

59. — Dal..., 23 ans, entre le 5 fév. Constitution générale bonne; diam. S. S.P. 0m.09; primipare; réglée à 16 ans, régul.; dernière époque 25 mai. Grossesse de 7 mois et demi; premières douleurs 17 fév., 4 h. s.; rupt. membr. 5 h. et demie s.; dilat. complète 7 h. et demie s.; siége S. I. D. P.; accouch. nat. 8 h. s.; durée totale du travail, 4 h.; délivr. nat. Enfant: fille, p. 1.750; né mort. Suites de couches; péritonite. Sortie de la mère en bon état le 3 mars.

60. — Hu..., 28 ans, entre le 10 nov. 1863. Constitution faible; diam. S. S. P. 0m.09; a eu avant terme: 1 garçon et 1 fille; réglée à 12 ans, régul.; dernière menstr. le 7 fév. Grossesse actuelle de 9 mois; premières douleurs le 11 nov., 7 h. s.; rupt. membr. 8 h. et demie s.; dilat. complète 12 nov., 9 h. m.; présentation du sommet O. I. D. P. avec procidence du bras gauche et deux circulaires; accouch. nat. le 12 nov., 10 h. m.; durée totale du travail 15 h.; délivr. nat.: garçon mort, p. 2.365. Suites de couches nat. Sortie de la mère en bon état le 19 nov.

61. — Gil..., 31 ans, entré le 21 août 1863. Constitution forte; diam. S. S. P. 0m.09; primipare; réglée à 22 ans; dernière menstr. le 11 nov. Grossesse actuelle de 9 mois; premières douleurs le 23 août, 5 h. s.; rupt. membr. 24 août, 5 h. et demie s.; dilat. complète le 25 août, 1 h. m.; sommet O. I. G. A. avec procidence du cordon; accouch. nat. 25 août, 4 h. m.; durée totale du travail, 34 h.; délivr. nat.: garçon, fort, p. 3.200. Suites de couches naturelles. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 2 sept.

62. — Da .., 23 ans, entré le 20 juil. 1864. Constitution forte; diam. S. S. P. 9 c.; a eu une fille à terme venue naturelle par le sommet; réglée à 16 ans; dernière menstr (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 20 juil., 5 h. s.; rupt. membr. 8 h. 20 m.; sommet seulement O. I. G. A.; dilat. complète le 21 juil., 8 h. 20 m.; application de forceps céphalotripsie et extraction du fœtus à 2 h. et demie s.; durée totale du travail 33 h.; délivr. immédiatement après l'accouchement : fille morte, p. 3.680; complication de péritonite. Mort le 22 juil.

63. — Rou..., entre à la Maternité le 10 juin 1863. Constitution faible; diam. S. S. P. 9 c.; a eu 3 avortements (1 épaule, version, 2 l'ext. pelvienne); réglée à 14 ans; dernière menstr (?). Grossesse actuelle de 7 mois; premières douleurs le 24 juin, 11 h. m.; rupt. membr. 7 h. et demie m.; dilat. complète 1 h. s.; présentation de l'extrémité pelvienne, S. I. D. P. mode des pieds; hémorrhagie par insertion vicieuse du placenta. Extraction du placenta avant l'expulsion du fœtus, à 1 h. s.; terminaison naturelle de l'accouch.; durée totale du travail, 2 h. Garçon mort, p. 1.900. Suites de

couches compliquées d'induration des mamelles. Sortie de la mère le 15 juil. en bon état.

64. — Fon..., 35 ans, entre le 20 fév. 63. Constitution forte; diam. S. S. P. 0m.09; primipare; réglée à 18 ans; dernière époque 30 juill. Grossesse de 8 mois; premières douleurs 29 mars, 11 h. s.; rupt. membr. 30 mars, 10 h. s.; dilat. complète 31 mars, 1 h. m.; sommet. O. J. D. P., non réduite; application de forceps à 9 h. et demie m.; durée totale du travail: 34 h.; délivr. nat. Enfant: fille assez forte, p. 2.000. Suites de couches: Péritonite. Mort de la mère le 4 avril.

65. — Let..., 18 ans, entre le 31 janv. 63. Constitution générale bonne; diam. S. S. P. 0m.09; primipare; réglée à 16 ans; dernière époque (?). Grossesse de 8 mois; premières douleurs 1 fév., 5 h. m.; rupt. membr. id.; dilat. compl. 10 h. m.; sommet, avec procidence du cordon, O. J. G. A.; accouch. nat. 10 h. et demie m.; durée totale du travail: 5 h. et demie; délivr. nat.; garçon né mort, p. 1.950. Suites de couches nat. Sortie de la mère en bon état, 14 fév.

66. — Cha..., 32 ans, entre le 6 janv. 63. Constitution générale faible; diam. S. S. P. 0m.09; primipare; réglée à 13 ans et demie; dernière époque 5 avril. Grossesse de 8 mois; premières douleurs 4 janv., 11 h. m.; rupt. membr. 6 janv., 2 h. m.; dilat. complète (?); sommet O. J. G. A.; tentatives de débridement de l'orifice et d'applicat. de forceps, terminaison de l'accouchem. par application de forceps à la vulve, à 9 h. s.; déchirure complète du périnée; durée totale du travail: 58 h.; délivr. nat.; fille faible, p. 1.950. Suites de couches: escharres à la face interne des grandes et petites lèvres. Mère morte d'infection purulente le 13 janv.

67. — All..., 24 ans, entre le 8 mai 62. Constitution générale bonne; diam. S. S. P. 0m.09; un garçon de 8 mois; sommet, forceps; réglée 16 ans, régul.; dernière époque, 18 août. Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs 8 mai, 6 h. soir; rupt. membr. 7 h. soir; dilatation complète 8 h. et demie; extrémité palv. (pieds) S. J. G. A. 10 h. s.; extraction, perforat. du crâne; durée totale du travail: 10 h. et demie; délivr. nat. Enfant: garçon mort, p. 2.600. Suite de couches nat. (?); sortie de la mère en bon état, 22 mai.

68. — Sab..., 24 ans, entre le 11 mai 62. Constitution générale faible; diam. S. S. P. 0m.09; 1 garçon à terme, sommet nat.; réglée à 16 ans, régul.; dernière époque, 15 août. Grossesse de 8 mois; premières douleurs 10 mai, 11 h. s.; rupt. membr. 12 mai, 2 h. mat.; dilat. complète, id.; sommet O. J. G. A.; accouchement nat. 2 h. et demie m.; durée totale

du travail : 3 h.; délivr. nat. Enfant : fille assez forte, p. 2.280. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 17 mars.

69. — Tes..., 20 ans, entre le 12 mai 1862. Constitution générale faible; diam. S. S. P. 0m.09; primipare; réglée à 18 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 28 juin, à 6 h. s.; rupt. membr., à 8 h. m.; dilat. complète (?); sommet O. I. G. A.; accouchement le 30 juin, à 10 h. m.; céphalotripsie et version; durée totale du travail : 40 h.; délivr. nat. Enfant : garçon, p. 2.900. Suites de couches : infection putride. Mort le 7 juillet.

70. — Mou..., 25 ans, entre le 6 sept. 1867. Bien constituée; primipare; réglée à 16 ans, régul.; dernière époque le 1er janv. Grossesse de 9 mois; hydramnios; A. S. V. accessible; diam. S. S. P. 0m.09; premières douleurs le 11 oct., à 6 h. et demie m.; rupt. membr., à 8 h. 55 s.; dilat. complète le 12 oct., à 11 h. et demie m.; sommet O. I. G. A.; accouch. à midi, par le forceps appliqué au détr. supér.; durée totale du travail : 18 h.; délivr. nat. Enfant : fille, morte, p. 4.050. Suites de couches : péritonite légère. Sortie de la mère en bon état le 7 déc.

71. — Thi..., 30 ans, entre le 16 août. Constitution générale faible; diam. S. S. P. 0m.09; 1 garçon à terme, S. N.; réglée à 16 ans, régul.; dernière époque le 15 nov. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 16 août, à 1 h. et demie m.; rupt. membr. le 15 août; dilat. complète (?); sommet, position (?); le 16 août, à 10 h. m., applicat. de forceps, céphalotripsie et version pelvienne; durée totale du travail : 8 h. et demie. Enfant : fille, p. 2.700. Suites de couches : péritonite. Mort le 18 août.

72. — Bra..., 21 ans, entre le 11 déc. 1862. Constitution générale bonne; diam. S. S. P. 0m.09; primipare; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque le 20 mars. Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs le 11 déc., à 8 h. s.; rupt. membr., à 11 h. s.; sommet O. I. D. P., réduite; le 13 déc., à 9 h. et demie m., dilat. complète; forceps, crâniotomie et version; durée totale du travail : 37 h. et demie; déliv. artif.; rupt. de l'utérus. Morte peu après l'accouchement. Enfant : p. 3.000.

73. — Fer..., 32 ans, entre le 1er nov. 1864. Rachitisme; bassin vicié; diam. S. S. P. 0m.09; 1 garçon à terme; sommet nat.; réglée à 19 ans, régul.; dernière époque le 4 janv. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 1er nov., à 9 h. m.; rupt. membr. le 31 oct., à 4 h. m.; dilat. complète le 2 nov., à 10 h. et demie m.; sommet, variété frontale O. I. G. A.; de 9 h. à 11 h. m., forceps, crâniotomie, céphalotripsie, version pelvienne; durée totale du travail : 26 h.; délivr. nat. Enfant : fille, p. 3.100. Suites de couches : métro-péritonite. Mort le 6 nov.

74. — Vah..., 24 ans, entre le 20 mai 1866. Constitution bonne; diam. S. S. P. 0m.09; primipare; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque 28 août. Grossesse de 9 mois (varioloïde à 8 mois); premières douleurs le 24 mai, 6 h. s.; rupt. des membr. le 25 mai 1 h. m.; incision à l'orifice et dilat. complète à 10 h. m.; sommet O. I. D. A.; accouch. par forceps à 11 h. m.; durée totale du travail 16 h.; délivr. spontanée. Garçon faible, p. 3.180. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 11 juin.

75. — Leh..., 22 ans, entre le 21 juin 1865. Rachitique; bassin vicié D. S. S. P. 0m.09; primipare; réglée à 15 ans; régul.; dernière menstruation 20 sept. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 13 juill., 8 h. et demie s.; rupt. des membr. 14 juill. 6 h. m.; dilat. complète 1 h. s.; sommet O. I. G. A.; application de forceps à 3 h. s.; durée totale du travail 18 h. et demie; délivr. nat. Fille faible, p. 2,880. Mort après sa naissance. Suites de couches nat. Sortie de la mère en bon état le 4 août.

76. — Bl..., 18 ans, entre le 29 août 1867. Rachitisme; diam. S. S. P. 0m.09; primipare; réglée à 16 ans, irrégul.; dernière époque 25 déc. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 30 août 4 h. m.; rupt. membr. 10 h. 10 m. m.; dilat. complète id.; sommet O. I. D. P., accouch. par forceps au détroit supérieur 4 h. et demie s.; durée totale du travail, 12 h.; délivr. nat. Enfant : fille, p. 3.250. Morte trois quarts d'heure après sa naissance. Suites de couches : métro-péritonite. Morte le 7 sept.

77. — Duv..., 29 ans, entre le 21 mars 1867. Bonne constitution; diam. S. P. 0m.09; primipare; réglée à 15 ans, régul.; dernière menstruation 22 juill. Grossesse de 8 mois et demi, premières douleurs 8 av., 10 h. m.; rupt. artific. membr. 9 avril, 10 h. et demie m.; dilat. complète 6 h. et demie s.; sommet O. I. G. A. 6 h. et demie s.; crâniotomie, céphalotripsie (instrument Guyon); durée totale du travail 31 h.; délivr. nat. Enfant : fille morte, p. 2.370. Suites de couches : fièvre, douleurs abdominales, hémorrhagie utérine légère. Sortie de la mère en bon état le 11 mai.

78. — Sp..., 16 ans et demi, entre le 24 décembre 1866. Bonne constitution; diam. S. S. P. 0m.090; primipare; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque 20 av. Grossesse de 8 mois; accouchement prématuré artificiel; application du dilatateur Tarnier le 11 janv., 10 h. m.; premières douleurs 10 h. et demie m.; rupt. des membr. (?); dilat. complète, 12 janv., 6 h. et demie s.; siége S. I. D. P. réduite; accouch. nat. à 7 h. et demie s.; durée totale du travail 33 h.; délivr. nat. Garçon très-faible, p. 2.040. Suites de couches : rhumatisme puerpéral et péritonite. Mort de la mère le 27 janv. Mort de l'enfant le même jour.

79. — V..., 24 ans, entre le 20 mai 1866; diam. S. S. P. 0m.09; primipare; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque 28 août. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 24 mai, 6 h. s.; rupt. membr. 25 mai, 1 h. m.; sommet; O. I. D. A.; Incisions sur l'orifice utérin; accouch. par le forceps au détroit supér. 10 h. m.; durée totale du travail, 16 h.; déliv. nat. Enfant, p. 3,180. Suites de couches : nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état 11 juin.

80. — La..., 26 ans, entre le 8 octobre 1865. Rachitique; diam. 0m.09; primipare; réglée à 19 ans, irrégul.; dernière époque (?) Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 8 octobre, 7 h. s.; rupt. artific. des mem., 3 h. et demie s.; dilat. complète (?) sommet O. I. G. A.; application du forceps à 11 h. 50 m.; puis crâniotomie et céphalotripsie, extraction avec la pince Simpson; durée totale du travail, 28 h. 50; déliv. (?); garçon; p. 3,400. Mort de la mère le 14 octobre par métro-péritonite.

81. — A..., 25 ans, entre le 9 mai 1865. Quoique non rachitique, elle est petite et n'a marché qu'à trois ans; bassin vicié, diam. S. S. P. 0m.090, a eu une fille à terme. S. N. Réglée à 18 ans, régul.; dernière époque le 1er août. Grossesse actuelle de 9 mois; premières douleurs le 9 mai, 7 h. m.; rupt. des membr. midi et demi; dilat. complète, 1 h. et demie s.; sommet O. I. D. P., accouch. nat. à 2 h. s.; durée totale du travail, 7 h.; déliv. nat. Garçon fort, p. 2.050. Suite de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 17 mai.

TROISIÈME CATÉGORIE.

Diamètre sacro-sous-pubien de 0.08 à 0.09.

1. — T..., 31 ans, entre le 19 mai 1865. Constitution bonne; diam. S. S. P. 0m.089; 3 garçons et 5 filles à terme; 7 sommet nat., 2 artific.; dernière époque 5 septembre. Grossesse actuelle de 9 mois, premières douleurs le 19 juin, 2 h. m.; rupt. membr. et dilat. complète (?) sommet O. I. G. A.; avec enroulement du cordon. Forceps, crâniatomie, céphalotripsie, extract. avec la pince Simpson, le 20 juin, 1 h. m.; déliv. nat.; durée du travail, 23 h. Enfant : p. 3,850, mort avant l'opération. Suites de couches nat., p. de l'enfant : 3.850. Sortie de la mère en bon état le 3 juillet.

2. — Cl..., 39 ans, entre le 11 novembre 1864. Constitution bonne;

bassin vicié; diam. S. S. P. 0m.089; 3 garçons, 4 filles; 6 accouch. artific., 1 spontané avant terme; réglée à 13 ans, régul.; dernière époque 8 mars. Grossesse 8 mois et demi, premières douleurs 22 novembre, 2 h. m.; rupt. membr. 21 novembre, 8 h. s.; dilat. complète 22 novembre, 9 h. m.; siége, S. I. D. P.; 10 h. et demie m., forceps, crâniotomie, céphalotripsie; durée totale du travail, 8 h. et demie; déliv. nat. Enfant : fille forte, p. 2.320. Suites de couches nat. Sortie en bon état 10 décembre.

3. — J..., 20 ans, entre le 24 février 1864. Constitution générale bonne; bassin vicié; diam. S. S. P. 0m.088; primipare; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque (?) Grossesse de 9 mois, premières douleurs 26 février, 6 h. s.; rupt. membr. 27 février, 10 h. et demie m.; dilat. complète (?) Sommet, O. I. D. P. réduite de 8 à 10 h. s.; incisions sur l'orifice, crâniotomie, forceps, céphalotripsie, extraction de la tête par le forceps et le crochet aigu; déliv. artific. Enfant : garçon, p. 2.850. Suites de couches nat. Sortie en bon état 6 avril.

4. — B..., 22 ans et demi, entre le 12 janv. 1867. Rachitique; diam. S. S. P. 0m.088; primipare; réglée à 15 ans, irréguł.; dernière époque le 15 mai. Grossesse de 7 mois et demi; accouchement prématuré artificiel; du 14 au 18 dilatation de l'orifice par l'éponge préparée et le dilatateur de M. Tarnier; premières douleurs le 19 janv., 5 h. s.; rupt. des membr. le 21 janv., minuit et demi; dilat. complète 6 h. s.; incisions à l'orifice; sommet, position (?) accouch. 6 h. s. par crâniotomie et céphalotripsie; durée totale du travail, 48 h.; délivr. nat. Garçon, p. 1.800, métro-péritonite chez la mère, qui sort mourante le 29 janvier.

5. — G..., 28 ans et demi, entre le 30 mars 1863. Constitution faible; diam. S. S. P. 0m.086; primipare; réglée à 20 ans; dernière époque 18 juillet. Grossesse de 8 mois; premières douleurs 31 mars; rupt. membr. (?) dilat. complète 1er avril, 10 h. m.; sommet, O. I. D. P. réduite; accouch. nat. 10 h. et demie m.; durée totale du travail, 17 h. et demie; déliv. nat. Enfant : garçon faible, p. 2.000. Suites de couches : bronchite, escarres très-larges à la partie interne des grandes et petites lèvres. Mort de l'enfant. Sortie de la mère en bon état 22 avril.

6. — J..., 22 ans, entre le 20 décembre 1865. Constitution faible; diam. S. S. P. 0m.085; 1 garçon à terme (forceps); réglée à 14 ans, régul.; dernière époque 15 mai. Grossesse actuelle de 7 mois et demi; accouch. prémat. artific. par le dilatateur de M. Tarnier. Epaule G. I. D.; rupt. artific. des membr. 7 janvier, midi. Version céphalique par les pressions extérieures de 5 à 6 h. et demie; incisions sur le col de l'utérus; forceps; extract. avec la pince; durée totale du travail, 54 h. et demie;

déliv. artific. Fille morte, p. 1.880. Mort de la mère par infection purulente le 17 janvier.

7. — B..., 22 ans, entre le 10 février. Bonne constitution; diam. S. S. P. 0m.085; primipare; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque menstruelle ignorée. Grossesse 8 mois et demi; apparition des premières douleurs 24 février, 11 h. un quart m.; rupt. artific. des membr. 25 février, 10 h. 20 m.; dilat. complète 26 février, 1 h. et demie s.; présent. sommet. O. I. G. A.; accouch. artific. 26 février, 3 h. 50 s.; application du forceps dans l'excavation; durée totale du travail, 52 h.; déliv. nat. Enfant : fille assez forte, p. 2.630; morte le 2 mars. Suite de couches : métrite. Sortie de la mère en bon état le 14 mars.

8. — Lab..., entre le 2 mai 1870. Rachitique; diam. S. S. P. 0m.085; primipare; réglée à 20 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs 2 mai, 11 h. m.; rupt. des membr. 11 h. 15; dilat. complète id.; sommet O. I. D. P.; accouch. nat. 3 mai, 1 h. m.; durée totale du travail, 14 h.; déliv. nat. Enfant : garçon médiocre, p. 2.110. Suite de couches : nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état.

9. — L..., 29 ans, entre le 19 déc. 1863. Constitution faible; diam. S. S. P. 0m.08; primipare; réglée à 16 ans; dernière menstruation le 19 mars. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 18 déc., 10 h. s.; rupt. des membr. le 19 déc., 9 h. s.; dilat. complète (?); extrémité pelvienne (mode des pieds); S. I. G.; opération césarienne le 20 déc., 1 h. s.; durée totale du travail 37 h.; délivr. à 1 h. et demie s. Fille forte qui sort en bon état quelques jours après. Mort de la mère le 22 déc., par péritonite subaiguë.

10. — C..., 19 ans, entre le 20 nov. 1862. Constitution générale bonne; bassin rétréci dans tous ses diamètres; diam. S. S. P. 0m.08; primipare; réglée à 13 ans, régul.; dernière époque 8 avril. Grossesse de 7 mois; premières douleurs 21 nov., 11 h. m.; rupt. membr. 23 nov., 6 h. s.; accouchement prématuré artific. 24 nov.; forceps et céphalotripsie 5 h. et demie s.; sommet O. I. G. A.; durée totale du travail 78 h. et demie; délivr. nat. Enfant : garçon né mort, p. 1.301. Suites de couches : douleurs abdominales. Sortie en bon état 13 déc.

11. — M..., 26 ans, entre le 21 juin. Pas de rachitisme; diam. S. S. P. 0m.08; primipare; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque menstruelle 7 sept. Grossesse de 9 mois; chute 15 jours avant; mort de l'enfant; premières douleurs 19 juin, 9 h. m.; rupt. membr. 20 juin, 3 h. s.; présent. sommet; position (?); procidence du condon; la dilat. étant encore incomplète 21 juin, 10 h. et demie s.; crâniotomie et céphalotripsie; durée totale

du travail 57 h. et demie; délivr. nat. Enfant : garçon fort, macéré, p. (?). Suites de couches nat.; sort en bon état 3 juill.

12. — Dil .., 17 ans, entre le 23 juin 1864. Constitution générale bonne; bassin vicié; diam. S. S. P. 0m.08; primipare: réglée à 15 ans, irrégul.; dernière époque (?). Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs 22 juin 4 h. m.; rupt. membr. 21 juin, 4 h. s.; dilat. complète 22 juin, 6 h. et demie s.; sommet, procidence du condon et du membre infér. (?) gauche; O. I. G. A.; rétropulsion 23 juin, de 6 h. à 10 h. s.; forceps, crâniotomie, céphalotripsie; extraction de l'enfant avec la pince Simpson; durée totale du travail 30 h. et demie; délivr. nat. Enfant, p. (?). Suites de couches : péritonite; mort le 24 juin. Déchirure de l'utérus.

QUATRIÈME CATÉGORIE.

Diamètre sacro-sous-pubien de 0.07 à 0.08.

1. — Bert..., 25 ans, entre le 20 mai 64. Rachitique; D. S. S. P. 0m.078; dernière époque menst. 4 déc.; primipare à 7 mois et demi; accouch. prématuré artific. par le dilatateur de M. Tarnier; rupt. spontanée des membr.; contractions insuffisantes et irrégulières; prolongation du travail 28 juillet; incisions à l'orifice utérin; application de forceps, crâniotomie, céphalotripsie; version pelvienne; enchatonnement du placenta; déliv. artific. Mort de la femme le 30 juillet.

2. — Fla..., entre le 3 avril 70. Rachitique; diam. S. S. P. 0m.075; primipare; réglée à 22 ans, régul.; dernière époque 5 juillet. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 8 avril, 11 h. et demie s.; rupt. artif. des membr. 10 avril, 10 h. 15 m.; dilat. complète (?); sommet O. I. G. A.; accouch. artificiel 11 h. et demie m.; forceps crâniotomie; durée totale du travail : 36 h. Enfant : p. 3.100 déliv. nat. Suites de couches nat. Sortie de la femme en bon état.

CINQUIÈME CATÉGORIE.

Diamètre sacro-sous-pubien de 0.06 à 0.07.

1. — K..., entre le 4 mars 1870. Rachitique; diam. S. S. P. 0m.065; primipare; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque, 9 août. Grossesse de

7 mois; accouch. prématuré artif.; dilatation de l'orifice par le dilatateur de M. Tarnier, 10 mars, 1 h. m.; premières douleurs à midi; rupt. spontanée des membr., 11 mars, 6 h. m.; dilat. complète (?); sommet O. I. G. A., 13 mars, 10 h. 35 m.; accouch. par application de forceps au détroit sup.; durée totale du travail, 46 h. 35; délivr. nat. Enfant : garçon, mort, p. 2,350. Suites de couches, nat. Sortie de la femme en bon état.

2. — G..., 32 ans, entre le 23 janv. 1868. Rachitique; D. S. S. P. 0.06 un quart; un accouch. nat. et un artif. antérieurs; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque menstr., mai 1867. Grossesse de 8 mois; apparition des premières douleurs, 21 janv. 11 h m.; rupt. membr. (?); dilat. de l'orifice par incisions multiples; épuisement de la femme pendant le travail; présent. sommet O. I. D. P.; crâniotomie et céphalotripsie, 23 janv. 11 h. m.; durée totale du travail, 48 h.; délivr. nat. Enfant : fille, p. 2.780, sans masse cérébrale. Mort de la femme 3 h. après l'accouchement.

3. — B..., 21 ans, entre le 24 juin 1863. Primipare; constitut. forte; diam. S. S. P., 6 centimètres; réglée à 11 ans, régul.; dernière menstruation, 8 sept. Grossesse actuelle de 9 mois; premières douleurs le 26 juin, 2 h. m.; rupt. des membr., 5 h. s.; sommet O. I. D. T.; terminaison de l'accouch. par céphalotripsie, 9 h. et demie s.; durée totale du travail, 19 h. et demie; délivr. nat. Garçon mort, p. 1.950. Suites de couches nat. Sortie de la malade en bon état le 11 juillet.

SIXIÈME CATÉGORIE.

Diamètre sacro-sous-pubien de 0.05, ou diamètre sacro-pubien de 0,04.

Rad..., entre le 6 déc. 1869. Rachitique; diam. S. S. P. 0^{m}.05; primipare; réglée à 20 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 7 mois (pneumonie); premières douleurs (?), 31 janv. 1870, 2 h. s.; rupt. des membr.; dilat. compl. (?); siége, position gauche; opération césarienne le 1er fév., 11 h. et demie m. Enfant : garçon, faible, p. 1.850. Suites de couch.: péritonite; mort de la femme. Enfant vivant.

SEPTIÈME CATÉGORIE.

Rétrécissements par obstruction.

1. — Dam..., 30 ans, entre le 5 janv. Constitution générale bonne; bassin vicié par obstruction; 1 fille à terme, sommet, nat.; réglée à 15 ans régul.; dernière époque menstruelle, 17 mars. Grossesse de 9 mois; premières douleurs, 5 janv., 10 h. s.; rupt. membr., 3 h. m.; dilat. complète, 6 janv., 3 h. m.; sommet O. I. G. A.; accouchement nat. 4 h. m.; durée totale du travail, 6 h.: délivr. nat. Enfant : fille, forte, p. 3.350. Suites de couches nat. Sortie de la mère en bon état, et de l'enfant avec ophthalmie, 17 janv.

2. — H..., 24 ans. Exostose du sacrum; 1 fille et 1 garçon à terme; sommet nat.; réglée à 16 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs, 1er juin, 4 h. m.; rupt. membr., 8 h. m.; dilat. complète, id.; sommet O. I. G. A.; accouchement par le forceps, 6 h. s.; durée totale du travail, 14 h.; délivr. nat. Enfant : garçon, fort, p. 3.800. Suites de couches : phlébite. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état, le 12 juin.

HUITIÈME CATÉGORIE.

Bassins dont le degré de rétrécissement n'est point indiqué.

1. — Lagr..., 24 ans, entre le 12 oct. 1863. Constitution forte; bassin vicié; a eu une fille à terme par forceps; réglée à 17 ans, régul.; dernière menstruation le 14 janv. Grossesse actuelle de 9 mois; premières douleurs le 11 oct., à 11 h. s.; rupt. membr. 13 oct. 6 h. et demie m.; dilat. complète (?); sommet seul O. I. G. A.; terminaison de l'accouchement 13 oct., 5 h. s. par céphalotripsie et version pelvienne; durée totale du travail 42 h.; délivr. nat. Enfant : fille, p. 2.550. Péritonite, rupture de l'utérus, mort de la mère 14 oct.

2. — Mar..., 24 ans, entre le 14 mars 1863. Constitution faible; bassin vicié dans tous ses diamètres; primipare; réglée à 14 ans; dernière men-

struation (?). Grossesse de 8 mois et demie; scarlatine ; premières douleurs 16 mars, 1 h. m.; rupt. membr. 17 mars, 8 h. m.; dilat. complète (?); face, M. I. D. P. Morte de scarlatine avant l'accouchement 9 h. s.

3. — Lej..., 24 ans, entre le 26 mars 1863. Constitution forte; bassin vicié; primipare; réglée à 16 ans; dernière époque le 26 juin. Grossesse de 9 mois; premières douleurs et rupt. membr. le 29 mars, à 9 h. m.; dilat. complète, à 10 h. et demie; sommet O. I. G. A.; accouch. nat., à 11 h. et demie m.; déchirure du périnée; durée totale du travail : 2 h. et demie; délivr. nat. Enfant : fille, forte, p. 2.500. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 11 avril.

4. — Pet..., 29 ans, entre le 29 oct. 1863. Constitution forte; bassin rétréci; a eu un garçon avant terme extrait par le forceps; réglée à 14 ans; dernière menstruation (?). Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs le 31 oct., à 10 h. s.; rupt. des membr. (?); dilat. complète le 1er nov., à 3 h. m.; sommet seul O. I. G. A.; accouch. nat., à 3 h. et demie m.; durée totale du travail : 5 h. et demie; délivr. nat. Enfant : garçon, faible. p. 2.460. Suites de couches : phlegmon. Sortie de la mère en bon état le 23 janv. 1864. L'enfant était mort quelques jours avant.

5. — Les..., 21 ans, entre le 9 juill. 1863. Constitution forte; bassin vicié; primipare; réglée à 16 ans; dernière menstruation (?). Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs le 9 juillet, à 8 h. et demie m.; rupt. des membr., a 11 h. et demie m.; dilat. complète, 12 h. trois quarts; sommet O. I. G. A.; procidence du cordon avec ralentissement de la circulation fœtale; accouch. nat.; durée totale du travail : 4 h. trois quarts; déliv. nat. Fille forte, p. 2.300. Suites de couches compliquées de métrite. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 20 juillet.

6. — Sér..., 30 ans et demi, entre le 27 avril 1863. Constitution forte ; diam. rétrécis; 1 avortement de 6 mois; réglée à 14 ans, régul.; dernière menstruation le 7 août. Grossesse actuelle de 8 mois et demi; premières douleurs le 30 avril, à 6 h. s.; rupt. des membr. (?); dilatation complète, a 9 h. et demi s.; sommet O. I. G. A.; 1 circulaire du cordon; accouch. nat., à 10 h. s.; durée totale du travail : 4 h.; délivr. nat. Enfant : fille, forte, p. 2.550. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 9 mai.

7. — Cho..., 21 ans, entre le 21 janv. 1861. Bien constituée; 1 garçon à terme; sommet; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque menstruelle le 24 avril. Grossesse de 9 mois ; apparition des premières douleurs le 26 janv., a 4 h. s.; rupt. des membr. presque immédiate, dilat. complète le 27 janv., à minuit 10; présent. sommet O. I. D. P. réduite ; accouch. nat. le 28 jan-

vier, à 1 h. m.; durée totale du travail : 9 h. Garçon, fort, p. 3.550. Suites de couches : métrite. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 8 février.

8. — Rog..., 27 ans, entre le 10 oct. 1863. Constitution forte; bassin rétréci; a eu 2 garçons à terme; N. S., réglée à 12 ans, régul.; dernière menstruation (?). Grossesse actuelle de 9 mois; premières douleurs le 16 octobre, à 11 h. m.; rupt. des membr., à 3 h. s.; dilatat. complète le 17 octobre, à 7 h. m.; sommet seul, O. I. G. A.; accouch. nat., à 7 h. et demie m.; durée totale du travail : 20 h. et demie; délivr. nat. Garçon, fort, p. 3.480. Suites de couches : eschares légères de la paroi post. du vagin. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 24 octobre.

9. — Lau..., 33 ans, entre le 29 sept. 1863. Constitution forte; bassin vicié; a eu artificiellement 1 garçon avant terme; réglée à 17 ans; dernière menstruation (?). Grossesse actuelle de 9 mois; premières douleurs le 28 sept., à 4 h. m.; rupt. des membr., à 11 h. m.; dilatation complète (?); sommet seul; position (?); terminaison de l'accouchement par le forceps le 29 sept., à 9 h. trois quarts m.; durée totale du travail : 18 h.; délivr. nat. Fille morte, p. 2.885. Suites de couches compliquées de la rupture spontanée de la cloison recto-vaginale. Sortie de la mère malade le 6 octobre.

10. — Alo..., 27 ans, entre le 20 sept. 1863. Primipare; réglée à 18 ans, régul.; constitution forte; bassin vicié (?); dernière menstruation le 3 janvier. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 4 oct., à 4 h. s.; rupture des membr. ignorée; dilatation complète, à 11 h. s.; sommet seul O. I. G. A.; accouch. nat. le 5 oct., à 1 h. m.; durée totale du travail : 9 h.; déliv. nat. Fille forte, p. 2.200. Mort-née. Suites de couches naturelles. Sortie de la mère en bon état le 17 octobre.

11. — F..., 23 ans, entre le 1er nov. 1863. Constitution forte; bassin vicié (?); primipare; réglée à 13 ans, régul.; dernière menstruation (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 1er nov., 7 h. m.; rupt. des membr. 9 h. et demie; dilatation complète 10 h. s.; sommet O. I. D. P., avec procidence du cordon; accouch. nat. à 10 h. et demie du soir; durée totale du travail 15 h. et demie; délivr. nat. Fille faible, morte quelques jours après, p. 2.680. Suites de couches : bronchite et eschares des petites lèvres. Sortie de la mère en bon état le 10 nov.

12. — C..., 30 ans, entre le 7 novembre 1863. Constitution forte; bassin vicié; a eu une fille à 7 mois S. N., réglée à 19 ans, régul.; dernière menstruation le 12 fév. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 7 nov., 10 h. et demie s.; rupt. des membr. (?); dilatation complète le 7 nov., 10 h. et demie s.; sommet seul, O. I. G. A.; accouch. nat. le 7 nov., 11 h. s.;

durée totale du travail 10 h. et demie; délivr. nat. Enfant : fille forte, p. 3.000. Suites de couches naturelles. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 21 nov.

13. — Paq..., 24 ans, entre le 10 déc. 1863. Constitution forte; bassin vicié; primipare; réglée à 15 ans, régul. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 10 déc., 3 h. m.; rupt. des membr. (?); dilat. complète le 12 déc. 8 h. m.; sommet seul O. I. G. A.; accouch. terminé par le forceps à 9 h. m.; durée totale du travail 54 h.; délivr. nat. Garçon mort, p. 2.700. Péritonite. Mort de la mère le 15 déc.

14. — Na..., 23 ans, entre le 25 déc. 1863. Constitution forte; bassin vicié; primipare; réglée à 15 ans, régul.; dernière menstruation le 15 av. Grossesse actuelle de 8 m.; apparition des premières douleurs le 25 déc., 5 h. m.; rupt. des membr. (?); dilat. complète à 11 h. et demie m.; accouch. nat. à 1 h. et demie du s. d'un garçon venant par le sommet O. I. D. P., d'une fille venant par extrémité pelvienne S. I. G. A.; délivr. nat. 1er né, p. 2.600; 2e né, fille, p. 2.010. Suites de couches : phlegmon de la fosse iliaque gauche. Sortie de la mère et des enfants en bon état le 27 fév.

15. — Ség..., 26 ans, entre en déc. 1863. Constitution forte; bassin vicié; primipare; réglée à 15 ans, régul.; dernière menstruation le 6 mars. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 25 déc.; rupt. des membr. le 26 déc., à 11 h. et demie m.; dilat. complète à 8 h. et demie s.; sommet seul O. I. D. P. à 9 h. s.; terminaison de l'accouch. par application de forceps et incisions sur l'orifice utérin; délivr. nat. Garçon faible, p. 2.700. Suites de couches : péritonite et eschares de la vulve. Mort de la mère le 10 janv. 1864.

16.— Reng..., 22 ans, entre le 11 déc. 1863. Constitution générale bonne; bassin vicié; 1 garçon à terme; sommet nat.; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque 10 juill. Grossesse de 6 mois; premières douleurs 28 déc., 8 h. m.; rupt. des membr.; dilat. complète, 10 h. m.; pelvis S. I. G. A.; accouch. prématuré nat. 10 h. et demie m.; durée totale du travail, 2 h. et demie; délivr. nat. Enfant : garçon mort, p. 1.450. Suites de couches : fièvre, douleurs abdominales. Sortie en bon état le 9 juin.

17.— Def..., 40 ans, entre le 8 févr. 1863. Constitution générale bonne; bassin vicié; une fille à terme; sommet nat.; réglée à 17 ans; régul.; dernière époque 28 mai. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 21 févr., 7 h. s.; rupt. membr. (?); dilat. complète, 8 h. s.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat., 8 h. trois quarts m.; durée totale du travail, 16 h. trois quarts; délivr. nat. Enfant : garçon, faible, p. 2.700. Suites de couches, nat. Sortie de la mère en bon état et mort de l'enfant le 27 févr.

18. — Debr..., 28 ans. Constitution générale bonne; bassin vicié; 1 garçon à 7 mois; sommet nat.; réglée à 18 ans; régul.; dernière époque 1er mai. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 11 mars, 11 h. m.; rupt. membr. 9 h. s.; dilat. complète id.; sommet O. I. G. A. avec procidence du cordon; accouch. par le forceps 12 mars, 9 h. m.; durée totale du travail, 22 h. Enfant : fille, faible, p. 3.200. Suites de couches; bronchopneumonie. Mort de l'enfant le 13 mars. Sortie de la mère en bon état le 31 mars.

19. — Clay..., 34 ans, entre le 17 mai 1862. Bassin vicié; pas de rachitisme; 4 accouch. avant terme, nat.; 2 garçons à terme, artific.; réglée à 13 ans, régul.; dernière époque 12 oct. Grossesse de 7 mois et demi; premières douleurs 17 mai, 1 h. m.; rupt. membr. 5 h. et demie m.; dilat. complète 6 h. et demie m.; siége et cordon S. I. G. A.; accouch. nat., 6 h. et demie m.; durée totale du travail, 5 h. et demie; délivr. nat. Enfant: fille, faible p., 1.050. Suites de couches nat. Mort de l'enfant 19 mai. Sortie de la mère en bon état le 24 mai.

20. — Bid..., 28 ans, entre le 19 mai 1862. Constitution générale bonne; bassin vicié; 1 garçon et 1 fille à terme; sommet nat.; réglée à 20 ans, régul.; dernière époque 8 août. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 19 mai, 5 h. et demie s.; rupt. membr. 9 h. et demie s.; dilat. complète id.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. 10 h. s.; durée totale du travail, 4 h. et demie; délivr. nat.; Enfant : garçon fort, p. 8.250. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 22 mai.

21. — Ter..., 21 ans, entre le 1er sept. 1862. Constitution générale bonne; bassin vicié; 1 garçon, 1 fille à terme; sommet nat.; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque 11 nov. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 1er sept., 5 h. m.; rupt. membr. 1 h. s.; dilat. complète 1 h. s.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. 1 h. et demie s.; déchirure du périnée; durée totale du travail, 8 h. et demie; délivr. nat. Enfant: garçon, fort, p. 2.900. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 8 sept.

22. — Len..., 19 ans, entre le 9 déc. 1862. Constitution générale bonne; bassin vicié; primipare; réglée à 16 ans et demi; régul.; dernière époque (?). Grossesse de 7 mois et demi; premières douleurs 21 déc., 1 h. m.; rupt. membr. (?); dilat. complète 9 h. et demie s.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat., 10 h. s.; durée totale du travail, 21 h.; délivr. nat. Enfant: garçon mort, p. 1.300. Suites de couches: péritonite. Mort 20 fév.

23. — Cli..., 25 ans, entre le 10 juin. Constitution générale bonne, bassin vicié...; trois garçons avant terme; acc. artificiels; réglée à 13 ans,

régul.; dernière époque, 27 mai. Grossesse de 7 mois et demi; premières douleurs 12 janv., 11 h. s.; rupt. des membr. 13 janv., 9 h. et demie m.; dilat. complète, id.; sommet O. I. G. A.; accouchement artificiel 10 h. m., par le forceps; durée totale du travail : 11 h.; délivr. nat. Enfant : garçon mort, p. 2.530. Suites de couches nat. Sortie de la mère en bon état le 26 janv.

24. — All..., 23 ans, entre le 17 fév. 1861; primipare; bassin vicié; réglée à 16 ans, régul.; dernière époque, 12 mai. Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs 16 fév., 8 h. s.; rupt. membr. (?) dilat. comp'ète (?); sommet avec avant-bras O. I. D. P.; applicat. de forceps 17 fév., 9 h. et demie m.; durée totale du travail : 13 h. et demie; délivr. nat. Enfant : garçon faible, p. 2.250, né mort. Suites de couches : métrite et entérite. Sortie de la mère en bon état le 7 mars.

25. — Hub..., 23 ans, entre le 10 fév. 1861. Constitution faible; bassin vicié. Une fille avant terme, un garçon à terme; sommet artific.; réglée à 12 ans, régul. Dernière époque menstr. (?). Grossesse actuelle de 5 mois et demi; premières douleurs 13 fév.. minuit; rupt. membr. (?); dilat. complète, id.; avortement spontané 6 h. m.; sommet; durée totale : 6 h.; délivr. nat. Fœtus : fille faible, p. 750 gr.; suites de couches nat. Sortie de la mère en bon état le 25 fév.

26.— Duh..., 25 ans, entre le 7 fév. 1861. Constitution générale bonne; bassin vicié; primipare; régl. à 16 ans, régul.: dern. époque menst. 1 mai. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 7 fév., 7 h. m.; incisions sur l'orifice; sommet O. I. D. P.; accouchement artific. 9 h. m. par le forceps; durée totale du travail : 31 h. Enfant : garçon faible, p. 2.800. Suites de couches nat. Enfant mort le 11 fév. Sortie de la mère en bon état le 23.

27. — Dev..., 18 ans, entre le 12 déc. 1861. Constitution faible; bassin vicié; primipare; réglée à 16 ans, régul.; dernière époque menstr. (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs 15 mars, 9 h. et demie m.; rupt. membr. et dilat. complète 16 mars, 9 h. m.; sommet O. I. D. P.; applicat. de forceps 10 h. m.; durée totale du travail : 25 h. Enfant : fille, née morte, p. 2.900. Suites de couches nat.

28. — Deb..., 23 ans, entre le 20 mars 1861. Constitution générale bonne; bassin vicié; primipare; réglée à 12 ans et demie, régul.; dern. époque menstr. 15 juill. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 19 mars, 10 h. m.; rupt. des membr. 4 h. s.; dilat. complète (?); sommet avec procidence du bras O. I. G. A.; applicat. de forceps 20 mars, 10 h. m.; durée totale du travail : 24 h.; délivr. nat. Enfant : fille, 3.700; suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 28 mars.

29. — Den..., 28 ans, entre le 29 avril 1861. Constitution générale

bonne; bassin rétréci; 1 garçon à terme, épaule, version pelvienne; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque, 17 août. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 10 mai, 5 h. m.; rupt. membr.(?); dilat. complète 11 mai, 4 h. trois quarts m.; sommet O. I. G. A.; accouchement nat. 5 h. m.; durée totale du travail : 24 h.; déliv. nat. Enfant : fille faible, p. 3.100. Suites de couches : nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 21 mai.

30. — Des..., 21 ans, entre le 2 juin 1861. Constitution générale bonne; bassin vicié; 1 fille à terme; sommet nat.; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque 28 août. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 3 juin, 6 h. s.; rupt. membr.(?); dilat. complète, 5 h. s.; sommet, procidence du cordon O. I. D. P.; accouch. nat. 5 h. et demie s.; durée totale du travail : 11 h. et demie. Délivr. nat. Enfant : fille forte, p. 2.600. Suites de couches : embarras gastrique fébrile. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 2 juin.

31. — Pan..., 28 ans, entre le 11 juin 1861. Constitution générale moyenne; bassin vicié; 1 fille à terme; sommet, forceps; réglée à 19 ans, irrégul.; dernière époque (?). Grossesse de 7 mois; premières douleurs 11 juin, 9 h. s.; rupt. memb.(?) 12 juin, 7 h. et demie m.; dilat. complète id.; sommet, procidence du cordon O. I. G. A.; accouchement par le forceps, 8 h. et demie m.; durée totale du travail : 11 h. et demie; délivr. nat. Enfant : garçon moyen, 2 k. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 27 juin.

32. — Tar..., 24 ans, entre le 9 sept. 1861. Constitution générale bonne; bassin vicié; primipare; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque 4 janv. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 1er nov., 1 h. m.; rupt. membr. 4 h. m.; dilat. complète(?); sommet O. I. G. A. 4 h. et demie s., céphalatripsie et version; déchirure du périnée; durée totale du travail, 15 h. et demie; délivr. nat. Enfant : garçon, p. 3.000. Suites de couches : phlegmon érysipélateux. Sortie en bon état 2 déc.

33. — Lév..., entre le 10 nov. Constitution générale bonne; bassin vicié; primipare; réglée 22 ans, régul.; dernière époque. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 10 nov., 8 h. s. (?); rupt. membr. 11 nov., minuit; dilat. complète(?); sommet O. I. G. A.; applicat. de forceps 11 h. mat.; déchirure du périnée; durée totale du travail : 11 h. Enfant : garçon fort, p. 3.000. Suites de couches : fièvre, escharres. Enfant mort 13 nov. Sortie de la mère en bon état 26 nov.

34. — Bréz..., 33 ans, entre le 29 nov. Constitution générale bonne; une fille à terme; sommet nat.; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque 16 fév. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 29 nov., 8 h. s.; rupt.

memb. (?); dilat. complète 10 h. et demie s.; sommet circulaire O. I. G. A. accouch. nat. 11 h. et demie s.; durée totale du travail : 3 h. et demie; délivr. nat. Enfant : fille forte, p. 3.300. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état 11 déc.

35. — Per..., 20 ans, entre le 10 juill. 1866. Constitution bonne; primipare; réglée à 18 ans, régul.; dernière époque 6 nov. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 28 août, 10 h. s.; rupt. membr. 29 août, 6. h. et demie m.; dilat. complète 11 h. et demie; sommet O. I. D. P. réduite; accouchement nat. midi et demi; durée totale du travail : 15 h.; Délivr. artif. Enfant : fille forte, p. 550. Suites de couches : embarras gastrique. Sortie de la mère et de l enfant en bon état le 6 sept..

36. — Cart..., 22 ans, entre le 14 mai 1866. A eu une fille à terme S. N. réglée à 17 ans, régul.; dernière époque le 8 août; premières douleurs (grossesse de 9 mois) le 14 mai, 10 h. m.; rupt. des membres 3 h. 25 s.; dilat. complète 3 h. et demie; sommet O. I. G. O.; accouch. nat. à 3 h. et demie; durée totale du travail : 5 h.; délivr. nat.; garçon fort, p. 2.810. Suites de couches : diarrhée, fièvre. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 21 mai.

37. — Mét..., 39 ans, entre le 24 juill. 1868. Bien constituée; épines sciatiques rapprochées l'une de l'autre; accouchée antérieurement, naturellement, de trois filles à terme venues par le sommet; réglée à 18 ans, et régul.; dernière menstruation le 19 nov. Grossesse actuelle de 8 mois; premières douleurs le 25 juill., 2 h. s.; rupt. des membr. le 24 juill., 3 h. m.; dilat. complète le 25 juill., à 8 h. 25 s.; sommet O. I. D. P. réduite; accouch. nat. à 8 h. et demie s.; durée totale du travail : 6 h. et demie; délivrance naturelle. Enfant : garçon moyen, p. 2.570. Suites de couches : naturelles. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 3 août.

38. — Rob..., 30 ans, entre le 12 avril 1868. Rachitique, *bassin très-rétréci*; primipare; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque menstruelle le 12 sept. Grossesse act. de 8 mois; apparition des premières douleurs le 1er mai, à 11 h. m.; rupt. des membr. le 2 mai, à 10 h. et demie; dilat. complète (?); présentat. du sommet O. I. G. A.; accouch. terminé le 3 mai par le forceps appliqué au détroit sup.; procidence du cordon ombilical; durée totale du travail : 28 h.; garçon mort-né, p. 2.000; délivrance naturelle. Suites de couches normales. Sortie de la mère en bon état le 29 mai.

39. — Brig..., 25 ans, entre le 23 avril 1865. Constitution forte; bassin rétréci; primipare; réglée à 17 ans, irrégul.; dernière menstruation(?). Grossesse de 9 mois (pleurésie); premières douleurs le 23 avril, 4 h. m.;

rupt. des membr. (?); dilat. complète 1 h. s.; sommet seul O. I. G. A.; accouch. nat. à 3 h. s.; durée totale du travail 11 h.; déliv. nat. Garçon fort, p. 3.220. Suites de couches : fièvre, douleurs dans le côté gauche du ventre. Sortie de la mère et enfant en bon état le 24 mai.

40. — Chev..., 30 ans, entre le 12 avril 1865. Bonne constitution; bassin vicié; a eu 1 fille et 1 garçon à terme S. N.; réglée à 18 ans, régul.; dernière époque le 1er juillet. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 14 avril, 8 h. m.; rupt. des membr. 6 h. s.; dilat. complète id.; sommet avec circulaire O. I. G. A.; accouch. nat. à 7 h. s.; durée totale du travail, 11 h. et demie. Enfant : garçon fort, p. 3.550. Suites de couches : tranchées utérines, gerçures des seins. Sortie de la mère en bon état avec son enfant le 24 avril.

41. — Lema..., 20 ans, entre le 24 mai 1865. Constitution forte; bassin rétréci; a eu 1 garçon à terme S. N.; réglée à 13 ans, régul.; dernière époque (?). Grossesse de 8 mois et demi; premières douleurs le 24 mai, 5 h. s.; rupt. des membr. artific. le 25 mai, 7 h. m.; dilat. complète id.; sommet O. I. G. A. avec circulaire; accouch. nat. 7 h. m.; délivr. nat.; durée totale du travail 14 h. Fille forte, p. 2.920. Suites de couches naturelles. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 2 juin.

42. — Lef..., 25 ans, entre le 10 juin 1865. Constitution forte; bassin rétréci; a eu N. 1 garçon avant terme S.; réglée à 15 ans, régul.; dernière menstruation le 20 août. Grossesse de 9 mois; premières douleurs le 11 juin, à 11 h. s.; rupt. des membr. 12 juin, 1 h. et demie m.; dilat. complète id.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. le 12 juin, 2 h. m.; durée totale du travail 3 h.; délivr. nat. Garçon fort, p. 3.500. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 17 juin.

43. — Feal..., 24 ans, entre le 20 sept. 1864. Constitution générale bonne; bassin rétréci; 1 fille à terme; sommet nat.; réglée à 14 ans, régul.; dernière époque 20 déc. Grossesse de 9 mois; premières douleurs 26 sept., 5 h. s.; rupt. membr. 9 h. et demie s.; dilat. complète id.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat. 10 h. s.; durée totale du travail 5 h.; déliv. nat. Enfant : garçon fort, p. 3.140. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état 8 oct.

44. — Fa..., 18 ans, entre le 25 nov. Constitution faible; bassin vicié; primipare; réglée à 15 ans; régul.; dernière époque 1er mars. Grossesse de 8 mois; premières douleurs 11 déc., minuit; rupt. membr. 12 déc., 1 h. et demie s.; artific.; dilat. complète 3 h. et demie s.; sommet O. I. D. P.; accouch. nat., 4 h. s.; durée totale du travail, 16 h.; délivr. nat. Enfant : fille, faible, p. 2.070. Suites de couches : métro-péritonite. Mort de la mère le 14 et de l'enfant le 15 déc.

45. — Lap..., 33 ans, entre le 14 sept. 1864. Constitution générale bonne; bassin vicié; 1 garçon, 1 fille à terme; sommet nat.; réglée à 11 ans; régul., dernière époque (?). Grossesse de 8 mois; premières douleurs 1er oct., 9 h. m.; rupt. membr. 2 oct., 3 h. s.; dilat. complète 2 h. et demie s.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat., 3 h. s.; durée totale du travail, 30 h.; délivr. nat. Enfant: fille, faible, p. 2.250. Suites de couches nat. Sortie de la mère en bon état et de l'enfant avec ophthalmie 11 oct.

46. — Ke..., 17 ans. Constitution générale bonne, entre le 16 janv. 1864; bassin rétréci; primipare; réglée à 15 ans; régul.; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs 8 févr., 2 h. m.; rupt. membr. 9 févr., 7 h. trois quarts m.; dilat. complète, 11 h. et demie m.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat., midi et demi; durée totale du travail, 22 h. et demie; délivr. nat. Enfant: fille, forte, p. 3.000. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 22 févr.

47. — Bouf..., entre le 7 nov. Constitution générale bonne; bassin vicié; une fille à terme; sommet nat.; réglée à 17 ans; régul.; dernière époque (?). Grossesse de 9 mois; premières douleurs 1er déc., 8 h. s.; rupt. membr. 2 déc., minuit; dilat. complète id.; sommet O. I. G. A.; accouch. nat., 1 h. m.; durée totale du travail, 5 h.; délivr. nat. Enfant: fille, faible, p. 3.200. Suites de couches: phlegmon péri-utérin. Sortie de la mère et de l'enfant en bon état le 24 déc.

48. — Bat..., 27 ans, entre le 16 mars. Bien constituée; bassin vicié; primipare; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque menstruelle 15 juin 1859. Grossesse de 9 mois; apparition des premières douleurs 16 mars 9 h. m.; rupt. membr. 17 mars, 1 h. m.; dilat. complète 6 h. m.; présent., sommet, position : O. I. G. A.; accouchement par le forceps 11 h. et demie m.; durée totale du travail 10 h. et demie; délivr. nat. Enfant : fille morte, p. 3150. Suites de couches : morte 29 mars.

49. — Jom..., 25 ans, entre le 16 mai. Bien constituée; bassin vicié; deux garçons jumeaux à terme; accouchement nat.; réglée à 19 ans, régul.; dernière apparition des règles ignorée. Grossesse actuelle de 9 mois; première apparition des douleurs 29 mai 10 h. m.; rupt. des membr. (?); dilat. complète (?); présentat., sommet; position : O. I. D. P.; accouchement le 30 mai, 10 h. m.; application de forceps et céphalotripsie; durée totale du travail 24 h.; délivr. nat. Enfant : fille faible, p. 1.350. Suites de couches nat. Sortie de la mère en bon état 5 juin.

50. — Deu..., 32 ans, entre le 7 sept. Bien constituée; bassin vicié; deux garçons à terme; accouchement par le forceps; un avortement de 3 mois; réglée à 16 ans, régul.; dernière époque menstruelle 25 déc. Grossesse de 9 mois; apparition des premières douleurs 7 sept., 3 h. m.;

rupt. membr. et dilat. complète 8 h. m.; présentation, sommet; position : O. I. G. A.; application de forceps 11 h. m.; durée totale du travail 8 h.; délivr. nat. Enfant : garçon mort, p. 2.500. Suites de couches nat. Sortie de la mère en bon état 20 sept.

51. — Jé..., 32 ans, entre le 19 sept. Bien constituée; bassin vicié; primipare; réglée à 15 ans, régul.; dernière époque menstruelle 15 déc. Grossesse de 9 mois; apparition des premières douleurs 19 sept., 6 h. s.; rupt. des membr. minuit; dilat. complète 20 sept. 10 h. m.; présentat., sommet; position : O. I. D. P.; application de forceps 10 h. et demie; durée totale du travail 11 h.; délivr. nat. Enfant : fille forte, p. 3.500. Suites de couches nat. Sortie de la mère et de la fille en bon état 11 oct.

52. — Gous..., 18 ans, entre le 24 nov. Assez bien constituée; bassin vicié; primipare; réglée à 15 ans, régul.; dernière apparition des règles 8 fév. Grossesse actuelle de 9 mois; premières douleurs 24 nov. 10 h. m. dilat. complète 9 h. et demie; présent., sommet; position : O. I. G. A.; procidence du cordon; accouchement par le forceps 11 h. et demie m.; déchirure du périnée; durée totale du travail 25 h. et demie; délivr. nat. Enfant : garçon fort, p. 2.750. Mort. Suites de couches : péritonite. Sortie de la mère en mauvais état le 6 déc.

53. — Mon..., 26 ans, entre le 28 sept. Bien constituée; bassin vicié; une fille et un garçon à terme; accouchement nat.; réglée à 16 ans, régul.; dernière époque menstruelle 15 nov. Grossesse actuelle de 9 mois; apparition des premières douleurs 29 sept., 6 h. m.; rupt. des membr. 9 h. m.; dilat. complète 10 h. et demie; présent., sommet; position : O. I. G. A.; accouchement nat. 11 h. et demie m.; durée totale du travail 5 h. et demie; délivr. nat. Enfant : garçon fort, p. 2.750. Suites de couches : péritonite; morte 7 oct. Enfant sorti en bon état.

Deuxième Partie

Dans cette deuxième partie de notre thèse, nous allons donner, sous forme de tableaux, un exposé des divers modes de terminaison des accouchements et des opérations qui ont été pratiquées dans chacune des catégories de rétrécissements. Nous tiendrons compte de tous les éléments qui peuvent influencer le mode de terminaison. Nous nous attacherons surtout à bien montrer quel a été, dans chaque opération, le résultat final, tant au point de vue de la mère qu'au point de vue de l'enfant. Les causes de mort certaines ou probables seront consignées aussi exactement que possible.

PREMIÈRE CATÉGORIE (243 CAS).

Rétrécissements de 0.10 de diamètre sacro-sous-pubien, ou 0.09 de diamètre sacro-pubien, et au-dessus.

Accouchements spontanés (191 *cas*).

29 enfants morts (15.83 p. 100) et 29 mères mortes (15 83 p. 100).

191 cas où l'accouchement est spontané.

Poids moyen de l'enfant, 2.700.

102 à terme.
89 avant terme.

82 primipares.
109 multipares.

129 O. I. G. A.
47 O. I. D. P.
1 O. I. D. A.
14 siéges.
1 face, M. I. G. A.

Durée moyenne du travail, 16 h.

147 mères et enfants en bon état.

15 mères mortes et enfants vivants. — La mort a été causée 6 fois par métro-péritonite, 5 fois par péritonite, une fois par phlébite, une fois par infection purulente, et une fois par fièvre typhoïde. La durée du travail a été une fois de 39 h.; dans les autres cas, elle n'a pas dépassé la moyenne.

27 mères en bon état et enfants morts. — Dans un cas, position O. I. D. P., avec un travail de 51 h.; dans un autre, enroulement du cordon autour du cou; trois siéges, l'un avec un travail de 64 h.; 5 accouchements avant terme; 2 procidences du cordon; plusieurs cas de travail prolongé.

2 mères et enfants morts. — Une mère morte de péritonite, l'autre de phlébite utérine; un enfant mort à cause de la procidence du cordon et d'un travail de 30 h., l'autre, par enroulement du cordon autour du cou.

Accouchements terminés par le forceps (34 *cas*).

24 enfants morts (70.58 p. 100), et 13 femmes mortes (38.88 p. 100).

34 cas terminés par le forceps.

Poids moyen de l'enfant, 3.000.

8 mères et enfants en bon état.

2 mères mortes et enfants vivants. — Les deux par métro-péritoni e.

24 primipares.
10 multipares.

26 à terme.
8 non à terme.

10 O. I. D. P.
17 O. I. G. A.
3 O. I. G. T.
1 O. I. G. P.
1 occipito-pubienne.
2 siéges.
1 face, M. I. D. P.

Durée moyenne du travail, 30 h.

13 mères en bon état et enfants morts.

Deux, 29 h. de travail; un autre, 88 h.; un autre, O. I. D. P., de 115 h.; un autre, présentation du siége. un autre, présentation de la face, M. I. D. P., 36 h. de travail; la mère a guéri, bien qu'elle ait eu des arthrites suppurées des symphyses pelviennes, à la suite d'une disjonction de la symphyse pubienne pendant l'opération.

12 mères et enfants morts.

Les mères sont mortes de péritonite, métro-péritonite et fièvre puerpérale. Les enfants : une fois par enroulement du cordon autour du cou, une fois de pacchiméningite, deux fois à la suite d'un travail de 32 h. et 24 h., avec position O. I. D. P.; une fois à la suite d'un travail de 43 h.

N. B. Dans quatre cas on a fait des tractions avec les mouffles. Les quatre femmes sont sorties en bon état; deux enfants sont morts. Dans trois cas on a employé le rétroceps; dans le premier, la mère est morte; dans le deuxième, l'enfant est mort; dans le troisième, résultat inconnu.

Accouchements terminés par la version pelvienne (*9 cas*).

6 enfants morts (33.33 p. 100) et 1 mère morte (11.11 p. 100).

9 terminés par version pelvienne.

4 primipares.
5 multipares.

6 à terme.
3 avant terme.

5 épaules.
2 gches { 1 C. I. G. A. / 1 C. I. D. P.
3 drtes { 2 C. I. G. A. / 1 inconnue

1 O. I. G. A.
1 O. I. D. P.

3 mères et enfants vivants.

5 enfants morts et mères vivantes.

1° Sommet, O. I. D. P., travail de 24 h.
2° O. I. G. A., avec procidence du cordon; travail de 32 h.
3° Face, avec procidence du cordon.
4° Épaule droite.
5° Épaule gauche.

sommet, position? 1 face, F. I. G. A.	1 mère et enfant morts.	Présentation de l'épaule gauche, en position C. I. G. A. Mère morte de fièvre puerpérale.
Durée moyenne du travail, 19 h.		
Poids moyen de l'enfant, 2.800.		

1 cas d'accouchement prématuré artificiel par le dilatateur de M. Tarnier. — Femme multipare; a eu déjà un accouchement prématuré artificiel; grossesse de 8 mois; diam. S. S. P. 0.10; siége, C. I. G. A.; 17 h. et demie de travail; p. de l'enfant 2.280. Suites de couches : péritonite; guérison. Enfant vivant.

Cas terminés par crâniotomie et céphalotripsie, ou par forceps, crâniotomie, céphalotripsie et version pelvienne combinés (7 *cas*).

3 femmes mortes (42.85 p. 100).

1 terminé par céphalotripsie seule. Mort.	Femme multipare; à terme; sommet O. I. G. A.; 63 h. et demie de travail; poids de l'enfant, 3.750. Lésions de l'utérus. Morte de péritonite.
4 par crâniotomie et céphalotripsie. Dans deux cas on avait d'abord essayé le forceps. 3 guérisons et 1 mort, c'est-à-dire 25 m. p. 100.	Deux primipares; à terme; sommet, O. I. D. P.; l'une, 18 h. de travail; l'autre, 29 h.; poids de l'enfant : l'un, 2.580; l'autre, 3.410. La première guérie, la deuxième morte de métro-péritonite. Deux multipares; à terme; l'une : sommet, O. I. G. A., 23 h. de travail; poids de l'enfant, 2.370; guérison. L'autre : face, F. I. G. A., 51 h. de travail; poids de l'enfant, 3.550; guérison.
2 par forceps, crâniotomie, céphalotripsie et version pelvienne combinés. 1 mort et 1 guérison.	L'une : primipare, à terme; sommet, O. I. G. A.; 23 h. de travail; poids de l'enfant, 2.850. Morte de péritonite. L'autre : multipare, avant terme; sommet, O. I. G. A.; 27 h. de travail; poids de l'enfant, 1.990. Guérison.

DEUXIÈME CATÉGORIE (80 cas).

Diamètre sacro-sous-pubien de 0.09 jusqu'à 0.10 exclusivement ou diamètre sacro-pubien de 0.08 à 0.09.

Accouchements spontanés (40 *cas*).

14 enfants morts (35 p. 100) et 5 mères mortes (12.25 p. 100).

40 cas où l'accouchement est spontané.

Poids moyen de l'enfant, 2.800.

17 primipares.
23 multipares.

11 O. I. D. P.
1 O. I. D. A.
3 siéges.
25 O. I. G. A.

Durée moyenne du travail, 13 h.

23 mères et enfants en bon état.

3 mères mortes et enfants vivants. — La mort, dans ces 3 cas, a été amenée par métro-péritonite. La durée du travail n'avait pas dépassé la moyenne.

12 mères en bon état et enfants morts. — Dans un cas, le travail avait duré 60 h.; dans un autre, 50 h.; dans un autre, présent. du siége avec circulaires autour du cou et travail de 20 h.; dans un autre, l'extraction du placenta avant le fœtus avait été nécessité par insertion vicieuse; il y avait présentation du siége et 2 h. de travail; dans un autre, il y avait présentation du sommet O. I. D. P. avec procidence du bras gauche et 2 circulaires autour du cou; travail de 15 h.; dans le dernier, présentation du siége S. I. D. P.

2 mères et enfants morts. — Dans un cas, il y avait eu une hémorrhagie au moment du travail. La mère est morte de péritonite; 9 h. de travail. Dans l'autre, métro-péritonite, O. I. D. P.; 12 h. de travail.

Accouchements terminés par le forceps (16 *cas*).

8 enfants morts (50 p. 100) et 6 mères mortes (37.50 p. 100).

13 principares.
3 multipares.

6 mères et enfants vivants.
Durée moyenne du travail, 26 h.

10 O. I. G. A.
4 O. I. D. P.
1 O. I. G. P.
1 O. I. D. A.

4 mères vivantes et enfants morts.

1° 29 h. de travail.
2° 21 h. de travail.
3° 18 h. de travail.
4° 43 h. de travail.

Poids moyen de l'enfant, 3.000.

4 mères et enfants morts.

1° Travail de 12 h.; fièvre puerpérale.
2° 15 h. de travail; phlegmon iliaque; l'enfant est mort d'asphyxie.
3° 21 h. de travail; rupture de l'utérus.
4° 32 h. de travail; péritonite.

Durée moyenne du travail, 26 h.

2 mères mortes et enfants vivants.

Travail de 58 h.; infection purulente.
Travail de 34 h.; péritonite.

Version pelvienne seule (*4 cas*).

3 enfants morts (75 p. 100) et 2 mères mortes (50 p. 100).

4 cas terminés par la version pelvienne seule.

Toutes étaient multipares.

2 présentations de l'épaule droite C. I. G. A.

L'une à 9 mois. (M. 24 ans.)
L'autre à 7 mois 1/2. (M. 28 ans.)

Mère et enfant en bon état; le travail avait duré 11 heures.
Enfant né mort; mort de la mère par péritonite; travail de 7 h. et demie.

2 présentations de l'épaule gauche. L'une, C. I. G. P. L'autre, C. I. D. A.

Toutes 2 à 9 mois. (M. 22 ans.) (M. 28 ans.

Dans la C. I. G. P., mort de l'enfant; mère en bon état; travail de 5 h. et demie.
Dans la C. I. G. P., enfant mort né; mère morte par rupture de l'utérus; le travail avait duré 16 h.

Poids moyen de l'enfant, 2.600.

Durée moyenne du travail, 12 h.

Accouchements terminés par forceps, crâniotomie, céphalotripsie et version pelvienne, combinés de façons différentes (17 *cas*).

5 par forceps, crâniotomie et céphalotripsie : Dans l'un, on a terminé l'extraction avec la pince de Simpson. 3 mères mortes (60 p. 100).	3 mères mortes.	1° 33 h. de travail ; péritonite. 2° 29 h. de travail ; métro-péritonite. 3° 23 h. de travail ; phlébite utérine.
	2 mères en bon état.	1° Multipare (1 garçon par forceps) ; grossesse de 8 mois et demi ; siége, S. I. G. A., 10 heures et demie de travail ; poids de l'enfant, 2.600 (perforation du crâne pour aider l'extraction). 2° Multipare ; grossesse de 9 mois ; O. I. G. A. ; 9 h. de travail ; poids de l'enfant, 3.700.
4 par crâniotomie et céphalotripsie : Dans un cas, on a fait la céphalotripsie avec le forceps-scie de Van - Huevel. 2 mères mortes (50 p. 100).	2 mères mortes.	L'une primipare, l'autre multipare ; l'une à 8 mois et demi, l'autre à terme ; toutes deux : sommet, O. I. G. A., avec procidence du cordon ; l'une après 26 h. de travail, l'autre après 19 heures. Toutes deux meurent de péritonite.
	2 mères vivantes.	Primipare, 8 mois et demi ; sommet, O. I. G. A. ; 33 h. de travail ; poids de l'enfant, 2.300. Primipare, à terme ; sommet ; 18 h. et demie de travail.
8 terminés par forceps, crâniotomie, céphalotropsie et version pelvienne combinés Poids moyen de l'enfant, 3.000. 6 mères mortes (75 p. 100).	2 mères en bon état.	Toutes deux : O. I. G. A., à terme, primipares ; l'une, 57 h. de travail ; l'autre, 7 h. et demie.
	6 mères mortes : 4 primipares, 2 multipares.	1° O. I. G. A., 36 h. de travail ; péritonite. 2° O. I. G. A., 26 h., id. ; métro-péritonite. 3° O. I. D. P., 37 h. et demie, id. ; cause de la mort (?). 4° Sommet, 8 h. et demie, id. ; péritonite. 5° O. I. G. A., 40 h., id. ; infection putride. 6° O. I. G. A., 22 h., id. ; infection purulente.

Accouchements prématurés et provoqués par le dilatateur de M. Tarnier (3 *cas*).

3 enfants morts et 1 mère morte (33.33 p. 100).

1° Multipare; diam. S. S. P. 0.095; grossesse de 7 mois; siége; 17 h. de travail; poids de l'enfant, 2.100. Mère vivante, enfant mort quelques jours après.

2° Primipare; diam. S. S. P. 0.095; grossesse de 8 mois; sommet, O. I. D. P.; 74 h. de travail; forceps au détroit inférieur. Poids de l'enfant, 1.920. Mère vivante, enfant mort-né.

3° Primipare; diam. S. S. P. 0.09; grossesse de 8 mois; siége, S. I. D. P.; réduite; 33 h. de travail; poids de l'enfant, 2.040. Mère morte de pelvi-péritonite, enfant mort.

TROISIÈME CATÉGORIE (12 CAS).

Diamètre sacro-sous-pubien de 0.08 jusqu'à 0.09 exclusivement. ou diamètre sacro-pubien de 0.07 à 0.08.

2 cas spontanés : 1 enf. mort et 0 mère morte.

Les deux femmes primipares; diam. S. S. P. 0.085; sommet, O. I. D. P., réduite.
Dans le premier cas, travail de 17 h.; p. de l'enf. 2.200; mère vivante et enfant mort.
Dans le deuxième, travail de 14 h.; poids de l'enf. 2.100; mère et enfant vivants.

1 par le forceps.

Primipare; diam. S. S. P. 0.085; grossesse de 8 mois et demi; sommet, O. I. G. A.; 52 h. de travail.
Poids de l'enfant, 2.630; mère et enfant en bon état.

4 par forceps, craniotomie et céphalotripsie; 1 mère morte (25 p. 100).

1 mère morte de péritonite à la suite de rupture de l'utérus et après 21 h. de travail.

3 mères en bon état.

1° Multipare, à terme; sommet, O. I. G. A.; 23 h. de travail; poids de l'enf., 3.100. (L'enfant était déjà mort avant l'opération.)
2° 6 accouchements artificiels antérieurs; grossesse de 8 mois et demi; siége, S. I. D. P.; poids de l'enfant, 2.320.
3° Primipare, à terme; sommet, O. I. D. P., réduite; 36 h. de travail; poids de l'enfant, 3.850. (Extract. de la tête par forceps et crochet aigu.)

1 par crâniotomie et céphalotripsie. | Primipare, à terme; sommet, avec procidence du cordon; 57 h. et demie de travail; enfant macéré. Guérison.

1 par l'opération césarienne. | Femme de 29 ans; diam. S. S. P. 0.08; primipare; grossesse de 9 mois; siége (pieds), S. I. G. A.; 37 h. de travail; fille forte et en bon état. Mère morte de péritonite.

Accouchements prématurés et provoqués par le dilatateur de M. Tarnier (3 *cas*).

3 enfants morts et 1 femme morte.

1° Primipare; diam. S. S. P. 0.08; grossesse de 7 mois; sommet, O. I. G. A.; forceps et céphalotripsie; 78 h. et demie de travail; poids de l'enfant, 1.300. Mère en bon état.

2° Primipare; diam. S. S. P. 0.088; grossesse de 7 mois; sommet; crâniotomie et céphalotripsie; travail de 48 h.; poids de l'enfant, 1.800; métro-péritonite. Sortie de la malade presque mourante.

3° Multipare (1 accouchement avec forceps); diam. S. S. P. 0.085; grossesse de 7 mois et demi; épaule gauche C. I. D. A.; travail de 54 h. et demie; poids de l'enfant, 1.880 (d'abord version céphalique par pressions extérieures, puis application de forceps et extraction avec la pince de Simpson). Mère morte d'infection purulente; fille mort-née.

Donc, 1 mère vivante et 1 mourante sur 3, et 3 enfants morts sur 3.

QUATRIÈME CATÉGORIE (2 CAS).

Diamètre sacro-sous-pubien de 0.07 jusqu'à 0.08 exclusivement, ou diamètre sacro-pubien de 0.06 à 0.07

2 enfants morts et 1 mère morte.

1° Primipare; diam. S. S. P. 0.078; grossesse de 7 mois et demi; accouchement prématuré artificiel par le dilatateur de M. Tarnier; incisions à l'orifice utérin; forceps, crâniotomie, céphalotripsie et version pelvienne. Mort de la femme; 80 h. de travail.

2° Primipare; diam. S. S. P. 0.075; grossesse de 9 mois; sommet, O. I. G. A.; forceps, crâniotomie; 36 h. de travail; poids de l'enfant, 3.100. Mère en bon état.

CINQUIÈME CATÉGORIE (3 cas).

Diamètre sacro-sous-pubien de 0.06 jusqu'à 0.07 exclusivement, ou diamètre sacro-pubien de 0.05 à 0.06.

3 enfants morts et 1 mère morte.

1° Primipare; diam. S. S. P. 0.065; grossesse de 7 mois; accouchement prématuré artificiel par le dilatateur de M. Tarnier; incisions à l'orifice utérin; forceps au détroit supérieur; 46 h. de travail; poids de l'enfant, 2.350. Résultat final : enfant mort, mère vivante.

2° et 3°, terminés par crâniotomie et céphalotripsie : l'une des femmes primipare, l'autre multipare; l'une à 9 mois, l'autre à 8; l'une, sommet, O. I. D. T.; l'autre, O. I. D. P.; l'une, 19 h. et demie de travail; l'autre, 2 jours; poids de l'enfant : d'une part, 1.950, de l'autre, 2.780. Dans le premier cas, femme vivante; dans le deuxième, morte.

SIXIÈME CATÉGORIE.

Diamètre sacro-sous-pubien de 0.05, ou diamètre sacro-pubien de 0.04 (1 cas).

Femme de 32 ans, primipare, rachitique (ostéomalacie); diam. S. S. P, 0.05; grossesse de 9 mois; opération césarienne. Morte 35 h. après l'opération; enfant vivant.

SEPTIÈME CATÉGORIE.

Rétrécissements par obstruction (2 cas).

Deux multipares, à terme, O. I. G. A.; poids moyen de l'enfant, 3.500. Dans le premier cas, le travail a duré 6 h.; dans le deuxième, 14 h. Dans le premier cas, terminaison spontanée; dans le deuxième, terminaison par le forceps. Résultat final : excellent dans les deux cas pour la mère et pour l'enfant.

HUITIÈME CATÉGORIE.

Bassins dont le degré de rétrécissement n'est point indiqué (53 cas).

Accouchements terminés spontanément (34 *cas*).

10 enfants morts (29.40 p. 100) et 4 mères mortes (11.76 p. 100).

34 terminés spontanément.

10 primipares.
24 multipares.

2, dont une est accouchée à 6 mois, l'autre à 5 mois et demi. 32 entre 8 et 9 mois.

7 O. I. D. P.
1 M. I. D. P.
3 Sacro I. G. A.
23 O. I. G. A.

Poids moyen de l'enfant, 2.600.

Durée moyenne du travail, 10 h.

23 mères et enfants en bon état.

Dans un cas tous les diamètres étaient rétrécis; l'accouchement dura 4 h., avec O. I. G A.

Dans un cas d'accouchement gémellaire (un venu par le sommet, l'autre par le siége), la mère et les enfants sortirent en bon état; le travail, 8 h. et demie.

3 mères mortes et enfants morts.

Dans un cas la mère est morte de scarlatine avant l'accouchement; chez elle le bassin était vicié dans tous ses diamètres; O. I. G. A.

Dans un autre la mère est morte de péritonite, après un travail de 21 h.; O. I. G. A.

Dans le troisième il y avait O. I. D. P. et 16 h. de travail; l'enfant pesait 2.070 et la mère était au huitième mois.

7 mères vivantes et enfants morts.

Dans un cas il y avait présentation du siége, S. I. G. A., et procidence du cordon. Le travail avait duré 5 h. et demie; la grossesse était de 7 mois et demi; le poids de l'enfant 1.050.

Dans un autre il y avait aussi présentation du siége, S. I. G. A.; la grossesse était de 6 mois.

Dans un autre il y avait procidence du cordon et O. I. D. P., et le travail avait duré 15 h. et demie.

1 mère morte et enfant vivant.

La mère mourut de péritonite quelques jours après.

Cas terminés par le forceps (16 *cas*).

13 enfants morts (75 p. 100) et 3 mères mortes (18.75 p. 100).

16 terminés par forceps.

11 primipares.
5 multipares.

12 à terme.
4 à 7 mois et demi et 8 mois.

5 O. I. D. P.
11 O. I. G. A.

Poids moyen de l'enfant, 2.800.

Durée moyenne du travail, 20 h.

- 2 mères mortes et enfants morts.
  - Une avait eu O. I. G. A. et 54 h. de travail. Péritonite.
  - Une autre O. I. G. A, travail de 10 h. et demie. Cause de mort (?).
- 10 mères vivantes et enfants morts.
  - Dans un cas la mère avait eu une rupt. de la cloison recto-vaginale; le travail avait duré 18 h.
  - Dans un 2e, O. I. G. A., il y avait eu procidence du cordon et 22 h. de travail.
  - Dans un 3e, O. I. D. P., il y avait procidence de l'avant-bras et 13 h et demie de travail.
  - Dans un 4e, O. I. D. P., il y avait eu 31 h. de travail.
  - Dans un 5e, O. I. D. P., il y avait eu 25 h. de travail.
  - Dans un 6e, O. I. G. A.. procidence du cordon et travail de 28 h.
- 3 mères vivantes et enfants vivants.
  - 1 était O. I. D. P., avec 31 h. de travail.
  - 1 était O. I. G. A., avec procidence du bras et 24 h. de travail.
  - 1 autre avec procidence du cordon, O. I. G. A., et 11 h. de travail.
- 1 mère morte et enfant vivant.
  - Le travail avait duré 26 h. : O. I. D. P. On avait été obligé de faire des incisions à l'orifice. Des eschares vulvaires et une péritonite avaient succédé à l'opération.

2 cas terminés par céphalotripsie et version pelvienne. 1 mère morte, 1 mère vivante.

- 1 cas où la mère sortit guérie, mais après phlegmon et érysipèle.
- 1 cas où le travail avait duré 42 h. et où la mère mourut de péritonite par rupture de l'utérus.

O. I. G. A., à terme.

1 cas avec forceps et céphalotripsie (à terme). Mère vivante.

- Durée du travail, 24 h.
- Mère sortie en bon état.

O. I. D. P.

Troisième Partie

ANALYSE DES FAITS DE CHAQUE CATÉGORIE DE RÉTRÉCISSEMENTS.

I.— Rétrécissements de 0,10 de diamètre sacro-sous-pubien ou de 0,09 de diamétre sacro-pubien et au-dessus.

Cette catégorie comprend 191 cas où l'accouchement s'est terminé *spontanément*. La durée moyenne du travail a été de 16 heures, et le poids moyen de l'enfant, 2,700 grammes. 109 femmes étaient multipares, et 82 primipares. Ce qui frappe au premier abord, c'est cette prédominance notable des multipares sur les primipares. Autre remarque importante : plusieurs de ces multipares avaient eu déjà des accouchements artificiels. D'après ces données, il serait donc permis de conclure que, dans un cas de rétrécissement léger du bassin, la terminaison spontanée de l'accouchement sera d'autant plus facile que la femme aura déjà eu des enfants. Ce qui est parfaitement admissible; car chez les multipares, le col, à cause de sa souplesse, se dilate plus aisément, et de plus, le tissu utérin étant plus développé, il est probable qu'il a une action plus énergique chez les multipares que chez les primipares.

Le nombre des positions O. I. D. P. est assez considérable, 47 sur 191. Cependant cette position augmente toujours les difficultés du travail : sa fréquence est difficile à expliquer; nous aurons, du reste, l'occasion de la constater dans les autres séries de rétrécissements.

Ces 191 cas ont donné 29 enfants morts ou 15,83 p. 100, et 29 mères mortes ou 15,83 p. 100. Il est bien singulier que la mortalité des enfants et celle des mères soient dans la même proportion.

La mort de l'enfant peut être attribuée souvent à une trop longue durée du travail, dépassant vingt-cinq et trente heures. Dans plusieurs cas aussi, en même temps qu'un travail prolongé, il y a eu procidence du cordon ou enroulement du cordon autour du cou. Cette fréquence de la procidence du cordon, que nous rencontrerons encore dans les autres séries de rétrécissements, a été notée de même dans la thèse de M. Stanesco. On peut se l'expliquer assez facilement par cette considération, que la tête ne remplissant pas exactement le détroit supérieur, à cause de l'étroitesse du bassin, laisse un vide qui donne passage au cordon. Il est bon d'être prévenu de la fréquence de cette complication, afin qu'en pareil cas, on s'empresse d'y remédier d'une façon ou de l'autre.

La mort de la femme a été causée, dans le plus grand nombre des cas, par des métro-péritonites dépendant de l'état puerpéral, accidents qui, dans

une maternité où il y a toujours un peu d'encombrement, tiennent souvent à des influences épidémiques. Aussi la valeur générale de notre statistique est-elle modifiée par cette circonstance, et les résultats malheureux doivent-ils être atténués par ces conditions, qui sont tout à fait indépendantes du mode de terminaison de l'accouchement. Cette remarque s'adresse aussi, par anticipation, aux autres catégories de rétrécissements, et principalement aux séries de faits où des opérations obstétricales ont été pratiquées.

En effet, dans les 15 cas où nous avons noté la mort de la mère correspondant à la vie de l'enfant, la mort a été causée 6 fois par métro-péritonite, 1 fois par phlébite, 1 fois par infection purulente et 1 fois par fièvre typhoïde. Dans un seul cas, la durée du travail a été au-dessus de la moyenne, 39 h. Tandis que parmi les 27 cas où la vie de la mère coïncide avec la mort de l'enfant, que les enfants soient mort-nés, ou qu'ils soient morts peu de temps après leur naissance, la durée du travail a le plus souvent dépassé la moyenne. Ainsi, par deux fois le travail a atteint 51 h. et 64 h.

Dans les deux cas où le résultat a été funeste pour la mère, en même temps que pour l'enfant, nous avons eu à noter encore, comme cause de mort : du côté de la mère, péritonite et phlébite utérine; du côté de l'enfant, travail de 30 h., pro-

cidence du cordon et enroulement du cordon autour du cou.

Des résultats des accouchements spontanés de la premièr catégorie, nous retirons un enseignement utile, c'est qu'en présence d'*un rétrécissement de* 0,10 *de diamètre sacro sous-pubien* et au-dessus, le praticien est en droit d'espérer un accouchement spontané, heureux pour la mère et pour l'enfant, mais à la condition que le travail ne dépasse pas de trop le chiffre moyen 16 h., et qu'il ait bien soin de remédier à la procidence du cordon dans le cas où elle existerait. Ajoutons que les chances de succès seront encore plus nombreuses s'il s'agit d'une multipare.

Dans 34 cas, la terminaison de l'accouchement a été opéré par le *forceps*. Ici, la duree moyenne du travail a été de 30 h., tandis que précédemment elle était de 16 h. Le poids moyen de l'enfant, 3,000, est aussi plus considérable que pour les accouchements spontanés. 24 femmes étaient primipares, 10 seulement multipares : proportion tout à fait inverse de celle que nous avons notée plus haut. Deux seulement des multipares avaient été déjà accouchées artificiellement. Cette donnée concorde donc parfaitement avec la réflexion que nous faisions tout récemment au sujet de la facilité plus grande d'un deuxième ou troisième accouchement dans un cas de rétrécissement léger du bassin. Nous remarquons encore un certain nombre de droites

postérieures, 10 sur 34, et une seule face.

Ces 34 cas ont donné 24 enfants morts (70,58 p. 100), et 13 femmes mortes (38,88 p. 100). Ces résultats ne sont pas brillants, surtout pour l'enfant; cependant, si on suit avec un peu d'attention notre tableau, on peut s'expliquer jusqu'à un certain point ces insuccès.

Dans 8 cas seulement, la mère et l'enfant sont sortis en bon état de l'hôpital.

2 fois la vie de l'enfant correspond à la mort de la mère, qui a été causée par métro-péritonite.

Dans 13 cas, la vie de la mère coïncide avec la mort de l'enfant. Ici encore, comme cause de mort, nous notons une trop longue durée du travail. Ainsi deux fois il a été de 29 h., et bien que nous ayons trouvé 30 h. comme moyenne, nous ne pouvons nous empêcher de considérer ce travail comme coupable de la mort de l'enfant. Une troisième fois il était de 88 h.; une quatrième, de 115 h., en même temps que la position était O. I. D. P.; une cinquième, c'était un siége; une sixième, le travail avait duré 36 h., et la présentation était une face (M. I. D. P.). Dans ce dernier cas, il s'est produit un accident assez rare, une disjonction de la symphyse pubienne, qui s'est faite sous l'influence des tractions exercées sur le forceps. Cette disjonction s'annonça, pendant l'opération, par un craquement sec qui fut entendu par tous les assistants. Consécutivement, il y eut une arthrite suppurée des sym-

physes sacro-iliaque et pubienne; et cependant la femme guérit plusieurs mois après.

Dans 11 cas, la mère et l'enfant sont morts : Les mères sont mortes de péritonite, métro-péritonite et de fièvre puerpérale. Comme causes de la mort des enfants, nous avons pu noter dans quelques cas : circulaires autour du cou, pacchyméningite et travail prolongé.

Ces résultats malheureux tiennent encore à ce que, dans certains cas, au moment où les femmes entrent à l'hôpital, le travail est déjà commencé depuis longtemps, et l'enfant ne donne plus signe de vie.

Nous pouvons donc conclure qu'avec un rétrécissement même léger du bassin, il ne faut pas attendre trop longtemps la terminaison spontanée de l'accouchement, puisque la durée moyenne du travail a été de 16 h. pour les accouchements terminés par le forceps. Nous pouvons retirer de nos faits l'indication d'appliquer le forceps sitôt que le travail dépasse 22 ou 23 h. Ce n'est point une règle fixe que nous prétendons établir; car nous savons qu'en pareille circonstance la conduite à tenir varie suivant un grand nombre de conditions.

Parmi les rétrécissements de cette catégorie, qui ont demandé l'application du forceps, il en est quatre pour lesquels M. Tarnier ou M. de Saint-Germain ont fait des tractions avec les mouffles.

Les résultats obtenus dans ces 4 cas, ont été

assez beaux : les 4 femmes ont vécu, et deux enfants sont morts. Mais de ces deux enfants, l'un est mort de convulsions le 3e jour, et l'autre de faiblesse congénitale, le lendemain de sa naissance. En sorte qu'on ne doit pas imputer ces deux morts aux tractions opérées avec les mouffles. Cette méthode, que M. Tarnier n'a pas encore achevé d'expérimenter, nous semble présenter un triple avantage : 1° d'amener une légère réduction de la tête fœtale; 2° de laisser l'accoucheur parfaitement maître de la force qu'il emploie, puisqu'il a la faculté de la mesurer à chaque instant.

3° De produire un travail plus considérable, que celui qui serait produit par la même force, mais provenant de tractions manuelles. Car les forces qui se développent dans les tractions opérées à l'aide des mouffles, agissant d'une manière continue, sans secousse et dans le même sens, s'ajoutent et ne se neutralisent jamais.

Seulement il faut bien avoir soin de ne pas employer une force trop considérable, car alors le procédé deviendrait nuisible. Ainsi dans les 4 cas que nous venons de citer, on n'a jamais dépassé 45 kilog., et même on n'est arrivé à ce chiffre que graduellement, en commençant par 20 ou 25. Dans les trois premiers les tractions n'ont été continuées que 2 ou 3 minutes, et ce temps a suffi pour faire descendre la tête du détroit supérieur jusqu'à la vulve. Dans le dernier les tractions ont été plus

longues, 2 minutes et 6 minutes à deux reprises différentes, en tout 8 minutes. Il est vrai que l'accouchement a été très-laborieux, puisqu'auparavant deux séances de forceps seul avaient été complétement infructueuses.

9 cas ont été terminés par la version pelvienne; 4 femmes étaient primipares, 5 multipares. Comme présentations, 5 épaules, 3 sommets et 1 face. La durée moyenne du travail a été de 19 heures, et le poids moyen des enfants, 2,800 grammes.

Les résultats ont été répartis ainsi :

5 cas où l'enfant est mort, et où la mère a survécu.

1 cas où la mère et l'enfant sont morts; 3 où la mère et l'enfant ont vécu.

Ce qui nous fait un total de 6 enfants morts, c'est-à-dire 66,66 p. 100, et 1 mère morte, c'est-à-dire 11,11 p. 100.

Ces chiffres parlent, et prouvent suffisamment combien est mauvaise la version dans les cas de rétrécissement du bassin. Aussi nous rangeons-nous à l'avis des accoucheurs, qui bannissent absolument cette opération, lorsqu'il s'agit d'un bassin vicié.

7 fois l'accouchement s'est terminé par la réduction de la tête de l'enfant; soit par la craniotomie et la céphalotripsie, soit par la version combinée à la crâniotomie et à la céphalotripsie.

Ces 7 cas ont donné 3 femmes mortes, c'est-à-dire 42,85 p. 100.

Dans un seul cas on a pratiqué immédiatement la céphalotripsie. Mais il s'est produit des lésions de l'utérus et du vagin assez graves et consécutivement une péritonite qui a entraîné la mort de la femme. D'ailleurs le travail avait duré 61 heures, ce qui est une très-mauvaise condition pour le succès de l'opération.

Dans 4 cas la céphalotripsie a été précédée de la perforation du crâne ou crâniotomie. 2 fois même l'application du forceps avait été d'abord essayée, mais en vain.

Ces 4 cas ont donné 3 guérisons et 1 mort, c'est-à-dire 25 morts p. 100, ce qui est un très-beau résultat. Parmi ces 4 cas se trouve une présentation de la face, avec cinquante et une heure de travail, et cependant le résultat final a été très-bon, puisque la femme a survécu.

2 fois on a d'abord tenté la terminaison de l'accouchement par le forceps, mais sans succès. La crâniotomie et la céphalotripsie ont été ensuite pratiquées, et en définitive l'extraction de l'enfant a été opérée par la version pelvienne.

Comme résultat final, nous avons une mort et une guérison.

Nous ne pouvons point juger cette opération ou plutôt cette combinaison d'opérations d'après deux cas seulement. Mais si l'on réfléchit un peu à la gravité des lésions qui peuvent se produire du côté de l'utérus et du vagin, pendant l'évolution que l'on

fait subir au fœtus pour amener les pieds au-dehors, on ne peut s'empêcher de blâmer ce procédé opératoire. Nous verrons, du reste, par la suite, quelles conséquences funestes a entraînées ce *modus faciendi*.

Dans un cas, l'accouchement a été provoqué par le dilatateur de M. Tarnier, au huitième mois de la grossesse.

C'était une multipare, qui avait déjà subi un accouchement prématuré artificiel. L'enfant s'est présenté par le siége, son poids était 22 80, la durée du travail, dix-sept heures et demie. La mère et l'enfant ont survécu.

En général, pour un rétrécissement de 0^m, 10, l'accouchement prématuré artificiel n'est point indiqué. Dans le cas qui nous occupe, il y avait eu antérieurement un accouchement prématuré artificiel, c'est certainement ce qui a engagé l'accoucheur à prendre cette détermination. Le résultat a été, du reste, aussi beau que possible.

§ II.—Rétrécissements de 0,09 de diamètre sacro-sous-pubien ou 0,08 de diamètre sacro-pubien, jusqu'à 0,10 ou 0,09 exclusivement.

Dans cette catégorie, 40 accouchements ont été terminés spontanément. La durée moyenne du travail a été de 13 heures, le poids moyen de l'enfant : 2,800. Comme dans la première catégorie,

nous trouvons encore un plus grand nombre de multipares que de primipares ; 23 multipares et 17 primipares.

Sur ces 40 cas, nous avons relevé 11 positions, O. I. D. P.

Comme résultat final, nous trouvons 14 enfants morts, c'est-à-dire 35 0/0, et 5 mères mortes, c'est-à-dire 12,25 0/0.

Quelles ont été les causes de mort, soit de la mère, soit de l'enfant?

D'après le mode de répartition des résultats que nous avons suivi dans nos tableaux, nous voyons que trois fois la vie de l'enfant correspond à la mort de la mère. Celle-ci est toujours survenue à la suite de métro-péritonite.

Douze fois la vie de la mère correspond à la mort de l'enfant. Celle-ci a été causée, soit par un travail de trop longue durée, dépassant de beaucoup la moyenne, soit par une procidence ou un enroulement du cordon autour du cou de l'enfant. Aussi doit-on s'empresser d'intervenir toutes les fois que le travail se prolonge, et dépasse une limite que nous préciserons plus tard. Deux fois l'enfant et la mère ont succombé : les mères sont mortes de péritonite ; la cause de la mort des enfants est inconnue.

Vingt-trois fois la mère et l'enfant sont sortis en bon état.

Dans 16 cas, l'accouchement s'est terminé par le

forceps. 13 femmes étaient primipares, 3 multipares. Toutes les présentations étaient des sommets ; le plus grand nombre étaient des positions O. I. G. A. 4 étaient en O. I. D. P. La durée moyenne du travail a été de 26 heures, et le poids moyen des enfants, 3,000. Tandis que pour les accouchements spontanés, la durée moyenne du travail était de treize heures, et le poids moyen de l'enfant 2,800. Cette différence, dans le poids moyen de l'enfant, nous explique très-bien comment avec le même degré de rétrécissement, l'accouchement s'est terminé d'une part spontanément, et d'autre part artificiellement. De plus, nous pouvons déjà, par anticipation, poser cette conclusion, que le plus souvent avec un rétrécissement de 0,09 de diamètre sacro-sous-pubien, ou de 0,08 de diamètre sacro-pubien, lorsque le travail dépassera vingt heures ou vingt-deux heures ; on devra appliquer le forceps.

Ces 16 cas ont donné 8 enfants morts (50 p. 100), et 6 mères mortes (37,50 p. 100), répartis de la façon suivante :

Six fois la mère et l'enfant ont vécu.

Quatre fois la vie de la mère correspond à la mort de l'enfant. Trois fois on peut attribuer cette mort à un travail prolongé.

Deux fois la vie de l'enfant correspond à la mort de la mère, qui a été causée par infection purulente et par péritonite. Dans ces deux cas, la durée du travail avait aussi dépassé la moyenne.

Quatre fois la mère et l'enfant ont succombé.

Ici, du côté de l'enfant, les causes de mort ne présentent rien de particulier, si ce n'est une seule fois un travail de trente-deux heures. Du côté de la mère, la mort a été causée trois fois par des accidents puerpéraux, et une fois par une rupture de l'utérus survenue pendant l'opération.

D'après nos relevés, l'application du forceps a donc été plus funeste pour l'enfant que pour la mère. Il en a été de même dans la première catégorie de rétrécissements. Nous pouvons encore faire appel aux circonstances atténuantes, que nous avons invoquées pour ces derniers.

Dans quatre cas, l'accouchement a été terminé par la version. Il n'y avait que des présentations de l'épaule, deux droites et deux gauches. La durée moyenne du travail a été de 12 heures, et le poids moyen de l'enfant 2,600.

Ces quatre cas ont donné trois enfants morts ou 75 p. 100, et deux mères mortes ou 50 p. 100. C'est un résultat bien mauvais pour l'enfant; mais il n'y avait pas moyen de faire autrement, puisque les quatre cas étaient des présentations de l'épaule.

Dans cinq cas on a fait d'abord, sans succès, l'application de forceps, et l'on a terminé l'accouchement par la craniotomie, suivie de la céphalotripsie. Ces cinq cas ont donné, comme résultat final, trois mères mortes ou 60 p. 100. La mort a été cau-

sée par des accidents puerpéraux ; la durée moyenne du travail a été de 29 heures.

Dans quatre cas, la terminaison de l'accouchement a été opérée par la craniotomie et la céphalotripsie. Deux mères sont mortes de péritonite, et deux ont vécu. Dans ces deux cas suivis de morts, il y avait procidence du cordon. La durée moyenne du travail a été de 24 heures.

Dans un cas, M. Tarnier a terminé l'accouchechement par l'application du forceps scie de Van Huevel. Ce fait mérite d'attirer l'attention ; aussi en publierons-nous l'observation *in extenso*.

Bassin vicié par rachitisme. — Diamètre sacro-sous-pubien de 9 centimètres. — Présentation du sommet. — Application du forceps scie de Van Huevel.

(OBSERVATION COMMUNIQUÉE PAR M. TARNIER.)

La nommée Flandrin, âgée de 25 ans, primipare, entra à l'hôpital de la Maternité le 3 avril 1870».

Cette femme, d'une très-petite stature, a toute l'apparence d'une petite fille de 12 ans, et n'offre que de faibles traces de rachitisme. Les crêtes sibiales sont légèrement saillantes; les tibias ne sont pas incurvés.

La hauteur totale de la femme est de 1 m. 32. Cependant son bassin, mesuré avec le doigt, a 0,09 d'étendue dans son diamètre sacro-sous-pubien, et il semble que l'angle sacro-vertébral soit plus incliné à gauche qu'à droite, ou que la moitié gauche soit moins développée que la droite.

Sa santé est bonne; la grossesse l'a à peine troublée par quelques vomissements et un peu de constipation.

Cette femme est près du terme de sa grossesse; elle a eu ses dernières règles le 4 juillet 1869. Son abdomen est assez développé, tendu; aucune partie fœtale n'est accessible par le vagin; mais la place où l'on entend les battements du cœur et certaine sensation perçue à l'hypogastre font présumer que l'enfant se présente par la tête.

Le col est complétement effacé, l'accouchement paraît imminent.

Le 8 avril, à 11 heures 1/2 du soir, elle ressentit les premières douleurs. Bien qu'elles se fissent sentir sur un rythme régulier et avec une certaine énergie, l'orifice utérin n'avait encore acquis, le 10 à 9 heures du matin, que l'étendue d'une pièce de 2 fr. environ. Il y avait cependant 34 heures que le travail était commencé.

Les membranes s'étaient conservées entières et bombaient au-dessus de l'orifice, mais ne s'y engageaient pas. Au contraire, il restait toujours entre elles et l'orifice un espace dans lequel on pouvait promener le doigt. La tête de l'enfant occupait la partie inférieure de l'utérus, mais contenue dans les membranes et environnée d'eau, elle n'y exerçait aucune pression. Par suite de la longueur du travail, la malade était devenue impatiente, et quand M. Tarnier vint de nouveau auprès d'elle à 9 heures 1/2 du matin, le 10 avril, elle le supplia de la délivrer.

Après s'être assuré de l'état relaté plus haut, il expérimenta la souplesse de l'orifice, et exerçant avec les doigts sur son contour des efforts méthodiques et répétés, il augmenta son peu de dilatation. Puis il rompit les membranes. L'eau s'écoula, la tête fœtale s'abaissa, mais retenue par le détroit abdominal, elle resta en ce point et la dilatation ne fit plus de progrès.

L'enfant présentait le sommet, l'occiput en arrière, le front presque directement en avant.

Après une attente vaine d'une demi-heure, M. Tarnier se résolut à une application de forceps. Avec beaucoup de lenteur et de ménagement, il introduisit successivement chacune des branches du forceps de Van Huevel (forceps-scie). L'articulation des branches se fit sans trop de difficulté; mais la tension de l'orifice devint extrême entre les deux cuillers. Malgré les efforts de traction, et ils furent considérables, la tête ne put être entraînée au-dessous du détroit.

Toutes ces tentatives devenant infructueuses, M. Tarnier fit jouer la scie du forceps et 4 minutes suffirent pour partager la tête en deux de bas en haut dans le sens de son diamètre vertical.

Cette opération terminée, il serra les manches du forceps : les cuillers se rapprochèrent, et du sang noir provenant des vaisseaux intercrâmens, puis la masse cérébrale, s'échappèrent des parties génitales.

La tête se vida ; mais en se vidant elle s'affaissa, et n'offrit plus à l'instrument le point d'appui nécessaire pour son entraînement. Elle resta dans l'utérus, et les pressions successives ne parvinrent qu'à faire glisser l'une sur l'autre les deux moitiés de la tête. Comme celles-ci n'adhéraient plus que par des tissus mous et élastiques, la portion qui se trouvait dégagée de l'instrument, moitié frontale, put remonter, et celle qui était retenue par les cuillers, moitié occipitale, en rapport avec le promontoire, put s'abaisser et franchir le col utérin. Mais comme elle était évasée, offrant de toutes parts des angles et des aspérites, on eut beaucoup de peine à garantir les parties génitales. Enfin on ne put terminer l'accouchement avec le forceps-scie. M. Tarnier fut obligé de le retirer et d'employer le crânioclaste et les doigts, tantôt successivement, tantôt simultanément. Puis passant un lacs autour d'une masse musculaire que l'on avait enfin attirée au dehors et dans laquelle se trouvait le cou, par des tractions exercées sur ce lacs il put amener le reste de la tête. Ce reste était la seconde moitié, celle qui avait échappé à la pression de l'instrument, et elle arriva intacte. Le tronc suivit la tête sans grande difficulté.

Il est difficile de se rendre un compte bien exact de la fin de cet accouchement. A partir de la division de la tête, tout fut imprévu et irrégulier.

Des efforts nombreux furent faits sans autre règle précise que celle d'extraire la tête sans blesser la mère. Quand on eut les pièces en masse et que l'on put les examiner à loisir, on vit que la tête fœtale avait été partagée en deux moitiés presqu'égales, l'une occipitale, l'autre frontale, à très-peu de chose près dans le diamètre vertical. L'une des deux, la postérieure ou occipitale était fracassée; l'autre, l'antérieure, intacte. La division s'étendait parfaitement nette, du sommet à la base du crâne,

La section des os du crâne a été faite dans le sens transversal, un peu obliquement de gauche à droite.

La section est parfaitement nette dans tous les points. Elle aboutit à la base du crâne : du côté droit, sur le temporal, qui a été sectionné à peu près suivant le bord supérieur de la portion pétrée; du côte gauche,

sur la branche montante du maxillaire inférieur, qui a commencé à être divisée dans l'échancrure qui sépare le condyle de l'apophyse coronoïde ; sur la base, la section a porté sur la gouttière basilaire immédiatement en arrière de la selle turcique. Des deux portions du crâne ainsi divisé, l'une, la frontale, a été extraite dans toute son intégrité ; l'autre, au contraire, restée saisie dans les branches de forceps, n'a pu être extraite que par morceaux, les os qui la composent ayant été brisés par la compression en plusieurs morceaux.

La malade cependant a eu des suites de couches à peu près normales, et est sortie de l'hôpital une quinzaine de jours après, en bon état.

Van Huevel, pour éviter les défauts du céphalotribe, qui allonge tous les diamètres de la tête, autre que celui qui a été saisi entre les cuillers, inventa le forceps-scie. Avec cet instrument, on divise la tête de bas en haut entre les cuillers d'un forceps, de manière à pouvoir en retirer séparément les morceaux sans aucune violence ; ceux-ci se détacheraient à la moindre traction et n'occasionneraient ni blessure, ni contusion des organes génitaux. Mais un grave reproche qui s'adresse à lui, c'est qu'il est insuffisant comme moyen d'extraction et qu'on est souvent obligé d'employer les pinces à os, malgré tous les défauts qu'elles présentent (M. Tarnier). C'est du reste l'inconvénient qui s'est présenté dans notre cas, puisque, une fois la section de la tête faite, on a été obligé d'en retirer les morceaux, soit avec les doigts, soit avec les pinces à os. Aussi l'extraction de la tête fut-elle très-laborieuse et eut-on toutes les peines du monde à ne pas déchirer les parties génitales.

Pour obvier à ces inconvénients, M. Tarnier vient de faire fabriquer chez Mathieu un forceps-scie, qui possède deux scies à chaîne et deux lames conductrices. Les scies à chaîne passent dans une gouttière creusée sur les bords de chaque cuiller du forceps.

Avec cet instrument, on pourra séparer entièrement une tranche médiane et transversale de la tête fœtale et par suite en diminuer d'autant le volume. Aussi pourra-t-on terminer l'extraction sans être obligé de recourir au crânioclaste, et partant sans léser les voies génitales.

Dans 8 cas, après des tentatives infructueuses d'application de forceps, on a réduit le volume de la tête par la crâniotomie et la céphalotripsie, et enfin on a terminé l'accouchement par la version pelvienne : 2 femmes seulement ont vécu ; les 6 autres ont succombé à des péritonites et métro-péritonites consécutives, le plus souvent à des lésions de l'utérus et du vagin.

Dans notre première catégorie, nous n'avions pas assez de cas pour juger ce procédé opératoire qui consiste à terminer l'accouchement par la version pelvienne, alors qu'on a déjà pratiqué la céphalotripsie. Mais ici, il n'en est plus de même. 6 morts sur 8, c'est un chiffre assez important pour qu'on en tienne compte. Il démontre suffisamment les inconvénients et les conséquences fâcheuses qu'entraîne cette opération, quelque habile que soit la main par

laquelle elle est faite. Une tête broyée par le céphalotribe offre nécessairement des fragments plus ou moins saillants, plus ou moins aigus, qui, dans l'évolution opérée par la version pelvienne, ne peuvent que contondre, déchirer et même rompre les parois utérines et vaginales.

Nous avons en effet observé parmi les causes de mort un certain nombre de ruptures de l'utérus, qui nous paraissent plutôt le resultat du frottement des saillies osseuses contre les parois de la matrice; que des manœuvres nécessaires pour aller à la recherche des pieds dans une cavité utérine presque entièrement vide de ses eaux.

Nous pouvons donc, dès à présent, poser en principe; qu'après avoir réduit d'une façon quelconque le volume de la tête de l'enfant, on ne doit jamais recourir à la version pelvienne pour achever l'extraction.

Trois fois on a fait l'accouchement prématuré artificiel à l'aide du dilatateur de M. Tarnier. Ces 3 cas ont donné 3 enfants morts et une mère morte.

Des trois femmes, l'une était multipare, les deux autres primipares. Chez la première arrivée au septième mois de la grossesse, l'enfant se présentait par le siége et le travail a duré dix-sept heures. Chez la deuxième, arrivée au huitième mois, l'enfant se présentait par le sommet, en position O. I. D. P.; le travail a duré soixante-quatorze heures,

et l'accouchement a été terminé par le forceps. La troisième était aussi au huitième mois de la grossesse, la présentation était encore un siége, et le travail a duré vingt-trois heures.

Comme nous l'avons déjà dit les trois enfants sont morts; les deux premières femmes ont guéri, et la troisième est morte de métro-péritonite.

La mort de l'enfant dans le deuxième cas peut être attribuée à la trop longue durée du travail. Il n'en est plus de même pour les deux autres. La cause de la mort ne saurait être mise que sur le compte de l'accouchement prématuré lui-même.

§ III.—Rétrécissements de 0,08 de diamètre sacro-sous-pubien ou de 0,07 de diamètre sacro-pubien jusqu'à [0,09 ou 0,08 exclusivement.

Nous n'avons pu recueillir que douze de ces rétrécissements.

Dans deux seulement l'accouchement a été spontané. Contrairement à ce que nous avons constaté dans les deux premières catégories, les deux femmes étaient primipares.

Les deux présentations étaient des sommets en O. I. D. P.; la durée moyenne du travail a été de 16 heures; le poids moyen de l'enfant était de 20,10, et le terme de la grossesse, huit mois. Ce vo-

lume peu considérable de l'enfant nous explique jusqu'à un certain point comment l'accouchement a pu se terminer spontanément. Grâce au peu de durée du travail, la mère et l'enfant ont vécu.

Une seule fois l'accouchement a été terminé par le forceps : c'était une primipare, dont le degré du rétrécissement était le même que dans les deux cas précédents (D. S. S. P. 0,085). La grossesse était de huit mois et demi ; l'enfant se présentait par le sommet en O, I. G. A. ; son poids était de 2630. Le travail se prolongeant, l'accoucheur a eu parfaitement raison d'intervenir. Le résultat a été très-bon ; la mère et l'enfant ont vécu.

Quatre fois la terminaison de l'accouchement a été terminé par la crâniotomie et la céphalotripsie, après des essais infructueux d'application de forceps. Une seule fois le rétrécissement est de 0,08 ; dans les trois autres cas, il est de 0,88 ou 0,89.

Une femme est morte de péritonite à la suite de rupture de l'utérus, et après trente et une heures de travail.

Trois sont sorties ne l'hôpital en bon état : chez l'une d'elles on avait déjà constaté la mort de l'enfant avant l'accouchement. Aussi le chirurgien s'est-il empressé de réduire le volume de la tête, du moment que le forceps ne donnait aucun résultat. En agissant ainsi, la durée du travail n'a pas dépassé vingt-trois heures.

La deuxième avait eu déjà six accouchements qui

s'étaient terminés artificiellement. Cette femme était arrivée au terme de huit mois et demi ; l'enfant se présentait par le siége ; son poids était de 2,320 gr. La durée du travail n'a pas dépassé la moyenne.

Chez la troisième, primipare, à terme, le travail a duré trente-six heures. L'accouchement a été ici plus laborieux que dans les deux cas précédents. Car on a été obligé d'achever l'extraction de la tête à l'aide de forceps et du crochet aigu. — Cependant l'enfant ne pesait que 2,860 gr., sans cerveau, il est vrai. Mais la femme était primipare, et la présentation, un sommet en position, O. I. D. P. : deux conditions qui, en général, augmentent les difficultés d'un accouchement et qui, dans une certaine mesure, peuvent expliquer la terminaison pénible et laborieuse du cas actuel.

Dans un cas, l'accoucheur a pratiqué la crâniotomie et la céphalotripsie, sans application préalable de forceps. C'était, chez une primipare à terme, avec présentation du sommet compliquée de procidence du cordon. Malgré un travail de cinquante-sept heures et demie de durée, la femme a guéri. Le chirurgien avait été, du reste, engagé à procéder immédiatement à la réduction de la tête par cette circonstance que l'enfant était déjà mort au moment où le travail a commencé.

Dans un dernier cas, l'accouchement a été terminé par l'opération césarienne. La femme était primipare, âgée de 29 ans et à terme. — Le bassin

mesurait 0,08 dans son diamètre sacro-sous-pubien. L'enfant se présentait par le siége.

Le registre où j'ai recueilli ce fait, n'indique point les raisons qui ont pu déterminer l'accoucheur à pratiquer l'opération césarienne. Aussi ne me livrerai-je à aucun commentaire à ce sujet, admettant cependant qu'en général pour un rétrécissement de 0,08 de diamètre sacro-sous-pubien, l'opération césarienne n'est point indiquée. L'enfant a très bien vécu; mais la mère est morte de péritonite.

3 fois l'accouchement a été provoqué avant terme, à l'aide du dilatateur de M. Tarnier:

Les trois enfants sont morts; une femme est morte d'infection purulente, et une deuxième atteinte de métro-péritonite, est sortie de l'hôpital en très-mauvais état.

Deux femmes, primipares, étaient arrivées au septième mois de la grossesse; la troisième, multipare, avait une grossesse de 7 mois et demi. Le diamètre sacro-sous-pubien mesurait de 0,08 à 0,010.

Dans les deux premiers cas, on a été obligé d'en venir à la réduction de la tête du fœtus par la céphalotripsie seule, ou par la céphalotripsie précédée de la crâniotomie. Dans le dernier cas, où l'enfant se présentait par l'épaule, après avoir opéré la version céphalique, l'accoucheur a achevé l'extraction à l'aide du forceps et de la pince de Simpson. L'en-

fant est mort pendant l'opération. Le travail a toujours été très-long, de 60 h. en moyenne; le poids moyen de l'enfant était de 1,600 gr.

Dans ces trois cas, l'accouchement prématuré n'a procuré aucun avantage, puisque deux fois la réduction de la tête de l'enfant a été nécessaire, et qu'en troisième lieu, l'enfant est mort pendant le travail.

En présence de résultats aussi funestes pour l'enfant, ne pourrait-on se demander si, en pareille circonstance, il ne serait pas quelquefois préférable, pour sauvegarder la vie de la mère, de provoquer l'avortement plutôt que l'accouchement prématuré.

Cette réflexion ne nous est pas seulement inspirée par les cas que nous avons recueillis, mais encore par ceux que M. Stanesco a relevés dans les registres de la Clinique d'accouchement. Sur 42 cas, il a eu, en effet, 23 enfants morts et 10 mères mortes, c'est-à-dire plus de la moitié des enfants et le quart des mères. Toutefois, c'est une question bien difficile à résoudre et surtout d'une extrême délicatesse; aussi n'avons-nous point la prétention d'arriver à une solution décisive. Nous désirions seulement la mettre en relief, comptant sur l'expérience et le savoir de nos maîtres pour nous éclairer à ce sujet.

IV. — Rétrécissements de 0,07 de diamètre sacro-sous-pubien ou de 0,06 de diamètre sacro-pubien, jusqu'à 0,08 ou 0,07 exclusivement.

Dans cette catégorie, nous ne trouvons que deux cas. Pour les deux cas, après avoir essayé en vain de terminer l'accouchement par le forceps, on a réduit le volume de la tête, dans le premier cas par la crâniotomie et la céphalotripsie, et dans le second par la crâniotomie seule.

La première femme était une primipare, dont la grossesse n'avait point dépassé la moitié du septième mois, et chez laquelle l'accouchement a été provoqué à l'aide du dilatateur de M. Tarnier et d'une ou deux incisions pratiquées sur l'orifice utérin. L'extraction a été achevée par la version pelvienne, après un travail de 80 heures. La version et la longue durée du travail nous expliquent jusqu'à un certain point la mort de la femme.

La seconde était aussi primipare, mais à terme; le travail a duré 36 heures, et elle est sortie de l'hôpital en bon état.

V. — Rétrécissements de 0,06 de diamètre sacro-sous-pubien ou de 0,05 de diamètre sacro-pubien, jusqu'à 0,07 ou 0,06 exclusivement.

Dans cette catégorie, nous n'avons que trois cas. Pour l'un, on a provoqué l'accouchement au sep-

tième mois de la grossesse, à l'aide du dilatateur de M. Tarnier. Après un travail de 46 heures, l'extraction a été achevée par une application de forceps faite au détroit supérieur. L'enfant est mort, mais la mère est sortie de l'hôpital en bon état.

Dans les deux autres cas, la terminaison de l'accouchement a été opérée par la crâniotomie et la céphalotripsie. L'une des femmes a survécu, la seconde est morte. Il est vrai qu'au moment où cette dernière est entrée à l'hôpital, le travail durait déjà depuis longtemps. La durée totale du travail a été de deux jours, ce qui a bien pu contribuer à rendre le résultat funeste.

VI. — Rétrécissements de 0,05 de diamètre sacro-sous-pubien ou de 0,04 de diamètre sacro-pubien jusqu'à 0,06 ou 0,05 exclusivement.

Cette catégorie ne comprend qu'un seul cas. Le bassin était rétréci et vicié à ce point qu'il n'aurait laissé pénétrer dans sa cavité aucun instrument réducteur. Aussi M. Tarnier, d'accord en cela avec MM. Depaul, Blot, Guéniot et de Saint-Germain, se décida-t-il à faire l'opération césarienne.

Dans cette opération, M. Tarnier a employé un procédé, qui est une modification de ceux de Martin de Berlin et de Lestoquoi d'Arras. Ce procédé consiste à faire la suture utéro-pariétale, immédiatement après la section de la paroi abdominale, avant d'inciser l'utérus.

Voici, du reste, comment notre maître s'est exprimé à ce sujet devant la Société de chirurgie, dans la séance du 26 janvier 1870 (Extrait de la *Gazette des hôpitaux*, 22 février 1870) :

« Après avoir bien réfléchi, j'ai pensé qu'on pouvait, une fois la paroi abdominale coupée, passer de suite à la suture utéro-pariétale, pour n'inciser l'utérus qu'après ; de cette façon on évite la hernie de l'intestin et toute espèce d'épanchement dans le péritoine : sang, pus, lochies.

Sur une femme à terme, morte à la Maternité, par suite d'un cancer utérin, j'ai répété cette opération en appliquant sept points de suture métallique de chaque côté, en tout quatorze ; après quoi je fis l'incision de l'utérus et l'extraction du fœtus et du délivre avec la plus grande facilité ; l'opération n'a duré en tout que vingt minutes.

Les quelques inconvénients que je puis prévoir en ce moment à mon procédé, sont : 1° d'exposer à la piqûre du fœtus si on poussait l'aiguille à suture par trop profondément, ou, au contraire, de ne pas embrasser assez de tissu utérin. Ce dernier inconvénient s'est seul montré à moi, ce qui a fait que cinq de mes points de suture sur le cadavre ont cédé ; 2° de gêner peut-être ultérieurement le retrait de l'utérus. Toutefois la grande flaccidité des parois abdominales, et le niveau élevé que garde l'utérus assez longtemps après l'accouchement, prouvent en dehors même du succès obtenu par

Lestoquoi, qu'une pareille crainte n'est pas très-fondée.

Dans la séance suivante, M. Tarnier attira l'attention de la Société sur les contre-temps qui s'étaient offerts à lui pendant l'opération, à savoir : l'écoulement sanguin assez abondant fourni par chaque piqûre ; les véritables jets d'eau qui inondèrent la plaie aussitôt après la piqûre des membranes, et qui se déversèrent en partie dans le péritoine par l'angle inférieur de la plaie. Il croit qu'on pourrait obvier à ces inconvénients : d'une part, en se servant, pour la suture, au lieu d'aiguilles lancéolées, des aiguilles rondes tubulaires qui serviraient à conduire des fils métalliques ; d'autre part, en perforant les membranes à travers le col utérin avant le commencement de l'opération. De plus, M. Tarnier donne le conseil de se placer à la gauche de la malade et de commencer la suture, par le point le plus déclive pour ne pas être gêné par la nappe de sang qui coule pendant qu'on applique la suture.

La suture utérine et l'incision de l'utérus et des membranes étant faites, le reste de l'opération, à savoir : l'extraction du fœtus et du délivre, s'effectuèrent avec la plus grande simplicité. Grâce à la suture utéropariétale l'intestin n'eut pas la moindre tendance à faire hernie pendant tout le cours de l'opération. L'état de la malade fut assez satisfaisant le premier jour, mais le lendemain elle fut prise

de phénomènes de péritonite, et succomba dans la soirée, trente-quatre heures après l'opération. Il est vrai qu'au moment où elle subit l'opération, elle était dans de très-mauvaises conditions, puisqu'elle présentait encore des signes de pneumonie.

La septième catégorie, celle des rétrécissements par obstruction, ne renferme que deux cas. Dans l'un, l'accouchement a été spontané, dans l'autre, il a été terminé par le forceps. D'ailleurs le résultat final a été excellent pour la mère et l'enfant.

La huitième catégorie, celle des rétrécissements dont le degré est inconnu, comprend 53 cas. Il serait non-seulement difficile, mais encore inutile, de se livrer à de nombreuses réflexions à propos de ces rétrécissements, puisque le degré n'est point déterminé. D'après le nombre des cas où l'accouchement a été spontané, presque les deux tiers, il est facile de prévoir que cette catégorie comprend surtout des bassins légèrement rétrécis. Il n'y a, en effet, que trois céphalotripsies et seize forceps. Nous constatons aussi que les applications de forceps n'ont pas été très-heureuses, puisque la mortalité des enfants a été de 75 p. 100. Il est vrai de dire que le travail a souvent dépassé la moyenne de 20 h., et que souvent il y a eu complication de procidence du cordon. Dans quelques cas aussi l'enfant était déjà mort, lorsque la femme entrait à l'hôpital.

Nous n'oublierons pas non plus de faire remar-

quer que dans les cas où l'accouchement a été spontané, les multipares sont plus nombreuses que les primipares, et que la durée moyenne du travail a été de 10 h., tandis que dans les cas où la terminaison de l'accouchement a été opérée par le forceps, les multipares sont en plus petit nombre, et la durée moyenne est de 20 h. Ceci concorde parfaitement avec ce que nous avons déjà dit à propos de la difficulté plus grande de l'accouchement chez les primipares, et de l'intervention chirurgicale qui devient nécessaire lorsque le travail dépasse une moyenne de 20 à 25 h.

Quatrième Partie

CONCLUSIONS BASÉES SUR LES RÉSULTATS OBTENUS A LA MATERNITÉ ET A LA CLINIQUE, D'APRÈS LE MODE DE LA TERMINAISON DE L'ACCHEMENT DANS CHAQUE CATÉGORIE DE RÉTRÉCISSEMENTS.

Résumé de tous nos tableaux :

1° Bassins mesurant 0,10 et plus dans leur diamètre sacro-sous-pubien, ou 0,09 et plus de diamètre sacro-pubien.

CAS.	ENFANTS MORTS.	MÈRES MORTES.
191 terminés spontanément, ayant donné	29	29
	(15,83 p. 100)	(15,83 p. 100)
9 par la version	6	1
	(66,66 p. 100)	(11,11 p. 100)
34 par la forceps	24	13
	(70,58 p. 100)	(38,88 p. 100)
4 par crâniotomie et céphalotripsie	4	1
		(25 p. 100)
1 par céphalotripsie	1	1
2 par forceps, crâniotomie, céphal. et version	2	1
1 par l'accouchement prématuré	0	0
242	66	46
	(27,27 p. 100)	(19 p. 100)

Bassins mesurant de 0,09 à 0,10 exclusivement dans leur

diamètre sacro-sous-pubien, ou de 0,08 à 0,09 de diamètre sacro-pubien.

CAS.	ENFANTS MORTS.	MÈRES MORTES.
40 terminés spontanément, ayant donné	14	5
	(35 p. 100)	(12,25 p. 100)
4 par la version	3	2
	(75 p. 100)	(50 p. 100)
16 par le forceps	8	6
	(50 p. 100)	(37,50 p. 100)
4 par crâniotomie et céphalotripsie	4	2
		(50 p. 100)
5 par forceps, crâniotomie et céphalotripsie	5	3
		(60 p. 100)
8 par forceps, crâniot., céphalotr. et version	8	6
		(75 p. 100)
3 par accouchement prématuré	3	1
	(100 p. 100)	(33,33 p. 100)
80	45	25
	(56,25 p. 100)	(31,25 p. 100)

3° Bassins mesurant de 0,08 à 0,09 dans leur diamètre sacro-sous-pubien, ou de 0,07 à 0,08 dans leur diamètre sacro-pubien.

CAS.	ENFANTS MORTS.	FEMMES MORTES.
2 terminés spontanément, ayant donné	1	0
1 par le forceps	0	0
4 par forceps, crâniotomie et céphalotripsie	4	1
		(25 p. 100)
1 par crâniotomie et céphalotripsie	1	0
3 par accouchement prématuré	3	1
	(100 p. 100)	(33,33 p. 100)
1 par l'opération césarienne	0	1
12	9	3
	(75 p. 100)	(25 p. 100)

4° Bassins mesurant de 0,07 à 0,08 dans leur diamètre sacro-sous-pubien, ou de 0,06 à 0,07 de diamètre sacro-pubien.

CAS.	ENFANTS MORTS.	FEMMES MORTES.
1 terminé par forceps et crâniotomie, ayant donné	1	0
1 par accouchement prématuré (terminaison de l'accouchement prématuré par forceps, crâniotomie, céphalotripsie et version pelvienne.)	1	1
2	2	1

5° Bassins mesurant de 0,06 à 0,07 dans leur diamètre sacro-sous-pubien, ou de 0;05 à 0,06 dans leur diamètre sacro-pubien.

CAS.	ENFANTS MORTS.	FEMMES MORTES.
2 terminés par crâniot. et céphalotr., ayant donné	2	1
1 par l'accouchement prématuré	1	0
3	3	1

6° Bassins mesurant de 0,05 à 0,06 dans leur diamètre sacro-sous-pubien, ou de 0,04 à 0,05 de diamètre sacro-pubien.

CAS.	ENFANT MORT.	MÈRE MORTE.
1 terminé par l'opération césarienne, ayant donné	0	1
1	0	1

7° Bassins rétrécis par obstruction.

CAS.	ENFANTS MORTS.	MÈRES MORTES.
1 terminé spontanément, ayant donné	0	0
1 par le forceps	0	0
	0	0

8° Bassins dont le degré de rétrécissement n'est point indiqué.

CAS.	ENFANTS MORTS.	MÈRES MORTES.
34 terminés spontanément, ayant donné	10	4
	(29,40 p. 100)	(11,76 p. 100)
16 par le forceps	12	3
	(75 p. 100)	(18,75 p. 100)
1 par forceps et céphalotripsie	1	0
2 par céphalotripsie et version pelvienne	0	1
53	23	8
	(43,39 p. 100)	(15,09 p. 100)

Résumé des tableaux de M. Stanesco.

1° Bassins mesurant 0,10 et plus dans leur diamètre sacro-sous-pubien, ou 0,09 et plus de diamètre sacro-pubien.

CAS.	ENFANTS MORTS.	FEMMES MORTES.
25 terminés spontanément, ayant donné	5	1
	(20 p. 100)	(4 p. 100)
12 par la version	8	4
	(66,66 p. 100)	(33,33 p. 100)
17 par le forceps	4	5
	(23,52 p. 100)	(29,41 p. 100)
1 par la crâniotomie	1	0
2 par l'accouchement provoqué	0	1
2 par la céphalotripsie	2	
59	20	12
	(34,06 p. 100)	(20,33 p. 100)

2° Bassins mesurant de 0,09 à 0,10 de diamètre sacro-sous-pubien, ou de 0,08 à 0,09 de diamètre sacro-pubien.

CAS.	ENFANTS MORTS.	MÈRES MORTES.
terminés spontanément, ayant donné	17	3
	(38,63 p. 100)	(6,81 p. 100)
11 par la version	9	2
	(81,81 p. 100)	(18,18 p. 100)
44 par le forceps	11	11
	(25 p. 100)	(25 p. 100)
par crâniotomie	6	2
		(33,33 p. 100)
14 par l'accouchement prématuré	5	2
	(35,71 p. 100)	(14,28 p. 100)
16 par céphalotripsie	16	3
		(18,75 p. 100)
135	54	23
	(40 p. 100)	(17,03 p. 100)

3° Bassins mesurant de 0,08 à 0,09 de diamètre sacro-sous-pubien, ou de 0,07 à 0,08 de diamètre sacro-pubien.

CAS.	ENFANTS MORTS.	MÈRES MORTES.
9 terminés spontanément, ayant donné	4	1
	(44,44 p. 100)	(11,11 p. 100)
3 par la version	3	3
	(100 p. 100)	(100 p. 100)
19 par le forceps	12	2
	(63,15 p. 100)	(10,52 p. 100)
2 par crâniotomie	2	0
15 par accouchement prématuré	9	4
	(60 p. 100)	(26,66 p. 100)
33 par céphalotripsie	33	8
		(24,24 p. 100)
82	63	18
	(76,82 p. 100)	(21,95 p. 100)

4o Bassins mesurant de 0,07 à 0,08 de diamètre sacro-sous-pubien, ou de 0,06 à 0,07 de diamètre sacro-publen.

CAS.	ENFANTS MORTS.	MÈRES MORTES.
1 terminé spontanément, ayant donné	1	1
4 par la version	4	2
	(100 p. 100)	(50 p. 100)
5 par le forceps	2	2
	(40 p. 100)	(40 p. 100)
1 par crâniotomie	1	1
9 par l'accouchement prématuré	8	3
	(88,88 p. 100)	(33,33 p. 100)
20 par céphalotripsie	20	8
		(40 p. 100)
40	36	17
	(90 p. 100)	(42,50 p. 100)

5o Bassins mesurant de 0,06 à 0,07 de diamètre sacro-sous pubien, ou de 0,05 à 0,06 de diamètre sacro-pubien.

CAS.	ENFANTS MORTS.	FEMMES MORTES.
1 terminé spontanément, ayant donné	1	1
1 par le forceps	0	0
4 par l'accouchement prématuré	4	2
3 par céphalotripsie	3	0
4 par l'opération césarienne	0	4
13	8	7
	(61,53 p. 100)	(53,84 p. 100)

6o Bassins dont le degré de rétrécissement n'est point indiqué.

CAS.	ENFANTS MORTS.	FEMMES MORTES.
28 terminés spontanément, ayant donné	8	1
	(28,57 p. 100)	(3,57 p. 100)
12 par la version	10	7
	(83,33 p. 100)	(58,33 p. 100)

CAS.	ENFANTS MORTS.	FEMMES MORTES.
22 par le forceps	5	3
	(22,72 p. 100)	(13,63 p. 100)
6 par crâniotomie	6	3
		(50 p. 100)
2 par l'accouchement prématuré	1	0
16 par céphalotripsie	16	4
		(25 p. 100)
86	46	18
	(53,48 p. 100	(20,93 p. 100)

En additionnant les résultats de M. Stanesco et les nôtres, nous trouvons :

I. Bassins mesurant 0,10 et plus (diamètre sacro sous-pubien), ou 0,09 et plus (diamètre sacro-pubien).

216 accouchements spontanés donnent : mortalité des mères, 13,88 pour 100 ; mortalité des enfants, 15,74 pour 100.
21 par version, 23,80. 66,66.
51 par forceps, 35,29. 54,90.
1 par crâniotomie, 0. 100.
3 par accouchement prématuré, 33,33. 0.
7 par céphalotripsie, 42,86. 100.
2 par forceps, crâniot.; céphal. et version, 100. 50.

301

La plus faible mortalité, tant pour les mères que pour les enfants, se trouve dans la classe des accouchements spontanés qui est la plus nombreuse. En sorte que la première et la meilleure indication à remplir en présence d'un rétrécissement du bassin de 0,10, c'est l'expectation. Après les terminaisons spontanées viennent les terminaisons par le forceps et la version. Bien que la mortalité des mères soit un peu plus considérable dans les cas de forceps que dans les cas de version, cependant, si on prend en considération le petit nombre de versions qui entrent ici en ligne de compte, la mortalité

effrayante des enfants dans ce genre d'opération, et de plus l'état souvent déplorable des femmes que l'on accouche au forceps dans les hôpitaux, on ne doit pas hésiter entre ces deux procédés opératoires ; le forceps doit toujours être préféré. Si donc, le travail se prolonge, si l'accouchement ne semble pas devoir se terminer spontanément, il faudra se hâter de faire une application de forceps.

La version pelvienne doit être seulement réservée pour les présentations de l'épaule, et, encore dans ces cas, il vaudrait mieux faire la version céphalique, s'il y avait moyen.

La réduction de la tête fœtale par la crâniotomie, ou la céphalotripsie, n'a été faite que 8 fois sur 301 cas; aussi ne faudrait-il y avoir recours qu'à la dernière extrémité.

Nous avons deux terminaisons par la version combinée à la crâniotomie et à la céphalotripsie; mais les résultats sont trop mauvais pour qu'on soit porté à employer ce procédé.

Trois accouchements ont été provoqués prématurement; les résultats sont assez bons : trois enfants vivants et une mère morte. M. Tarnier est persuadé que dans cette catégorie de rétrécissements, si on avait provoqué plus souvent l'accouchement avant terme, on serait arrivé à un total de mères vivantes et d'enfants vivants plus considérable.

II. Bassins mesurant de 0,09 à 0,10 exclusivement dans leur diamètre sacro sous-pubien, ou de 0,08 à 0,09 de diamètre sacro-pubien.

		Mortalité des mères.	Mortalité des enfants.
84	cas terminés spontanément donnent :	9,52 0/0	36,90 0/0
15	— par la version —	26,66	80
60	— par le forceps —	28,33	31,66
6	— par la crâniotomie —	33,33	100
25	— par la céphalotripsie —	32	100
17	— par l'accouch. prématuré —	17,66	47,05
8	— (forc., céphalotr. et vers.) —	75	100
215			

Dans cette catégorie de rétrécissements, les accouchements spontanés, qui sont encore les plus nombeux, ont fourni le plus petit contingent à la mortalité des mères, tandis que pour les enfants la plus faible mortalité appartient aux accouchements par le forceps. Pour un rétrécissement de 0,09 de diamètre sacro-sous-pubien, l'indication oscille donc entre l'expectation et l'intervention à l'aide du forceps. En tout cas, si le travail se prolonge, on ne doit pas tarder à appliquer le forceps.

La version doit être rejetée, à moins qu'il ne s'agisse d'une présentation de l'épaule, car les résultats qu'elle a donnés ici sont vraiment déplorables, la mortalité des enfants atteignant le chiffre de 80 p. 100.

Les accouchements prématurés artificiels au nombre de 17, ont été assez heureux pour les mères. La mortalité de celles-ci est de 17,64 p. 100. Mais à l'égard des enfants, ils ont eu moins de succès, car presque la moitié des enfants sont morts. Il est probable que l'accouchement n'a été provoqué ici que chez les femmes qui avaient eu déjà une ou deux couches laborieuses. On aurait pu, je crois, user plus souvent de ce mode de terminaison et en retirer des avantages réels.

La crâniotomie et la céphalotripsie ont donné une mortalité à peu près équivalente, 33 et 32 p. 100.

La céphalotripsie a été pratiquée 25 fois, tandis que la crâniotomie n'a été pratiquée que 6 fois. En sorte qu'après deux applications de forceps infructueuses, il faudra se décider pour la céphalotripsie. Si l'enfant est déjà mort, on fera cette opération après la première tentative infructueuse d'application du forceps.

Ce tableau nous démontre encore que la version combinée à la réduction de la tête fœtale est une mauvaise opération, puisque 8 cas ont donné une mortalité de 75 p. 100.

III. Bassins mesurant de 0.08 a 0,09 de diamètre sacro-sous-pubien, ou de 0,07 a 0,08 de diamètre sacro-pubien.

Accouchements donnent ;		Mortalité des mères.	Mortalité des enfants.
11 —	spontanés —	9,09 0/0	45,45 0/0
20 —	par le forceps,	10	60
3 —	par la version,	100	100
2 —	par la crâniotomie,	0	100
38 —	par la céphalotripsie,	23,68	100
18 —	par l'accouchement prématuré,	27,77	66,66
1 —	par l'opération césarienne.	100	100
83			

Dans cette catégorie, les accouchements les plus nombreux sont compris dans la classe des céphalotripsies ; ils ont donné une mortalité de 23,68 p. 100.

La plus faible mortalité des mères et des enfants se trouve : 1o dans les accouchements spontanés ; 2o dans ceux qui ont été terminés par le forceps. Mais ces deux séries sont peu nombreuses, 11 et 20 sur 83.

Dans un cas de rétrécissement du bassin de 0,08 de diamètre sacro-sous-pubien, on doit donc compter fort peu sur l'accouchement spontané. Aussi dès que le col présentera une dilatation suffisante, faudra-t-il appliquer le forceps ; et si le forceps ne réussit pas, réduire bientôt le volume de la tête fœtale par la crâniotomie et la céphalotripsie. Si on a déjà constaté la mort de l'enfant, on pourra faire la céphalotripsie beaucoup plus tôt. La version a été employée trois fois, et n'a eu que des insuccès ; aussi doit-on la mettre entièrement de côté pour toutes les présentations autres que celles de l'épaule.

Quant à l'accouchement provoqué avant terme, employé 18 fois, il a donné une mortalité d'enfants assez considérable, 66,66 p. 100 ; celle des mères étant de 27,77 p. 100. Ce sont des résultats qui laissent à désirer, et qui sont inférieurs à ceux du forceps appliqué chez des femmes à terme.

IV. Bassins mesurant de 0,07 a 0,08 de diamètre sacro-sous-pubien, ou de 0,06 a 0,07 de diamètre sacro-pubien.

			Mortalité des mères.	Mortalité des enfants.
1	accouchement spontané ayant donné,		100 0/0	100 0/0
4	—	par la version —	50	100
5	—	dar le forceps —	40	40
2	—	par la crâniotom.—	50	100
10	—	p. l'acc. prémat. —	40	90
20	—	p. la céphalotr. —	40	100
42				

D'après ce tableau, nous voyons que pour un rétrécissement de 0,07 de diamètre sacro-sous-pubien, il faudra réduire le plus souvent la tête fœtale par la crâniotomie et la céphalotripsie. Les accouchements provoqués avant terme ont eu de bien mauvais résultats; ils ont donné une mortalité d'enfants 90 p. 100. Aussi serait-il peut-être préférable, dans certains cas, de provoquer l'avortement plutôt que l'accouchement prématuré.

Rarement, il sera possible de terminer l'accouchement par le forceps, car nous ne comptons ici que 5 cas sur 42. Aussi vaut-il mieux pratiquer la céphalotripsie que de s'obstiner à exercer des tractions qui peuvent être très-nuisibles pour la mère.

V. Bassins mesurant de 0,06 à 0,07 de diamètre Sacro-sous-pubien ou de 0.05 à 0,06 de diamètre Sacro-pubien.

accouch. spont. donne :		mort. des mères,	100	p. 100 ;	mort. enf.,	100	p. 100.
1	— par forceps,	—	»	—	—	»	—
5	par l'accouch. prémat.,	—	40	—	—	100	—
5	par céphalotripsie,	—	20	—	—	100	—
4	par l'opérat. césar.,	—	100	—	—	»	—

L'accouchement par le forceps a été le plus heureux, mais il n'est pas possible de juger d'après un seul cas. La céphalotripsie est l'opération qui a eu le plus de succès, car elle n'a

donné qu'une mortalité de 20 p. 100. C'est donc le mode de terminaison que conseille notre tableau comme le meilleur.

Les résultats de l'accouchement prématuré artificiel sont encore plus fâcheux que dans la catégorie précédente : sur 5 cas, un seul enfant vivant et 40 p. 400 de mortalité des mères.

Les opérations césariennes ont été pratiquées : 100 p. 100 de mortalité des mères et tous les enfants vivants.

Enfin, nous n'avons qu'un seul cas de rétrécissement de 0,05 de diamètre sacro-sous-pubien. — L'opération césarienne a été faite, et comme toujours, la mère est morte et l'enfant a vécu. Cependant c'est la seule opération que l'on puisse pratiquer en pareil cas ; car dans un bassin ainsi rétréci, il serait impossible de faire manœuvrer un instrument réducteur.

Si nous additionnons tous les résultats compris dans les trois dernières catégories, nous trouvons un total de 59 accouchements, qui ont donné 31 mères vivantes (52,54 p. 100) et 10 enfants vivants (16,94 p. 100). En sorte que, d'après cette proportion, sur 200 individus, on n'aurait pu conserver la vie qu'à 66,66. De plus, les 15 accouchements prématurés artificiels, qui entrent dans notre total, ont donné 60 p. 100 de mères vivantes et 6,66 p. 100 d'enfants vivants, c'est-à-dire 66,66 vivants sur 200 individus.

Il est probable que si, dans ces cas, on avait provoqué l'avortement on aurait conservé la vie à un plus grand nombre d'individus.

Que déduire de cela ? Une seule chose ; c'est qu'il n'y a pas avantage, du moins pour les degrés de rétrécissements qui nous occupent en ce moment, à employer les modes de terminaison, qui ont pour but de conserver à la fois la vie de la mère et celle de l'enfant. En sorte que si nous ne craignions de blesser les lois de la morale, nous résumerions notre opinion à cet égard dans une dernière conclusion : Dans les cas de rétrécissements de 0,07 (dam. sacro-sous-pubien) et au dessous, par l'avortement, on peut conserver la vie à un plus grand nombre d'individus, que par tout autre moyen de temporisation.